

হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্যসোপান

ও

চিকিৎসা-প্রবেশিকা

অর্থাৎ

প্রয়োজনীয় প্রধান প্রধান হোমিওপ্যাথিক ঔষধের
স্থূল স্থূল বিবরণ ও রোগের সংক্ষিপ্ত চিকিৎসা।

হোমিওপ্যাথিক "স্বল্প চিকিৎসা", "চিকিৎসা সোপান" "ওজাউটার চিকিৎসা",

"স্বল্প" "স্বল্প চিকিৎসা-প্রবেশিকা", "অব রোগ চিকিৎসা"

ইত্যাদি গ্রন্থ প্রণেতা।

শ্রীরাধাকান্ত ঘোষ সংকলিত।



কলিকাতা,

২৫নং কর্ণওয়ালিস্‌স্ট্রীট, বি, বানার্জী এণ্ড কোম্পানি দ্বারা প্রকাশিত।

সেপ্টেম্বর, ১৮৯০।

(All Rights Reserved.)

মূল্য ৬।০, ছয় টাকা চারি আনা।

କଳିକାତା, ୨ ନଂ ଗୋସାବାଗାନ ଷ୍ଟ୍ରୀଟ, ଭିକ୍ଟୋରିୟା, ଫ୍ରାନ୍ସେ,
ଶ୍ରୀମନ୍ମୋହନ ବନ୍ଧିତ ଦ୍ଵାରା ମୁଦ୍ରିତ ।

বিজ্ঞাপন ।

আকারে ক্ষুদ্র হয় ও প্রয়োজনীয় প্রধান প্রধান ঔষধের স্থূল স্থূল বিবরণ
 ক্রমে অথচ শিক্ষার্থী, চিকিৎসার্থী এবং গৃহস্থ সকলেরই উপযোগী হইতে
 পারে, ইংরেজী বা বাঙ্গালা ভাষায় হোমিওপ্যাথিক মতে ভৈষজ্য তত্ত্ব বিষয়ে
 একরূপ একখানি গ্রন্থের অভাব লেখক অনেক দিন হইতে অনুভব করিয়া
 আসিতেছেন । এই অভাব কথঞ্চিৎ পূরণ করিবার জন্ত লেখক অনেক যত্নও
 করিয়া আসিতেছেন । এই উদ্দেশ্যে ১৮ বৎসর যাবৎ হোমিওপ্যাথিক মতে
 রোগ চিকিৎসায় যে সকল ঔষধ ব্যবহার করিয়া দেখানে যেরূপ ফল পাওয়া
 গিয়াছে, তাহা নিয়মিতরূপে লিপিবদ্ধ করিয়া চিকিৎসার উক্ত ফল এবং
 ডাক্তার এ, সি, কাউপার থোয়েট্‌সের “টেক্সট বুক অব্ মেটেরিয়া মেডিকা”
 (Dr. A. C. Cowperthwaite's “Text Book of Materia Medica”) ডাক্তার আর,
 হিউজের “ম্যানুয়েল অব্ ফার্মাকোডিনেমিক্স” (“Manual
 of Pharmacodynamics”, by Dr. R. Hughes), ডাক্তার এইচ, আর,
 হাম্পট্‌ সম্পাদিত ডাক্তার সি, জে, হেম্পেলের “মেটেরিয়া মেডিকা এণ্ড্
 থেরাপিউটিক্স” (Dr. C. J. Hempel's “Materia Medica and Therapeu-
 tics”, edited by Dr. H. R. Arndt), ডাক্তার ই, এম, হেলের “নিউ
 রেমিডিজ্” (Dr. E. M. Hale's “New Remedies”), ডাক্তার ডি, এইচ,
 গুয়েরেন্সের “কি-নোট্ টু দি মেটেরিয়া মেডিকা” (Dr. D. H. N.
 Guerenens's “Key note to the Materia Medica”), ডাক্তার এফ,
 জ, স্নেলিং সম্পাদিত “হাল্‌স্ জার” (“Hull's Jahr,” edited by Dr. F.
 J. Snelling), ডাক্তার জুসেটের “ক্লিনিকাল্ অন্ ক্লিনিয়াল্ মেডিসিন্”
 (Dr. J. J. Jusset's “Lectures on Clinical Medicine”), ডাক্তার আগার
 উডের “মেটেরিয়া মেডিকা অব্ ডিফারেন্সেল্ পোটেন্সিস্” (Dr. Under-
 wood's “Materia Medica of differential Potencies”), ডাক্তার সিড্‌নী
 রিংগারের “হ্যান্ড্ বুক অব্ থেরাপিউটিক্স্” (Dr. Sydney Ringier's “Hand
 Book of Therapeutics”), ডাক্তার এইচ, সি উডের “থেরাপিউটিক্স্” (Dr.
 Wood's Therapeutics), ডাক্তার পেরেরার “মেটেরিয়া মেডিকা এণ্ড্

থিরাপিউটিক্স' (Dr. Pereira's "Materia Medica and Therapeutics") ডাক্তার সি, ডি, এক্ ফিলিপ্সের "মেটেরিয়া মেডিকা এণ্ড থিরাপিউটিক্স বেজিটেবেল্ কিংডম্, অর্গ্যানিক্ কম্পাউণ্ড্‌স্, আনিমেল্ কিংডম্" (Dr. D. F. Phillip's "Materia Medica and Therapeutics: Vegetable Kingdom, Organic Compounds, Animal Kingdom") ইত্যাদি ইংরেজী হোমিওপ্যাথিক্ ও আলোপ্যাথিক্ ভৈষজ্য-তত্ত্ব বা মেটেরিয়া মেডিকা সম্বলন পূর্বক হোমিওপ্যাথিক্ "ভৈষজ্য-সোপান" ও "চিকিৎসা প্রবেশিকা", নাম দিয়া এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি লিখিত হইল। ইহাতে প্রবেশজনীয় প্রধান প্রধান হোমিওপ্যাথিক ঔষধের ক্রিয়া ও ব্যবহৃত্ত্বের স্থান স্থান বিবরণ এবং রোগের সংক্রান্ত চিকিৎসাদি লিখিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের অনেকাংশ ডাক্তার কাউপারথোয়েটসের টেক্সট্‌বুক অব মেটেরিয়া মেডিকার অবিকল অনুবাদ আছে। ইহাতে গ্রন্থখানি শিক্ষার্থী, চিকিৎসার্থী এবং গৃহস্থ সকলেরই উপযোগী হয় সেই অতি প্রায়ে পানিভাষিক শব্দাদি পরিভাষা কবিত্তে ব্যা-সাধ্য যত্ন করা হইয়াছে। এফগে উক্ত উদ্দেশ্য কতদূর সফল হইয়াছে বিজ্ঞ পাঠক বিবেচনা করিবেন।

এই গ্রন্থে অনেক অভাব আছে স্বীকার কবিত্তে হইবে। হোমিওপ্যাথিক ঔষধের সংখ্যা যেকপ অধিক এবং উহাৰ ভৈষজ্যতত্ত্ব যেকপ সুবিস্তৃত, তাহাতে একপ ক্ষুদ্র গ্রন্থে যে অনেক অভাব থাকিবে তাহা কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। বরং ইহার ক্ষুদ্র আকারকেই উক্ত অভাবের মুখ্য কারণ বলিত্তে হইবে।

এই গ্রন্থে ভ্রম থাকা অনস্ব্যব নহে। অতএব পাঠক মহাশয়দিগের নিকট এই নিবেদন যে, যদি তাঁহারা ইহাতে কোন ভ্রম দেখিত্তে পান, অথবা পূর্বক জানাইলে উক্ত ভ্রম ত্রুটি কৃতজ্ঞাচেষ্টে ও মাদরে গৃহীত হইবে।

১০১ নং মানিকতলা ষ্ট্রীট
কলিকাতা, ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯০

}

প্রণয়ক

ভৈষজ্যসোপান

ও

টিকিৎসা প্রবেশিকার সূচিপত্র ।

উপক্রমণিকা ।

বিষয় ।

পৃষ্ঠা

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ প্রস্তুত করার সংক্ষিপ্ত নিয়মাবলী:—

- | | |
|--|----|
| (১) মূল, আদত, অমিশ্র আংরাণ বা মাদার টিংচার (Mother Tincture) | ১০ |
| (২) মিল, আরোক বা ডাইলুশন (Attenuated Tincture, -Dilution) | ১০ |
| (৩) ঔষধ মিশ্রিত কুণ্ড এবং বড় বটিকা (Medicated Globules and | |
| Pilules) | ১০ |

- | | |
|---|----|
| (৪) ঔষধের গুঁড়া বা ট্রাইটুরেশন (Trituration) | ১০ |
| গুঁড়া হইতে আরোক প্রস্তুত করিবার নিয়ম | ১০ |
| ঔষধ রাখিবার নিয়ম | ১০ |
| ঔষধ রাখা সম্বন্ধে সাবধানতা | ১০ |

ব্যবস্থা পত্র বিদ্যা পত্র দ্বারা কোন ঔষধালয় হইতে ঔষধ

আনা হইতে হইলে ঔষধের ক্রমাদির চিহ্ন কিরূপে

নির্দিষ্ট হইয়া থাকার নিয়মাবলী

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ প্রস্তুত করিবার জন্ত কি কি দ্রব্য আবশ্যিক:—

- | | |
|-------------------------|----|
| (১) জল | ১০ |
| (২) অ্যালকোহল (Alcohol) | ১০ |

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ প্রস্তুত করিবার জন্ত যে কএক প্রকারের

স্পিরিট প্রয়োজন তাহার প্রস্তুত করিবার নিয়মাবলী

মূল আরোক বা মাদার টিংচার হইতে ডাইলুশন প্রস্তুত করিবার জন্ত

যে পকার স্পিরিটের প্রয়োজন তাহার বিবরণ

(৩) ইথার (Ether)

(২)

বিষয়	পৃষ্ঠা
(৪) গ্লিসেরিন্ (Glycerine)	১১০
(৫) পরিশুদ্ধ সুগার অব্ মিল্ক্ (Pure Sugar of milk)	১১০
(৬) মেজার গ্লাস, মিনিম্ গ্লাস, থল, নিক্টি ইত্যাদি	১১০
(৭) শিশি ও কর্ক (Phials and Corks)	১১০
হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ক্রয় সম্বন্ধে সাবধানতা	১১০
ঔষধের ডাইলুশন বিচার	১১০
হোমিওপ্যাথি কাহাকে বলে	১১০
ঔষধ মনোনীত করাব নিয়ম সম্বন্ধে ক একটা কথা	১১০
পাঠকের প্রতি	১১০

প্রথম ভাগ।

প্রথম শ্রেণীর ঔষধ সমূহ।

বিষয়।	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
১। অসিডাম্ নাইট্রিকাম্ (নাইট্রিক্ অসিড্)	১	১১। কার্বো বেজিটেবিলিস্	১৮
২। অসিডাম্ স্কফরিকাম্ (স্কফরিক্ অসিড্)	১০	১২। ক্যামোমিলা	১০৭
৩। একোনাইটাম্ নেপেল্যাম্	১৭	১৩। চায়না (সিক্কোনা)	১১৪
৪। অস্টিমেনিয়াম্ টাটারিকাম্ (টাটার্ এমিটিক্)	২৯	১৪। কুপ্রাম (তাম্র)-কুপ্রাম্ মেটে- লিকাম্, কুপ্রাম্ অসিটিকাম্	১২৫
৫। আর্নিকা নোভা	৩৫	১৫। ভিজ্জটালিস্ প্যাস্চারিয়া	১৩১
৬। অসিনিকাম্ অল্ভাম্ (অসিনিক্)	৪০	১৬। ফেরাম্ (সোড), ফেরাম্ মেটেসি-	
৭। অরারু (তবক, -স্বর্ণ)	৫৮	কাম্, ফেরাম্ সাল্ফিউরিকাম্	১৩৬
৮। বেলাডোনা,	৬৪	১৭। গ্রাফাইটিন্ (কৃষ্ণ মাসা)	১৪৫
৯। ব্রাইউরিয়া অল্ভা	৭৭	১৮। হিপার সাল্ফিউরিন্	১৫৪
১০। ক্যাল্কেরিয়া কার্বোনিকা	৮৮	১৯। ইগ্নেসিয়া আমারা	১৬৫
		২০। আয়োডিয়াম্ (আয়োডিন্)	১৭৫
		২১। ইপিকারিকউএনা	১৭৫
		২২। ক্যালী-বাইক্রমিকাম্	১৮৫

(গ)

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
২৩। ল্যাকেসিস	১৮৮	৩১। রাস্টটিকোকোডেণ্ড	২৭৭
২৪। লাইকোপডিয়াম	১৯৮	৩২। সিলিয়া সাকাস (সিলিয়া)	২৮৯
২৫। মার্কিউরিয়াস (মার্কিউরিয়াস সলিউবিলিস)	২০৮	৩৩। সাইলিসিয়া (সিলিকা)	৩০০
২৬। নাক্স-বসিকা	২২০	৩৪। সাল্‌ফার (গন্ধক)	৩১২
২৭। ওপিয়াম (আফিম)	২৩৫	৩৫। বিরেটাম আল্‌বাম	৩২৭
২৮। ফস্‌ফরাস	২৪২	৩৬। চিনিলাম সাল্‌ফিউরিকাম (সাল্‌ফেট্‌ অব্‌ কোইনাইন)	৩৩৫
২৯। প্লাসাম	২৫৬	৩৭। চিনিলাম আর্সিনিকোসাম (আর্সিনিয়েট্‌ অব্‌ কোইনাইন)	৩৪২
৩০। স্ট্রোন্টিয়াম	২৬২		

দ্বিতীয় ভাগ।

দ্বিতীয় শ্রেণীর ঔষধ সমূহ।

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
১। অসিডাম হাইড্রোসায়েনিকাম (হাইড্রোসায়েনিক অসিড) ৩৪২		৮। ব্যাপ্‌টিসিয়া ট্রিটোরিয়া (ব্যাপ্‌টিসিয়া)	৩৮৯
২। অসিডাম মিউরিয়টিকাম (মিউরিয়টিক অসিড) ৩৫২		৯। ব্যারাইট কার্বোনিক ৩৯৪	
৩। সিমিডিসিউগা রেসিনোসা (আক্টিয়া রেসিনোসা) ৩৫৭		১০। ক্যান্থাস প্রাপ্‌টিফোরাস ৩৯৯	
৪। ইঙ্কলাস্‌ ট্রিপোকাষ্টেনাম ৩৬৩		১১। ক্যাল্‌কেরিয়া ফস্‌ফরিকা ৪০৪	
৫। অক্টিমোনিয়াম ক্রুডাম ৩৬৭		১২। ক্যান্‌ফোরা (ক্যান্‌ফর) ৪০	
৬। এপিমেলেফিকা ৩৭৩		১৩। ক্যান্‌হারাইডিস্‌ (ক্যান্‌হারিস) ৪১৩	
৭। অক্টিমোনিয়াম নাইট্রিকাম (নাই- টেট অব্‌ সিল্‌বার্‌, লুনার কষ্টিক) ৩৮০		১৪। কষ্টিকাম ৪১৯	
		১৫। চেলিডোনিয়াম মেজাস্‌ ৪২৭	
		১৬। সিনা ৪৩১	
		১৭। ককিউলগু ইণ্ডিকাম ৪৩৬	
		১৮। কফিয়া ক্রুডা (কফিয়া) ৪৪২	

ବିଷୟ	ପୃଷ୍ଠା	ବିଷୟ	ପୃଷ୍ଠା
୧୯ । କଲ୍‌ଚିକାମ୍ କ୍ଲଟାମ୍‌ନେଲୀ	୫୫୧	୭୨ । ନାକ୍ସ୍ ମକାଟା (ଜାୟକ୍‌ଲ)	୧୨୭
୨୦ । କଲୋସିହିସ୍ (କଲୋସିହି)	୫୫୦	୭୩ । କାହିଟୋଲାକା ଡିକାଡ୍ରା	୧୨୮
୨୧ । କୋନାୟାମ୍ ଯାକ୍‌ଲେଟାମ୍	୫୫୨	୭୪ । ପ୍ଲାଟିନାମ୍ ମେଟେଲିକାମ୍	୧୨୯
୨୨ । ଡ୍ରାସିରା ରୋଟାଓଫୋଲିୟା	୫୬୫	୭୫ । ପଡୋଫିଲାମ୍ ପେଟେଟାମ୍	୧୩୦
୨୩ । ଡାକ୍‌କେମେରା	୫୬୭	୭୬ । ସିକେଲ୍ କର୍ଣ୍ଣୁଟାମ୍ (ଆର୍ଗିଟ୍)	୧୩୧
୨୪ । ଡ୍ରୁଓକ୍‌ସିୟା ଅକ୍‌ସିନେଲିସ୍	୫୭୨	୭୭ । ସ୍ପାହିଜେଲିୟା ଆହ୍‌ଲେମିୟା	୧୩୨
୨୫ । ଜେଲ୍‌ସିନିୟାମ୍ ସେମ୍ପାରବିରେନ୍‌ସ୍ (ଜେଲ୍‌ସିନିୟାମ୍)	୫୭୩	୭୮ । ସ୍ପାଞ୍ଜିୟା ଟୋଷ୍ଟା (ସ୍ପାଞ୍ଜିୟା)	୧୩୩
୨୬ । ହାମାମେଲିସ୍ ବାର୍ଜିଗିକା	୫୮୦	୭୯ । ଷ୍ଟାନାମ୍	୧୩୪
୨୭ । ହାହିଡ୍ରାଓଟିସ୍ କାନ୍‌ନେଡେନିସ୍	୫୮୬	୮୦ । ହ୍ରାମୋନିୟାମ୍ (ସୁହ୍ରା)	୧୩୫
୨୮ । ହାୟୋସାୟେମାମ୍ ନାହିଜାର	୫୯୨	୮୧ । ଡିରିବିହିନା (ଡାରିପିନ୍‌ଡଲ)	୧୩୬
୨୯ । ଆହିରିସ୍ ବାସିକାଲାର	୫୯୯	୮୨ । ଥୁଜା ଅଗ୍ନିଡେଣ୍ଟାଲିସ୍ (ଥୁଜା)	୧୩୭
୩୦ । ଯେଜ୍‌ଜିରିୟାମ୍	୬୦୨	୮୩ । ଦିବେଟାମ୍ ବିରାହିଡ୍	୧୩୮
୩୧ । ନେଟାମ୍ ମିଡ୍‌ରିୟାଟିକାମ୍	୬୦୮	୮୪ । ଜିହ୍ବାନ୍ ମେଟେଲିକାମ୍	୧୩୯

ତୃତୀୟ ଭାଗ ।

ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଔଷଧ ସମୂହ ।

ବିଷୟ	ପୃଷ୍ଠା	ବିଷୟ	ପୃଷ୍ଠା
୧ । ଆସିଡାମ୍ ଫୁରୋରିକାମ୍ (ଫୁରୋରିକ୍ ଆସିଡ୍)	୬୮୦	୯ । ଆଗାରିକାନ୍ସ୍ ଯାକ୍‌କ୍‌ସିୟାମ୍	୬୯୦
୨ । ଆସିଡାମ୍ ଅକ୍‌ଜାଗିକାମ୍ (ଅକ୍‌ଜାଗିକ୍ ଆସିଡ୍)	୬୮୨	୧୦ । ଆଲୋଜ୍	୬୯୧
୩ । ଆସିଡାମ୍ ସାଲ୍‌ଫିଉରିକାମ୍ (ସାଲ୍‌ଫିଉରିକ୍ ଆସିଡ୍)	୬୯୨	୧୧ । ଆଲୁମିନା	୬୯୨
୪ । ଆସିଡାମ୍ କାର୍ବୋଲିକାମ୍ (କାର୍ବୋଲିକ୍ ଆସିଡ୍)	୬୯୬	୧୨ । ଆନାକାର୍ଡିୟାମ୍ ଡାରିୟାଟେଲି (ଆନାକାର୍ଡିୟାମ୍)	୬୯୬
		୧୩ । ବ୍ରୋମିୟାମ୍ (ବ୍ରୋମିନ୍)	୬୯୯
		୧୪ । କାର୍ବୋ ଆନିମେଲିସ୍	୭୦୦
		୧୫ । ଗ୍ଲୋସିନିୟାମ୍	୭୦୧

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
১২। হেলিনোরাস্ নাইজার	৬৩২	৩৩। কলোফিলাম্ থ্যালিক্টুয়েড্‌স্	
১৩। ক্যালী ব্রোমোটাম্ (ব্রোমাইড্		(কলোফিলাম্)	৭১৪
অব্ পোটামিয়াম্) ৪	৬৩৬	৩৪। সিড্রন্	৭১৬
১৪। ক্যালী কার্বোনিকাম্		৩৫। সিকুটা বিরোসা	৭১৭
(কার্বোনেট্ অব্		৩৬। কলিস্মোনিয়া ক্যানেডেন্সিন্	
পোটাম্	৬৪১	(কলিস্মোনিয়া)	৭২১
১৫। ক্যালী অ্যাবোডেটাম্ (অ্যাবো-		৩৭। ক্রোকাশ্ স্যাটাইবাস্	৭২৩
ডাইড্ অব্ পোটাম্)	৬৪৮	৩৮। ক্রোটন্ টিগ্লিয়াম্	৭২৬
১৬। ক্রিভাজোটাম্	৬৪২	৩৯। ডায়োক্লিথা বিরোসা	৭২৯
১৭। লেডাম্ পেলাস্টি	৬৫৬	৪০। ইউকেলিপটাস্ থাইউলাস্	৭৩২
১৮। ফাইসটিগমা	৬৬০	৪১। ইউপেটরিয়াম্ পার্কোলিয়ে-	
১৯। ইউরেনিয়াম্ নাইট্রিকাম্	৬৬৬	টাম্	৭৩৫
২০। এঞ্জা সাবনেপিয়াম্	৬৬৭	৪২। ইউক্লিডাম্ অকসিনেলি	৭৩৭
২১। আগ্নাম্ কাষ্টাম্	৬৭০	৪৩। ব্যট্রোফা কার্বোশ	৭৪০
২২। অ্যামোনিয়াম্ কার্বোনিকাম্		৪৪। ক্যাল্‌মিয়া ল্যাটিকোলিয়া	৭৪১
(কার্বোনেট্ অব্ অ্যামোনিয়া) ৭৩		৪৫। ল্যাকুয়া হিম্ টিক্টোরিয়া	৭৪৪
২৩। অ্যামোনিয়াম্ মিউরিয়াটিকাম্		৪৬। ল্যাকুটিকা বিরোসা	৭৪৭
(অ্যামোনিক্ ক্লোরাইড্)	৬৭৮	৪৭। লরেন্সিভেসাস্ প্রুয়ান্	৭৪৮
২৪। অ্যাপোসিনাম্ ক্যামেবিনাম্	৬৮২	৪৮। লেপ্টাণ্ডা	৭৫১
২৫। অ্যাজেন্টাম্ মেটেলিকাম্	৬৮৪	৪৯। লিগিয়াম্ টাইগ্রিনাম্	৭৫২
২৬। অ্যারিনিকাম্ অ্যাবোডেটাম্	৬৮৮	৫০। লোবিলিয়া ইনফুটা	৭৫৫
২৭। অ্যাকটিডা (হিং)	৬৮৯	৫১। ম্যাগ্নেসিয়া কার্বোনিকা	৭৫৮
২৮। বিশ্বাণাম্ (বিশ্বাণি)	৬৯২	৫২। ম্যাগ্নেসিয়া মিউরিয়াটিকা	
২৯। বোরাক্স (সোডাগা)	৬৯৫	(মিউরিয়েট্ অব্ ম্যাগ্নে-	
৩০। ক্যানাবিস্ ইণ্ডিকা	৭০০	নেসিয়া)	৭৬১
৩১। ক্যানাবিস্ স্যাটাইবা (সিজি)	৭০৫	৫৩। মার্কিউরিয়াম্ বিনায়ে-	
৩২। ক্যাপ্সিকাম্ অক্লিয়াম্	৭০৯	ডেটাস্	৭৬৭

(চ)

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
৫৪। মার্কিউরিয়াস্ করোসাই- বাস্ (করোসিভ্ সালিমেট্)	৭৬৭	৬৬। স্ফাটোনাটিন্	৮১১
৫৫। মিলিফোলিয়াম্	৭৭৪	৬৭। সার্বাসেনিয়ারিপ্যুরিয়া	৮১২
৫৬। মফাশ্ (মৃগনাভি, -কন্তুরি)	৭৭৭	৬৮। সার্সপেরিলা	৮১৩
৫৭। মিরিকা সেবিফেরা	৭৭৮	৬৯। সেনিসিয়ো অরিয়াস্	৮১৪
৫৮। ইনাছি ক্রোকেটা	৭৮৩	৭০। ষ্টাকিসেগ্রিয়া	৮১৯
৫৮। পিট্রোলিয়াম্	৭৮৫	৭১। টিলিজিয়া গিল্‌ব্যাটিকা	৮২৫
৫৯। বেনানকুলাস্ বাধোসাস্	৭৮৯	৭২। সিম্ফাইটাম্ অফিসিনেলী	৮২৮
৬০। কুম্ পালমেটাম্ (কলবার্)	৭৯৩	৭৩। টিউক্রিয়ান্ মেরাম্ বিরাম্	৮২৮
৬১। বডোডেণ্ডন-ক্রিশাভাম্	৭৯৫	৭৪। ট্যারেণ্টুলা	৮২৯
৬২। কমেস্ ক্রিম্পাশ্ (কমেস্)	৭৯৮	৭৫। আটিকা ইউরেন্স্	৮২৯
৬৩। কুটা গ্রাবিমোলেন্স্ (কুটা)	৮০০	৭৬। বেলিরিয়ানা অফিসিনে-	
৬৪। সাবাইন	৮০৩	নিস্ (বেলিবিয়ান্)	৮৩১
৬৫। সাসুনেরিয়া ক্যানিডেন্সিস্	৮০৬	৭৭। বার্বাডাকাম্ থ্যাপ্সাস্	৮৩২
		৭৮। জ্যাছস্ জিলাম্	৮৩২

চতুর্থ ভাগ।

৪র্থ শ্রেণীর ঔষধ সমূহ।

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
১। অ্যানিডাম্ পিক্‌সিকাম্ (পিক্‌বিক্ অসিড্)	৮৪১	৮। এলিয়াম্ নিপা	৮৫৪
২। এটলাভাস্ থাথুলোসাস্	৮৪২	৯। এলিয়াম্ স্ফাটাইবাম্ (রক্সন)	৮৫৬
৩। আট্রোপিয়া	৮৪৪	১০। আপোমফিয়া	৮৫৭
৪। জোটেগাস্ হবিডাস্	৮৫৫	১১। আসেরাম্ ইরোপিয়াম্	৮৫৮
৫। কোপেইবা	৮৫৯	১২। অ্যাক্টুপিয়াম্ টিউনারোসা	৮৬০
৬। কোরেলিয়াম্ কল্যাম্	৮৫১	১৩। ব্যারাইটা অ্যাসেটিকা	৮৬৩
৭। ক্রোনিডা	৮৫৩	১৪। ব্যারাইটা নাইট্রিয়াটিকা	৮৬৫
		১৫। ব্যারাইটা অ্যায়োডেটা	৮৬৫

(ছ)

বিষয়।	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
১৬। বার্কেলিস্ বাল্গারিস্	৮৬৬	৪০। মার্কিউরিয়াম্ আরোডেটাম্	
১৭। বোবিষ্টা	৮৬৯	(আরোডাইড্ অব্ মার্ক্যুরী) ৯১৬	
১৮। ক্যালেলডিয়াম্ সেণ্ডইনাম্	৮৭২	৪১। নেজা ট্রিপোডিয়াম্	৯১৮
১৯। ক্যাকেরিয়া আর্সিনিকা	৮৭৫	৪২। জ্যাবোরাণ্ডি	৯২২
২০। ক্যাকেরিয়া আরোডেট	৮৭৫	৪৩। নেট্রাম্ সাল্ফিউরিকাম্	৯২৪
২১। ক্যালেল্ডা অফিসিনেলিস্	৮৭৬	৪৪। লুফর লুটিয়াম্	৯২৯
২২। কাডুয়াম্ মেরিয়োনাম্	৮৭৭	৪৫। ওরিগেনাম্ মার্জোরেগা	৯৩০
২৩। সিয়োনোথাস্ আমে- রিকেনসিস্	৮৭৯	৪৬। স্ত্রাবাডিনা	৯৩১
২৪। চিমাফিলা অংশ্লেট	৮৮০	৪৭। স্ত্রাম্ কাশ্ নাইগ্রা	৯৩৪
২৫। সিষ্টাম্ ক্যানডেলিস্	৮৮১	৪৮। সিলা ম্যাবিটমা	৯৩৬
২৬। কোকাস্ ক্যাক্টাই	৮৮৪	৪৯। সেনিগা	৯৩৯
২৭। কোকা	৮৮৮	৫০। সেনা	৯৪৩
২৮। কিউরেয়ার	৮৯১	৫১। ষ্টিক্টা পাল্ মোনেরিয়া	৯৪৩
২৯। কুথুরাশো	৮৯২	৫২। টেবেকাম্	৯৪৫
৩০। সাইক্রেমেন্ ইউনোপিয়াম্	৮৯৩	৫৩। ট্যারেঙ্কেকাম্	৯৪৮
৩১। ইউপেটোরিয়াম্ পাপু'রিয়াম্	৮৯৬	৫৪। টেলুরিয়াম্	৯৫
৩২। ফেরাম্ আরোডেটাম্	৮৯৮	৫৫। টিলিয়াম্ পেডুলাম্	৯৫
৩৩। হাইপারিকাম্ পার্কো- রেটাম্	৮৯৯	৫৬। বুফো রাণা	৯৬
৩৪। ইণ্ডিগো (নীল)	৯০২	৫৭। প্রাণ্টেগো মেজার	৯৭
৩৫। ক্যাণী নাইটিকাম্	৯০৩	৫৮। রাটান্হিয়া	৯৮
৩৬। ক্যানী পু'ব্রাঙ্গেনিকাম্	৯০৯	৫৯। এবিস্ নাইগ্রা	৯৯
৩৭। লাইকোপাস্ ব্যাক্সিলিকা	৯১০	৬০। আকালিকা ইণ্ডিকা	১০০
৩৮। মিনিয়াম্ ট্রিফোলিয়েটা	৯১৩	৬১। আব্'সিহিয়া	১০১
৩৯। মার্কিউরিয়াম্ সায়েনেটাম্	৯১৫	৬২। আসিটিক্ আসিটিক্	১০২
		৬৩। আস্ত্রা গ্রিসিয়া	১০৩
		৬৪। আস্ত্রা গ্রিসিয়া	১০৪
		৬৫। অ্যাসিডাম্ বেঞ্জোয়িকাম্	১০৫

(জ)

বিষয়	পৃষ্ঠা
৬৬। ক্রিমোটস্ ইরেক্টা	৯৭০
৬৭। হেলোনিয়াস্ ডায়োস্কিকা	৯৭৩
৬৮। হাইড্রোকোটাইল্ অসিয়াটিকা	৯৭৫
৬৯। ম্যাঞ্চেনা	৯৭৭
। অরালিয়া রেসিমোসা	৯৮০
৭১। ব্যাডার্যাগা	৯৮২
৭২। গ্যাথোজিয়া (গামিগাটি)	৯৮৫
৭৩। অরানিয়া ডায়েডিসা	৯৮৭
৭৪। অষ্টিলেগো মেইডিস্	৯৮৯
৭৫। পিটোসেলিনাম্	৯৯১
৭৬। এরাম্ ট্রিকিলাম্	৯৯৩
৭৭। অস্মিয়াম্ টেট্রাক্সাইড্	৯৯৫
৭৮। সেলিনিয়াম্	৯৯৮
৭৯। গ্রাটিয়োনা অফিসিনেলিস্ ১০০১	
। পেরিডিয়াম্ কিউ-	
রেস্তাবিকাম্	১০০৩
। বাইবার্গাম্ অপিউলাস্	১০০৬
। জিজিবার	১০১০
। মেকাইটিস্ আমেরিকেনা	১০১৩
। কর্ণাস্ ফোরিডা	১০১৫
। কর্ণাস্ সার্বিনেটাস্	১০১৭

বিষয়	পৃষ্ঠা
৮০। ইলেক্টেরিয়াম্	১০২০
৮১। সাইমেজ্ লেক্টুলেরিয়াম্	১০২১
৮৮। রিসিনাস্ কমিউনিস্	১০২২
৮৯। রোবিনিয়া	১০২৩

চিকিৎসা প্রবেশিকা

ঔষধের আভ্যন্তরিক প্রয়োগ	
দ্বারা চিকিৎসার উপযোগী	
রোগ সমূহ	১০২৫
ঔষধের বাহ্য প্রয়োগ দ্বারা	
চিকিৎসার উপযোগী রোগ	
সমূহ	১০৮৪
রোগ চিকিৎসার সহায়-	
কারী আনুমানিক উপায়	১০৯৪
পরিশিষ্ট :-	
বাহ্য প্রয়োগের ঔষধের	
ব্যবহার বিচার	১০৯৭
মালিসের ঔষধ প্রস্তুতের	
নিয়মাবলী	১১০৬
ঔষধের ব্যক্তের আবশ্যিকতা এবং	
অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ঔষধের	
তালিকা	১১১১

হোমিওপ্যাথিক ঔষজ্যসোপানের উপক্রমণিকা ।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ প্রস্তুত করার সংক্ষিপ্ত নিয়মাবলী ।*

গোঁহার হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসা প্রণালী সম্বন্ধে কিছুই জ্ঞাত নহেন, তাঁহাদিগের সুবিধার জন্য বলা আবশ্যক যে, হোমিওপ্যাথিক ঔষধ চারি প্রকারে প্রস্তুত ও ব্যবহৃত হইয়া থাকে । যথা,-(১) মূল, আদত বা অমিশ্র আরোক বা মাদার টিংচার (Mother Tincture) ; (২) মিশ্র আরোক বা ডাইলুশন (Attenuated Tincture or Dilution) ; (৩) ঔষধ মিশ্রিত ক্ষুদ্র বা বড় বটিকা (Medicated Globules or Pilules) ; (৪) ঔষধের গুঁড়া বা ট্রাইটুরেশন্, (Trituration) ।

-(১) মূল, আদত, অমিশ্র আরোক বা মাদার টিংচার (Mother Tincture) । বৃক্ষ, বৃক্ষের বাকল, লতা, পাতা ডাঁটা ও শিকড়, ফুল, ফল ইত্যাদি কাঁচা হইলে থেঁতলিয়া এবং শুকনা হইলে গুঁড়া করিয়া উহার এক-ভাগ, যে প্রকার স্পিরিট প্রয়োজন উহার ৯ ভাগে ভিজাইয়া একটী বোতলে লইয়া বোতলের কাক আঁটিয়া অন্ততঃ ১৪ দিবস ভিজাইয়া রাখিবে এবং প্রতি-দিন একবার প্রাতে এবং একবার বৈকালে বোতলটী ভালরূপে ঝাকিবে । ১৪ দিবস পর উক্ত প্রকারে ভিজান ঔষধগুলি পরিষ্কার স্থতার কাপড় দ্বারা ছাকিয়া লইয়া ছাকা ঔষধ অত্র একটী পরিষ্কার বোতলে ভরিয়া বোতলের কাক আঁটিয়া অন্ততঃ ২৪ ঘণ্টা উল্কাবস্থায় রাখিবে এবং তৎপর উক্ত প্রকারে কাপড়ে ছাকা ঔষধ সাদা ব্লটিং কাগজ (White blotting paper) দ্বারা ছাকিয়া লইলে মূল, আদত আরোক বা মাদার টিংচার (Mother Tincture) প্রস্তুত হইয়া থাকে । মূল বা আদত আরোক একটী বোতলে ভরিয়া বোতলের

* এই গ্রন্থে কেবল ব্রিটিশ হোমিওপ্যাথিক ফার্মাকোপিয়ার নিয়মানুসারেই ঔষধ প্রস্তুতির নিয়মাবলী লিখিত হইল ।

কাক ভালরূপে আঁটিয়া রাখিবে এবং যদি কয়েক দিন পর বোতলের মধ্যে, আরোকের নীচে, কোন প্রকার তলানি (Sediments) পড়ে, তবে উহা পুনরায় সাদা ব্লটিং কাগজ দ্বারা ছাকিয়া লইবে। সকল ঔষধের মূল আরোক এক প্রকার স্পিরিটে প্রস্তুত হয় না। হোমিওপ্যাথিক ঔষধ প্রস্তুত করিবার জন্য যে কএক প্রকার স্পিরিট প্রয়োজন তাহা পশ্চাৎ লিখিত হইল এবং যে ঔষধের মূল আরোক যে প্রকার স্পিরিটে প্রস্তুত হইয়া থাকে, তাহাও মূল গ্রন্থে প্রত্যেক ঔষধের বিবরণের সর্ব প্রথমে বিশেষ রূপে লিখিত হইয়াছে।

(২) মিশ্র আরোক বা ডাইলুশন (Attenuated Tincture or Dilution)। মিশ্র আরোক দুই প্রকার নিয়ম বা পরিমাণে প্রস্তুত হইয়া থাকে। (১) দশমিক নিয়ম বা পরিমাণে (Decimal scale), (২) শততমিক নিয়ম বা পরিমাণে (Centesimal scale)। (১) দশমিক নিয়ম বা পরিমাণ। মূল আরোকের ১ ফোঁটা এবং যে প্রকার স্পিরিটে মূল আরোক প্রস্তুত হইয়াছে তাহার ৯ ফোঁটা একটী পরিষ্কার শিশিতে লইয়া শিশির কাক আঁটিয়া ১০৬০ বার ভালরূপে ঝাকিলে ১ম দশমিক (1st. Decimal) ক্রমের আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে। ১ম দশমিক ক্রমের আরোক ১ ফোঁটা এবং যে প্রকার স্পিরিট প্রয়োজন * তাহার ৯ ফোঁটা একটী শিশিতে লইয়া শিশির কাক আঁটিয়া শিশিটা ১০৬০ বার ভালরূপে ঝাকিলে ২য় দশমিক ক্রমের আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই নিয়মে যত ইচ্ছা তত দশমিক ডাইলুশন প্রস্তুত করা যাইতে পারে। ৩য় ডাইলুশন প্রস্তুত করিতে হইলে, কতকগুলি ঔষধ ব্যতীত (মূল গ্রন্থে উক্ত ঔষধ গুলি দ্রষ্টব্য) রেকটিফাইড স্পিরিটে প্রস্তুত করা যাইতে পারে। ১২ ডাইলুশন অপেক্ষা অধিক ডাইলুশন শততমিক (Centesimal) নিয়ম বা পরিমাণে প্রস্তুত করিতে হয়। (২) মূল আরোক হইতে শততমিক নিয়ম বা পরিমাণে ডাইলুশন প্রস্তুত করিতে হইলে কোন একটী ঔষধের মূল আরোক ১ ফোঁটা এবং যে প্রকার স্পিরিটে মূল আরোক প্রস্তুত হইয়াছে তাহার ৯৯ ফোঁটা একটী শিশিতে লইয়া শিশির কাক আঁটিয়া ১০৬০ বার ভালরূপে ঝাকিলে ১ম

* ২য় এবং ৩য় ক্রমের আরোক প্রস্তুত করার জন্য কোন কোন প্রকারের স্পিরিট প্রয়োজন তাহা পশ্চাৎ লিখিত হইয়াছে।

শতভাগিক ক্রমের আরোক প্রস্তুত হয়। ১ম শতভাগিক ক্রমের আরোক ১ ফোঁটা এবং যে প্রকার স্পিরিট প্রয়োজন তাহার ৯৯ ফোঁটা একটি পরি-
কার শিশিতে লইয়া শিশির কাক আঁটিয়া ৫০৬০ বার ভাল রূপে ঝাকিলে।
২য় শতভাগিক ক্রমের আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে। উক্ত প্রণালীতে ৩য়
শতভাগিক ক্রম হইতে ১০০, ২০০, ৫০০, ১০০০, ২০০০ এবং ততোধিক
শতভাগিক ক্রমের আরোকও প্রস্তুত করা যাইতে পারে।

(৩) ঔষধ মিশ্রিত ক্ষুদ্র এবং বড় বটিকা (Medicated Globules and Pilules) কোন একটি চীনের বা কাঁচের বাটিতে যত পরিমাণ প্রয়োজন তত পরিমাণ অমিশ্র ক্ষুদ্র বা বড় বটিকা (Unmedicated Globules or Pilules) লইয়া যে ঔষধের যে ক্রমের বটিকা প্রয়োজন হয়, উহাতে সেই ক্রমের আরোক ঢালিয়া দিবে এবং বটিকাগুলি ভাল রূপে ভিজিলে, ভিজা বটিকাগুলি এক খানি পরিকার সাদা ব্লটিং কাগজে ঢালিয়া দিয়া ১০১৫ মিনিট পর্যন্ত উহাকে বহির্কায়ুতে আপনা আপনি শুকাইতে দিবে। স্বর্ষের উত্তাপে বটিকা শুকান নিষিদ্ধ। যথাঃ—একোনাইটের ৬ষ্ঠ ক্রমের বটিকা প্রয়োজন হইলে কোন একটি চীনের বা কাঁচের ক্ষুদ্র বাটিতে যত পরিমাণ প্রয়োজন তত পরিমাণ অমিশ্র বটিকা লইয়া উহাতে একোনাইট ৬ষ্ঠ ক্রমের আরোক এমন কএক ফোঁটা ঢালিয়া দিবে যাহাতে বটিকাগুলি ভালরূপে ভিজিতে পারে। উক্ত প্রকারে ভিজা বটিকাগুলি একখানি সাদা ব্লটিং কাগজে ঢালিয়া দিয়া বহির্কায়ুতে ভাল রূপে শুকাইলে উহা একটা কাক আঁটা শিশিতে ভরিয়া রাখিবে। ঔষধ মিশ্রিত ক্ষুদ্র বা বড় বটিকা প্রস্তুত করার সময় স্মরণ রাখা উচিত যে, যে সকল ঔষধের আরোক (মূল আরোকই হউক বা মিশ্র আরোকই হউক) আবসোলিউট আলকোহল বা রেফটিকাইড স্পিরিটে প্রস্তুত হয়, কেবল সেই সকল ঔষধের আরোকেরই ক্ষুদ্র বা বড় মিশ্রিত বটিকা ভাল রূপে প্রস্তুত হইয়া থাকে। যে সকল ঔষধ চূরান জল (Distilled water) মিশ্রিত স্পিরিটে (যথা ফ্রক স্পিরিট, ২০° ডিগ্রী ওবার ফ্রক স্পিরিট, ৪০° ডিগ্রী ওবার ফ্রক স্পিরিট ইত্যাদি) প্রস্তুত হয়, সে সকল আরোকের ক্ষুদ্র বা বড় বটিকা ভাল প্রস্তুত হয় না। কারণ, জলে বটিকা দ্রব হয় না গুলিয়া যায়।

(৪) ঔষধের গুঁড়া বা ট্রাইটুরেশন্ (Trituration) । যে সকল ঔষধ খালি জল বা স্পিরিটে সহজে দ্রব না হয়, সে সকল ঔষধই এই প্রণালীতে প্রস্তুত হইয়া থাকে । সিমিয়া, লাইলিসিয়া, মার্কিউরিয়ান্, অরাম্, মেটেলিকাম্, ব্যারাইটা কার্বোনিকা, ক্যাকেরিয়া কার্বোনিকা, কুপ্রাম্, মেটেলিকাম্ ইত্যাদি উক্ত প্রকার ঔষধের উদাহরণ । আরোকের জায় ঔষধের গুঁড়াও দশমিক এবং শততমিক নিয়ম বা পরিমাণে প্রস্তুত হইয়া থাকে । মূল বা আদত ঔষধের ১ গ্রেইণ এবং ৯ গ্রেইণ সুগার অব্ মিল্ক (Sugar of Milk) কোন একটী খলে লইয়া ২০।৩০ মিনিট ভালরূপে ঘুঁটিলে ১ম দশমিক ক্রমের গুঁড়া বা ট্রাইটুরেশন্ (Trituration) প্রস্তুত হইয়া থাকে । ১ম দশমিক ক্রমের গুঁড়ার ১ গ্রেইণ এবং ৯ গ্রেইণ সুগার অব্ মিল্ক একটী খলে লইয়া ২০।৩০ মিনিট ভালরূপে ঘুঁটিলে ২য় দশমিক ক্রমের গুঁড়া প্রস্তুত হইয়া থাকে । এই প্রণালীতে ৩য়, ৪র্থ, ৫ম এবং ততোধিক দশমিক ক্রমের গুঁড়াও প্রস্তুত করা যাইতে পারে । আবার মূল বা আদত ঔষধের ১ গ্রেইণ এবং ৯৯ গ্রেইণ সুগার অব্ মিল্ক একটী খলে লইয়া ২০।৩০ মিনিট ভালরূপে ঘুঁটিলে ১ম শততমিক ক্রমের গুঁড়া প্রস্তুত হইয়া থাকে । ১ম শততমিক ক্রমের গুঁড়ার ১ গ্রেইণ এবং ৯৯ গ্রেইণ সুগার অব্ মিল্ক একটী খলে লইয়া ২০।৩০ মিনিট ভালরূপে ঘুঁটিলে ২য় শততমিক ক্রমের গুঁড়া প্রস্তুত হইয়া থাকে । এই প্রকার ৩য়, ৪র্থ, ৫ম এবং ততোধিক শততমিক ক্রমের গুঁড়াও প্রস্তুত হইতে পারে । ইহা স্মরণ থাকা উচিত যে, ঔষধগুলি রীতিমত ২।৩ বর্গ কাল ঘুঁটিলে ভাল হয় ।

গুঁড়া হইতে আরোক প্রস্তুত করিবার নিয়ম । পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, যে সকল ঔষধ স্পিরিট বা জলে সহজে দ্রব না হয়, সে সকল ঔষধেরই গুঁড়া প্রস্তুত হইয়া থাকে । ঔষধের গুঁড়া প্রস্তুতের নিয়ম পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে । গুঁড়া হইতে আরোক প্রস্তুত করিতে হইলে ৬ষ্ঠ দশমিক বা ৩য় শততমিক ক্রমের গুঁড়ার ১ গ্রেইণ একটা পরিষ্কার শিশিতে লইয়া উহাতে প্রথমতঃ ৫০ ফেঁটা (মিনিম) 'চ্যুয়ান জল' (Distilled Water) মিলাইয়া শিশির কাক আঁটিয়া শিশিটি ৫০।৬০ বার ভালরূপে ঝাকিবে এবং ঔষধটি ভালরূপে দ্রব হইতে উহাতে ক্রমে ক্রমে ৫০ ফেঁটা (মিনিম) রেক্টি-

ফাইড্ স্পিরিট্ মিশাইয়া কাক আঁটিয়া শিশিট পুনরায় ৫০।৬০ বার ভাল-
রূপে বাকিলে ৪র্থ শততমিক ক্রমের আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে । ৪র্থ
শততমিক ক্রমের আরোক ১ ফোঁটা ৯৯ ফোঁটা প্রফ্ স্পিরিটে মিশাইয়া
একটা কাক আঁটা শিশিতে লইয়া ৫০।৬০ বার ভালরূপে বাকিলে ৯ম দশ-
মিক ক্রমের আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে । ৫ম শততমিক ক্রমের আরোক
যথানিয়মে রেক্টিফাইড্ স্পিরিটে প্রস্তুত হইয়া থাকে । এই প্রকারে ২ষ্ঠ, ৭ম
হইতে ১০০, ২০০, ৫০০ এবং ততোধিক শততমিক ক্রমের আরোকও প্রস্তুত
হইয়া থাকে ।

ঔষধ রাখিবার নিয়ম । ঔষধ প্রস্তুত করিয়া পরিকার শিশিতে
পুত্রিয়া কাকের উপর ঔষধের সংক্ষিপ্ত নাম ও ক্রমের সংখ্যা এবং ঔষধের
সম্পূর্ণ নাম ও ক্রমের সংখ্যা, ঔষধ দশমিক কিম্বা শততমিক নিয়মানুসারে
প্রস্তুত করা হইয়াছে তাহা, স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শিশির গায় লেবেল (Label)
গোঁদ দিয়া আঁটিয়া রাখা উচিত । পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ঔষধ দশমিক
এবং শততমিক নিয়মে প্রস্তুত হইয়া থাকে । দশমিক এবং শততমিক নিয়মে
প্রস্তুত করা ঔষধের শিশির গায় লেবেলের চিহ্ন নিম্নলিখিতরূপে লিখিয়া
রাখিতে হয় । শিশির লেবেলের গায়ে ঔষধের নামের পশ্চাৎ ০ বা ৫ চিহ্ন
থাকিলে ঔষধের মূল, আদত আরোক বা মাদার টিংচার (Mother Tincture)
বুঝায় । যথা একোনাইট্ রাডিক্স্ ০ বা ৫ = একোনাইট্ রাডিক্সের মূল
আরোক (Aconite Rad., Mother Tincture) । ঔষধের নামের পশ্চাৎ,
ক্রমের সংখ্যার পর (দ) বা (x) চিহ্ন থাকিলে দশমিক ক্রম বুঝায় । যথা,-
একোনাইট্ রাডিক্স্ ১দ বা ১x ডাঃ = একোনাইট্ রাডিক্স্ ১ম দশমিক
ক্রমের আরোক বা ডাইলুশন (Aconite Rad. 1x) । ঔষধের সংখ্যার
পশ্চাৎ (শ) বা (.) চিহ্ন থাকিলে উহাতে শততমিক ক্রম বুঝাইবে । যথা,-
একোনাইট্ রাডিক্স্ ১শ বা ১. ডাঃ = একোনাইট্ রাডিক্স্ ১ম শততমিক
ক্রমের আরোক বা ডাইলুশন (Aconite Rad. 1.) ।

ঔষধ রাখা সম্বন্ধে সাবধানতা । ঔষধের শিশিতে কাক ভালরূপে
আঁটিয়া রাখিবে । যে আল্‌মারি বা বাক্সে কোন প্রকারের তীব্র গন্ধ
বিশিষ্ট দ্রব্য থাকে, অথবা আতর, লেবণ্ডার, ওডিকলন ইত্যাদি সুগন্ধযুক্ত

দ্রব্য থাকে, তাহাতে ঔষধ রাখিবে না। কপূর অনেক হোমিওপ্যাথিক ঔষধের প্রতিষেধক (Antidoto)। অতএব উহা কোন ঔষধের সঙ্গে রাখা অসুচিত। ঔষধের আলুয়ারি বা বাজ শুক ঘরে রাখিবে এবং উহার মধ্যে বাহ্যতে বাস্তবিক উত্তাপ বা আর্দ্র বাতাস না লাগে সে সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হওয়া কর্তব্য। প্রত্যেক ঔষধের শিশির গায় লেবেলের (Label) উপর ঔষধের সম্পূর্ণ নাম ও ক্রমের সংখ্যা এবং কাকের উপর ঔষধের সংক্ষিপ্ত নাম ও ডাইলুশন স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া রাখা কর্তব্য। আরোকই হউক, বটিকা বা গুঁড়াই হউক, উহা ঢালিবার সময় ঔষধে হাত লাগাইবে না। বটিকা বা গুঁড়া হইলে ঔষধ একখানি কাগজে ঢালিয়া অথবা একখানি পরিষ্কার কাগজ দ্বারা মুখে ঢালিয়া দিবে। ঔষধ ঢালিবার পর যদি ঔষধে হাত লাগে, তবে উহা পুনরায় শিশিতে রাখিবে না। আরোক ও অঙ্গুলী দ্বারা ঢালিয়া দিবে না। শিশির কাক বা ড্রপ্‌কন্ডাক্টর (Drop-conductor) নামক কাঁচ নির্মিত যন্ত্র দ্বারা ঔষধ ঢালিয়া দিবে। ঔষধ নিশ্চিত ক্ষুদ্র বা বড় বটিকা অথবা গুঁড়া হস্তীদন্ত নির্মিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চাম্চ (Globule, Pilule or Trituration Ivory spoons) দ্বারাও ঢালিয়া লওয়া যাইতে পারে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ৪ প্রকারে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা:—(১) মূল, আদত আরোক বা মাদার টিংচার (Mother Tincture); (২) মিশ্র আরোক (Attenuated Tincture or Dilution); (৩) ঔষধ মিশ্রিত ক্ষুদ্র বা বড় বটিকা (Medicated Globules or Pilules); (৪) ঔষধের গুঁড়া (Trituration)। অতএব ব্যবস্থা পত্র লিখিতে হইলে অথবা কোন ঔষধালয় হইতে পত্র দ্বারা ঔষধ ক্রয় কবিয়া আনা হইতে হইলে নিম্ন লিখিত নিয়মে লিখিতে হয়। যথা; (১) একোনাইট্‌ রাডিক্স্‌ মূল আরোক প্রয়োজন হইলে একোনাইট্‌ রাডিক্স্‌ ০ বা ϕ (Aconite Rad. 0 or ϕ) এরূপ লিখিতে হয়। (২) একোনাইট্‌ রাডিক্স্‌ ৬ষ্ঠ দশমিক ক্রমের আরোক প্রয়োজন হইলে, একোনাইট্‌ রাডিক্স্‌ ৬ বা \times (Aconite Rad. 6x) এরূপ লিখিতে হয়। (৩) একোনাইট্‌ রাডিক্স্‌ ৬ষ্ঠ বা \times , প্রঃ = একোনাইট্‌ রাডিক্স্‌ ৬ষ্ঠ দশমিক ক্রমের আরোক মিশ্রিত ক্ষুদ্র বটিকা বা গ্লোবুল্‌স্‌ (Globules)। একোনাইট্‌ রাডিক্স্‌ ৬ষ্ঠ বা \times , পিঃ = একোনাইট্‌

রাডিয়ন্ ৬ষ্ঠশতমিক ক্রমের আরোক মিশ্রিত বড় বটিকা বা পিলিউলন্ (Pilules); (৪) ক্যালকেরিয়া কার্বোনিকা ৩শ বা ৩× ট্রাঃ=ক্যালকেরিয়া কার্বোনিকা ষষ্ঠশতমিক ক্রমের গুঁড়া বা ট্রাইটুরেশন (Trituration)। শততমিক ক্রমের ঔষধ ব্যবস্থা করিতে হইলে নিম্ন লিখিত নিয়মে লিখিতে হয়। যথা,—(১) একোনাইট্ রাডিয়ন্ ৬শ বা ৬.=একোনাইট্ রাডিয়ন্ ৬ষ্ঠ শততমিক ক্রমের আরোক। (২) একোনাইট্ রাডিয়ন্ ৬শ বা ৬. গ্ঃ=একোনাইট্ রাডিয়ন্ ৬ষ্ঠ শততমিক ক্রমের আরোক মিশ্রিত ক্ষুদ্র বটিকা বা গ্লোবুলন্ (Globules)। একোনাইট্ রাডিয়ন্ ৬শ বা ৬. পিঃ=একোনাইট্ রাডিয়ন্ ৬ষ্ঠ শততমিক ক্রমের আরোক মিশ্রিত বড় বটিকা বা পিলিউলন্ (Pilules); (৩) ক্যালকেরিয়া কার্বোনিকা ৩শ বা ৩. ট্রাঃ=ক্যালকেরিয়া কার্বোনিকা ষষ্ঠ শততমিক ক্রমের গুঁড়া বা ট্রাইটুরেশন (Trituration)।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ প্রস্তুত করিবার

জ্ঞাত কি কি দ্রব্য আবশ্যক।

(১) জল। হোমিওপ্যাথিক ঔষধ প্রস্তুত করিতে কেবল অকৃত্রিম পরিষ্কৃত বা চূয়ান জলই (Distilled water) ব্যবহার্য। কেবল কাঁচ এবং চীনের যন্ত্রে চূয়ান জলই ব্যবহার্য। ধাতু নির্মিত যন্ত্রে চূয়ান জল হোমিওপ্যাথিক ঔষধ প্রস্তুতে ব্যবহার নিষিদ্ধ। অকৃত্রিম বা খাঁটি চূয়ান জলে কোনও রঙ্গ থাকে না, স্বাদ থাকে না এবং গন্ধ থাকে না ও উহাতে নাইট্রেট্ অফ্ সিল্ভার (Nitrate of silver) ঢালিয়া দিলে জলের রঙ্গের কোন পরিবর্তন হয় না বা উহা ঘোলাটিয়া হয় না।

(২) আলকোহল্ (Alcohol)। হোমিওপ্যাথিক ঔষধ প্রস্তুত করার জ্ঞাত যত প্রকারের দ্রব্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তন্মধ্যে আলকোহল্ সর্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয়। অতএব উহা প্রস্তুত বা ক্রয় করা সৰ্ব্বদে বিশেষ সাবধান হইয়া উচিত। সন্দেহ দূর করার জ্ঞাত কোন এক বিশুদ্ধ স্পিরিট বিক্রেতার দোকান হইতে ৬০° ডিগ্রী ওয়ার প্রুফ্ (60° Over-proof Spirit) ক্রয় করিবার্থা নিয়মে পুনরায় চূয়াইয়া লওয়া উচিত। খাঁটি

আল্‌কোহল্‌ রঙ্গ হীন, স্বচ্ছ, খোলা পাত্রে রাখিলে সহজে বা অল্প সময়ের মধ্যেই উড়িয়া যায় এবং আশুপ্ণে সহজে জলিয়া উঠে। ইহার ভাগ মিষ্ট এবং জিহ্বায় লাগিলে পুড়িয়া যাওয়ার ভায় জ্বালায় উদ্বেক হয়। পোড়াইলে নীল বর্ণের আলোক হয় এবং উহা হইতে কোন প্রকারের বাষ্প বা ধূম নির্গত হয় না। ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব ০.৮২৯৮। চূয়ান জলের সঙ্গে মিশ্রিত করিলে ইহা স্বচ্ছ বা পরিষ্কারই থাকে বা উচ্চ ঘোলাটিয়া হয় না।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ প্রস্তুত করার জন্য যে একত্র প্রকারের স্পিরিট প্রয়োজন তাহার প্রস্তুতের নিয়মাবলী নিম্নে লিখিত হইল। যথা :—

(১) যত পরিমাণ রেক্টিফাইড্ স্পিরিট (৬০° ডিগ্রী ওবার প্রফ্ স্পিরিট্ (60° Over proof Spirit), উহাতে তত পরিমাণ চূয়ান জল (Distilled water) মিশাইলে ডাইলুট্ স্পিরিট্ (Dilute spirit) প্রস্তুত হয়। (২) রেক্টিফাইড্ স্পিরিট্ ৫ ভাগের সঙ্গে ৩-২ ভাগ চূয়ান জল মিশাইলে প্রুফ্ স্পিরিট্ (Proof spirit) প্রস্তুত হইয়া থাকে। (৩) ৬ ভাগ রেক্টিফাইড্ স্পিরিটে ২ ভাগ চূয়ান জল মিশাইলে ২০° ডিগ্রী ওবার প্রফ্ স্পিরিট্ (20° Over proof spirit) প্রস্তুত হয়। (৪) ৭ ভাগ রেক্টিফাইড্ স্পিরিটে ১ ভাগ চূয়ান জল মিশাইলে ৪০° ডিগ্রী ওবার প্রফ্ স্পিরিট্ (40° Over proof spirit) প্রস্তুত হয়। ৬০° ডিগ্রী ওবার প্রফ্ স্পিরিট্ কেই (60° Over proof spirit) রেক্টিফাইড্ স্পিরিট্ (Rectified spirit) বলে। (৫) আব্‌সোলিউট্ আল্‌কোহলের (Absolute Alcohol)। অনেক ঔষধ প্রস্তুত করার জন্য আব্‌সোলিউট্ আল্‌কোহলের ঘনত্ব (Density) ০.৭৯৫ হওয়া আবশ্যক। রেক্টিফাইড্ স্পিরিট্ এবং আব্‌সোলিউট্ আল্‌কোহল্‌ কোন এক বিখ্যস্ত স্পিরিট্ প্রস্তুত কারীর দোকান হইতে ক্রয় করা উচিত। নতুবা প্রতারণিত হওয়া সম্ভব নহে। আব্বার ভাল চূয়ান স্পিরিট্ না হইলে হোমিওপ্যাথিক ঔষধের গুণ নষ্ট হইয়া থাকে এবং ঔষধ প্রয়োগে কোনও উপকার দর্শে না।

মূল আরোক বা মাদার টিংচার (Mother Tincture) হইতে ডাইলুশন প্রস্তুত করিবার জন্য কোন প্রকার স্পিরিট্ প্রয়োজন তাহা নিম্নে লিখিত হইল। (১) যে ঔষধের মূল আরোক প্রফ্ স্পিরিটে প্রস্তুত হয়, উহার ১ম

দশমিক ক্রমের আরোক প্রফ্ স্পিরিটে, ২য় দশমিক ক্রমের আরোক ২০° ডিগ্রী ওবার প্রফ্ স্পিরিটে এবং ৩য় ও ততোধিক দশমিক ক্রমের আরোক রেক্টফাইড্ স্পিরিটে প্রস্তুত হইয়া থাকে। (২) যে সকল ঔষধের মূল আরোক ডাইলুট্ স্পিরিটে প্রস্তুত হয়, উহার ১ম দশমিক ক্রমের আরোক ডাইলুট্ স্পিরিটে, ২য় দশমিক ক্রমের আরোক প্রফ্ স্পিরিটে, ৩য় দশমিক ক্রমের আরোক ২০° ডিগ্রী ওবার প্রফ্ স্পিরিটে এবং ৪র্থ ও ততোধিক দশমিক ক্রমের আরোক রেক্টফাইড্ স্পিরিটে প্রস্তুত হইয়া থাকে। (৩) যে সকল ঔষধের মূল আরোক ২০° ডিগ্রী ওবার প্রফ্ স্পিরিটে প্রস্তুত হয়, উহার ১ম দশমিক ক্রমের আরোক ২০° ডিগ্রী ওবার প্রফ্ স্পিরিটে এবং ২য় ও ততোধিক দশমিক ক্রমের আরোক রেক্টফাইড্ স্পিরিটে প্রস্তুত হইয়া থাকে। (৪) যে সকল ঔষধের মূল আরোক রেক্টফাইড্ স্পিরিটে প্রস্তুত হয়, উহার সমুদয় ডাইলুশনই রেক্টফাইড্ স্পিরিটে প্রস্তুত হইয়া থাকে।

যে সকল ঔষধের মিশ্র আরোক চূরান জল দ্বারা প্রস্তুত হয়, সে সকল ঔষধ প্রস্তুত করার নিয়মাদি মূল গ্রন্থে প্রত্যেক ঔষধের বিবরণে দ্রষ্টব্য। ভিন্ন ভিন্ন ঔষধের প্রস্তুতের নিয়ম স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র। অতএব এই স্থলে উহার বিশেষ বিশেষ বিবরণ দেওয়া এক প্রকার অসম্ভব বলিলেও অত্যাশ্চর্য্য হয় না।

(৩) ইথার (Ether)। অতি কম সংখ্যক হোমিওপ্যাথিক ঔষধ প্রস্তুত করিতেই ইহার প্রয়োজন হইয়া থাকে। ইহা কোন এক বিশ্বস্ত হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয় হইতে ক্রয় করা উচিত। খাঁটি ইথারে রঙ্গ থাকে না, উহা সহজেই উড়িয়া যায় ও উহাতে সহজেই আগুণধরে বা উহা জলিয়া উঠে এবং উহার গন্ধ অত্যন্ত তীব্র ও এক বিশেষ প্রকৃতি বিশিষ্ট। ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব ০.৭১৫ হইতে ০.৭২০। শেষোক্ত আপেক্ষিক গুরুত্ব আদত ইথারেই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা পরিষ্কার কাঁচের ইপারদার বাতলে (Stoppered Bottle) রাখা কর্তব্য।

(৪) গ্লিসেরিন্ (Glycerine)। প্রাণীর বিষ ঔষধ প্রস্তুত করার জন্যই ইহা প্রয়োজন হইয়া থাকে। ইহা প্রায় সকল সম্ভ্রান্ত হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়েই ক্রয় করিতে পাওয়া যায়।

(৫) পরিশুদ্ধ সুগার অব্ মিক্ (Pure Sugar of milk) । যে সকল ঔষধের মূল আরোক প্রস্তুত না হয়, সে সকল ঔষধের মিশ্র গুঁড়া প্রস্তুত করিবার জন্যই প্রধানতঃ ইহা প্রয়োজন হইয়া থাকে । ইহা কোন এক বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধানয় হইতে ক্রয় করা উচিত । সুগার অব্ মিক্ খাঁটি হইলে উহাতে কোন প্রকারের গন্ধ থাকে না । আঙ্গুলে আঙ্গুলে রগুড়াইলে উহা বালি বর্ণের ছায় কর্কড়িয়া বলিয়া অনুভূত হয় । ইহার স্বাদ সামান্য মিষ্ট । ইহাতে জল মিশাইয়া জল দিবা তৎপর ঠাণ্ডা করিয়া উহাতে জল মিশ্রিত আয়োডিন্ মিশাইলে উহা নীলবর্ণ হয় না । পশ্চিদ্ধৃত জল না পাইলে সুগার অব্ মিক্ ঔষধ মিশাইয়া বোগীকে দেওয়ার জন্যও সুগার অব্ মিক্ প্রয়োজন হইতে পারে ।

(৬) ঔষধ প্রস্তুতের সময় ৩৪টী : বা ২ আউন্স পরিমাণের মেজার গ্লাস (Measure Glass), ৩৪টী মিনিম্ গ্লাস (Minimum measure glass), কাঁচ বা জাপান মাটির খল (Japan ware or glass Pestle and Mortar); একটী নিক্সি এবং ওজন (Scale and Weight) ঔষধ প্রস্তুতকারীর নিকট রাখা কর্তব্য । নিক্সির পল্লি (Pan) কাঁচ নির্মিত হইলেই ভাল হয় । কাটা যেন ঠিক ভাবে থাকে এরূপ দেখিয়া নিক্সি ক্রয় করা কর্তব্য । সাদা ব্লটিং কাগজ (White Blotting paper) ও কএকটি ছোট ছোট চিনের বা কাঁচের বাটি ইত্যাদি দ্রব্য গুলিও সম্মুখে রাখা উচিত । প্রত্যেক বার ঔষধ প্রস্তুত করিয়াই মেজার গ্লাসাদি কাঠের কয়লাব ছাই দিয়া ভালরূপে ধুইয়া ফেলা উচিত । গুঁড়া প্রস্তুত করিতে প্রত্যেক ঔষধের জন্য এক একটী স্বতন্ত্র খল রাখা উচিত এবং প্রত্যেকবার ঔষধ প্রস্তুত করিয়া খলটী গলনতঃ উষ্ণ জল এবং তৎপর ঠাণ্ডা জল দিয়া ভালরূপে ধুইয়া কোন একখানি পরিষ্কার তক্তার উপর উপুড় করিয়া রাখিবে এবং জল সরিয়া গেলে উহা একখানি পরিষ্কার কাপড় দ্বারা ভালরূপে মুছিয়া ফেলিয়া একটী স্পিরিট্ ল্যাম্প (Spirit Lamp) ততাইয়া শুকাইয়া যথাস্থানে রাখিবে । যে খলে যে ঔষধ ঘোঁটা হয়, উহাতে সেই ঔষধের নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া রাখা কর্তব্য ।

(৭) শিশি ও কর্ক (Phials and Corks) । হোমিওপ্যাথিক ঔষধ রাখিবার জন্য দুই প্রকার শিশি নির্মিত হয় । (১) টিউব শিশি (Tube

Phials) ; (২) মোল্ডেড্‌ শিশি (Moulded Phials)। উৎকৃষ্ট রকমের কাঁচ নির্মিত শিশিই হোমিওপ্যাথিক ঔষধ রাখিবার জন্য ব্যবহার করা উচিত। উৎকৃষ্ট রকমের বেল্‌বেট্‌ কক্‌ই (Velvet corks) হোমিওপ্যাথিক ঔষধের শিশিতে ব্যবহার্য। কাক গুলিতে কোন প্রকারের ছিদ্র থাকা অস্বীকৃত এবং কাকগুলি স্থিতিস্থাপক গুণ বিশিষ্ট হওয়া উচিত। ধারণ কর্কে ঔষধ নষ্ট হয়। এতদ্বির শিশির গায় এক প্রকার কাঁচের নল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উহাকে টিউব্‌ (Tube) বলে। উহা সচরাচর ঔষধ মিশ্রিত ক্ষুদ্র বা বড় বটিকা রাখিবার জন্যই অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ক্রয় সম্বন্ধে সাবধানতা। হোমিওপ্যাথিক ঔষধের মাত্রা অতি অল্প। এই অল্প মাত্রা ঔষধ কৃত্রিম হইলে যে রোগ চিকিৎসায় কোনও ফল দর্শিবে না তাহা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন। ঔষধ বিক্রেতা মিশ্র আরোক (ডাইলুশন,-Dilution) বা ঔষধ মিশ্রিত ক্ষুদ্র বা বড় বটিকা বা গুঁড়া বলিয়া কতক পরিমাণ স্পিরিট্‌, ঔষধ মিশ্রিত না করিয়া অমিশ্র ক্ষুদ্র বা বড় বটিকা বা স্ক্‌গার অব্‌ মিক্‌ (Unmedicated Globules, Pilules or Pure Sugar Milk) দিলেও এমন কোন রাসায়নিক উপায় নাই যদ্বারা উহার কৃত্রিমতা বুঝিতে পারা যায়। অতএব ঔষধ বলিয়া ঔষধ বিক্রেতা যাচা দিবেন (উহাতে ঔষধ থাকুক আর না থাকুক) ক্রেতা হয় উহাই লইবেন, নতুবা ফিরিয়া যাউন। এমতাবস্থায় হোমিওপ্যাথিক ঔষধ এমন কোন এক বিশস্ত ঔষধ বিক্রেতার ঔষধালয় হইতে লওয়া উচিত যেখানে উক্ত প্রকারে প্রচারিত হওয়ার সম্ভাবনা নাই। ঔষধে উক্ত প্রকারের কৃত্রিমতা হয় বলিয়া প্রায় সমুদয় ধর্ম্য ভিক্‌ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকই লণ্ডন, আমেরিকা এবং জার্মেনী হইতে ঔষধাদি আনাইরা। টুইংস্‌ ভাইলুশনাদি আপন হস্তে প্রস্তুত করিয়া আপন বাড়ীতে রাখেন এবং বোগী দেখিতে যাওয়ার সময় সচরাচর প্রয়োজনীয় কতকগুলি ঔষধ সহ একটী বাগ্‌ সঙ্গে লইয়া বোগীগণকে উক্ত বাগ্‌ হইতেই ঔষধাদি দিরা থাকেন। ঔষধের কৃত্রিমতা ব দ্রুপ যে কত লোকের কত অনিষ্ট বা অকালে মৃত্যু হয় এবং কত চিকিৎসকের অপূরণ হয় তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

ঔষধের ডাইলুশন বিচার । কোন্ কোন্ ঔষধেব কোন্ কোন্ ডাইলুশন কোন্ কোন্ রোগে ব্যবহার করা কৰ্ত্তব্য সে সম্বন্ধে কিছুই নিশ্চিতরূপে বলা যায়তে পারে না । ইহা চিকিৎসা বিবরণে বহুদর্শীতার উপর অনেকটা নির্ভর করে । ভরূপ রোগে সাধারণতঃ ১, ৩, ৬, ১২ ডাইলুশন ব্যবহৃত । প্ৰাচীন রোগে ৩০, ১০০, ২০০, ৫০০, ১০০০ ডাইলুশন ব্যবহার্য । আবার অনেক সময় দেখা যায় যে অনেক রোগীর তখন অল্পে ৩০, ১০০, ২০০ ইত্যাদি ডাইলুশনের ২১২ মাত্রায় যেকোন উপকার দর্শে, ১, ৩, ৬, ১২ ডাইলুশনে সেরূপ উপকার দর্শে না । আবার অনেক প্ৰাচীন রোগের চিকিৎসায় ১, ৩, ৬, ১২ ডাইলুশনে যে প্রকার উপকার দর্শে ৩০, ১০০, ২০০ ইত্যাদি ডাইলুশনে সেরূপ উপকার দর্শে না । হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসা আবস্ত কবিতা লেখক প্রায়ই বৎসরকাল ভ্রষ্ট ক্রম অপেক্ষা অধিক উচ্চ ক্রম প্রায়ই ব্যবহার করিতেন না, কারণ, তখন তাঁহার ঔষ্ধ অপেক্ষা উচ্চ ক্রমে বিশ্বাস ছিল না । কিন্তু তৃতীয় বৎসর হইতেই তাঁহার উচ্চ মতে পরিবর্তন হওয়ায় তিনি মধ্যম এবং উচ্চ ক্রম ব্যবহার কৰিতে আরম্ভ করেন । ক্রমে উচ্চ ক্রমের উপর তাঁহার এত দৃঢ় বিশ্বাস হইয়া পড়িয়াছে যে, এইক্রম অতি কম সংখ্যক রোগীর চিকিৎসায়ই তিনি ১২ ডাইলুশন অপেক্ষা নিম্ন ক্রম ব্যবহার করিয়া থাকেন । মূল গ্রন্থে ঔষধেব বিবরণেব শেষ ভাগে ডাইলুশন বিচার শীর্ষ দিয়া সাহা লিখিত হইয়াছে তাহা অনেকটা লেখক এবং ইউরোপ ও আমেরিকায় অনেকানেক সুপ্রসিদ্ধ বহুদর্শী হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকেব চিকিৎসার ফল অনুসারে লিখিত হইয়াছে । অতএব উহা দ্বারা পাঠকের অনেক সাহায্য হইলেও হইতে পারে । বাহাৰা ইংবেলী ভাষা জানেন, তাঁহারা ডাক্তার হিউজের ম্যানুয়েল অব্ কাইনোকোডিনেমিক্স (Manual of Pharmacodynamics by Dr. R Hughes) এবং ডাক্তার আণ্ডার উডের ডিফারেন্সিয়াল পটেন্সি অফ্ ড্রাগস্ (Differential Potencies by Dr. Underwood) নামক গ্রন্থগুলি পাঠ করিতে পারেন । উক্ত গ্রন্থগুলি পাঠ করিলে ঔষধের ডাইলুশন বিচার সম্বন্ধে অনেকটা জ্ঞানিতে পারা যায় ।

হোমিওপ্যাথি কাহাকে বলে । “এই শব্দের যে ঔষধসেবন

করিয়া সে সকল লক্ষণ বা উপদ্রব প্রকাশ পায়, সে সকল বা উহার প্রায় সম-
লক্ষণ বা উপদ্রব বিশিষ্ট রোগ সেই ঔষধ দ্বারা অনায়াসে বা সহজে, নির্দ্বিগ্নে
এবং সম্পূর্ণরূপে স্থায়ী হয়”, এই মতকেই হোমিওপ্যাথি বা “সিমিলিয়া
সিমিলিভাস্ কিউরেন্টার” (Similia Similibus Curantur) বলে। যথা:—
হুহ শরীরে বেলাডোনা নামক ঔষধ পাইলে মস্তিষ্কে রক্তাধিকা বা রক্তা-
বরোধ, দপদ্পিয়া শিরঃপীড়া, মুখমণ্ডল এবং চক্ষু লাল বর্ণ, গ্রীবার ধমনির
দপদ্পানি, চক্ষে অব্যাক লাগা বা আলোক সহ্য না হওয়া, নাড়ী ক্ষুদ্র এবং
ক্রান্তগামী, প্রস্রাব, ঘূমের ঘোরে চমকিয়া বা লাকাইয়া উঠা, পিপাসা
এবং অনবরত মুখ এবং গলায় মধ্য শুকাইয়া যাওয়া, শবীরের কোন কোন
স্থানে প্রদাহ এবং তন্দ্রকণ আক্রান্ত হইল অত্যন্ত লাল বর্ণ হওয়া ও উহাতে
টাটানি ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়। অতএব যদি কোন রোগে উক্ত
লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়, তবে উক্ত রোগের পক্ষে বেলাডোনাই প্রকৃত ঔষধ
এবং এই ঔষধ সেবনেই রোগ “অনায়াসে বা সহজে, নির্দ্বিগ্নে এবং সম্পূর্ণ-
রূপে” সাবিয়া যায়। উক্ত প্রকারে ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা রোগ চিকিৎসা
প্রথাটিকেই “হোমিওপ্যাথি” বলে।

ঔষধ মনোনীত করার নিয়ম সম্বন্ধে একটী কথা। বিকৃত
লক্ষণ সমষ্টিকে “রোগ” বলা যায় (“Totality of symptoms con-
stitute a disease”)। এই বিষয়টী স্মরণ থাকিলে, সকল রোগের চিকিৎ-
সায়ই সহজে ঔষধ মনোনীত করা বাইতে পারে, হানিমান একরূপ বলিয়া
গিয়াছেন। হানিমান যাহা বর্ণনাগিয়াছেন তাহা সত্য এবং এই কথার
সত্যানুসারীতমত শিক্ষিত চিকিৎসক মাত্রই বুঝিতে পারেন। “লক্ষণ”
এই শব্দে কেবল বাহ্যিক লক্ষণ বুঝায় না। ইহাতে আভ্যন্তরিক যন্ত্রের
বিকৃতাবস্থাই অধিক বুদ্ধিমান। বাহ্যিক লক্ষণগুলি, আভ্যন্তরিক যন্ত্রাদির বিকৃতা-
বস্থা বাহ্যিক বিকাশের ফল মাত্র। অতএব দাঁতারা বিকৃত শরীর তত্ত্ব
এবং রোগের নিদানাদি (Morbid Anatomy and Pathology) ভালরূপে
জ্ঞানেন, কেবল ঔষধটাই হানিমানের উক্ত “লক্ষণ” শব্দের প্রকৃত অর্থ
বুঝিয়া রোগ চিকিৎসায় যথাযোগ্য ঔষধ মনোনীত করিতে কৃতকার্য হইয়া
পারেন। কিন্তু বিকৃত শরীরতত্ত্ব এবং রোগের নিদানতত্ত্ব (Morbid Ana-

tomy and Pathology) শিক্ষা করিতে হইলে যে শাস্ত্রে শরীরের নানা যন্ত্রের কার্যের বিবরণ লিখিত আছে, তাহা (ফিজিয়োলজি, -Physiology) জানা আবশ্যক। মনুষ্যের শরীরে যে সকল যন্ত্র আছে তাহার বিষয় জানিবার জন্য শরীর তত্ত্ব বা আনাটমী (Anatomy) জানা আবশ্যক। আবার আনাটমী পড়িয়া মনুষ্যের শরীরে কোথায় কি যন্ত্র আছে তাহা বিশেষ রূপে পরিষ্কার হইতে হইলে মনুষ্যের মৃতদেহ ছেদন (Dissection) করিয়া দেখা আবশ্যক। এই সকল বিষয় যাহারা শিক্ষা করিয়াছেন তাঁহারা এই লক্ষণ দেখিয়া যথাযোগ্য ঔষধ মনোনীত কবিত্তে কৃতকার্য হইতে পারেন। অনেক একপ বলিয়া থাকেন যে, যাহারা উক্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধে একবারে অজ্ঞ তাঁহারাও ত লক্ষণ দৃষ্টে চিকিৎসা করিয়া অনেক রোগীকে আরাম করিয়া থাকেন একপ দেখিতে পাওয়া। বোগ আদাম কবাই যদি চিকিৎসার মুখ্য উদ্দেশ্য হয়, যাহাতে বোগ আরাম হয় আমরা তাহাই দেখিব, শাস্ত্র দিয়া আমরা কি কবিব? নিদান ততাদি না জানিয়া যাহাবা এককাল লক্ষণ দৃষ্টে ঔষধ মনোনীত করিয়া রোগ চিকিৎসা করেন, তাঁহারা যে তাঁহাদিগের দ্বারা চিকিৎসিত সমুদয় রোগীকে “অনাগাসে বা সহজে, নির্মিমে এবং তুল্য সময়ের মধ্যে আরাম” করিয়া থাকেন, একপ বলা যাইতে পারে না। যদি পাকে প্রকারে লক্ষণ গুলি নিদানের মত সঙ্গত হয় তাহা হইলেই লক্ষণ দৃষ্টে ঔষধ প্রয়োগে রোগ আদাম হয়, অতথা এক ঔষধের পর অপর ঔষধ, এইরূপ বারম্বার ঔষধ পরিবর্তন করিতে করিতে যে পর্য্যন্ত বোগের প্রকৃত ঔষধ না পড়ে, সে পর্য্যন্ত রোগ আদাম হয় না এবং তদ্রূপ রোগীব বিশেষ অনিষ্ট হয় ও রোগী অনেক দিন কষ্টও পাইয়া থাকে। যে স্থানে রীতিমত শিক্ষিত চিকিৎসক নাই কেবল সে সকল স্থানেই উক্ত প্রকারের লক্ষণ দৃষ্টে চিকিৎসা নীতি সঙ্গত। যে স্থানে রীতিমত শিক্ষিত চিকিৎসক থাকে, সে স্থানে কেবল লক্ষণ দৃষ্টে উক্ত প্রকারে বোগ চিকিৎসা খেলোকতঃ, ধর্মতঃ এবং আইনতঃ সর্ব প্রকারে অসঙ্গত তাহা বোধ হয় বিজ্ঞ পাঠক মাত্রেই স্বীকার করিবেন। অতএব যদি কাহারো চিকিৎসা ব্যবসায় অবলম্বন করিতে হয়, তাঁহাদিগের উল্লিখিত বিষয় গুলি বিশেষ রূপে শিক্ষা করিয়া চিকিৎসা কার্য আরম্ভ করা উচিত, নতুবা বিপদ ঘটা আশ্চর্য্য নহে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে বিকৃত লক্ষণ সমষ্টিকেই রোগ বলা যায় । অতএব কোন রোগীর চিকিৎসার ভার গ্রহণ করিবার পূর্বে রোগের আরম্ভের প্রথা এবং রোগের লক্ষণাদি ভালরূপে অনুসন্ধান করিবা যে সকল লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, সে সকল সমুদয় বা অধিকাংশ লক্ষণ যে ঔষধে থাকে, সেই ঔষধই ব্যবস্থা করিবে । ঔষধের লক্ষণাদি দেখিবার সময় প্রথমতঃ দেখা উচিত রোগীর কোন দ্রব্য বিকৃতাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া উক্ত লক্ষণ গুলি প্রকাশ পাইয়াছে । এই বিষয় বিশেষ রূপে জ্ঞাত হইতে পারিলে রোগের কারণ দৃষ্টে চিকিৎসা করিতে পারা যায় এবং তাহা হইলে এক ঔষধ প্রয়োগেই রোগ আরাম হইতে পারে । নতুনা কেবল লক্ষণ দৃষ্টে চিকিৎসা করিলে পূর্বোন্নিখিত কারণে রোগী আরাম না হইলেও না হইতে পারে এবং তদ্রূপ রোগীর অনেক কষ্টও হইতে পারে বা রোগ সাংসাতিক আরকও ধারণ করিতে পারে । যদি কোন রোগে একটি ঔষধের সম্পূর্ণ লক্ষণ না পুঙ্খানুপুঙ্খ, তবে উহার অধিকাংশ লক্ষণ যে ঔষধে থাকে তাহা এবং অবশিষ্ট লক্ষণের প্রতিকারার্থ অত্র একটি ঔষধ মনোনীত করিয়া উক্ত দুইটি ঔষধ পর্যায়ক্রমে (Alternately) ব্যবহার্য্য । হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসা প্রণালীতে দুইটি ঔষধ একত্রে মিশাইয়া ব্যবহার করার প্রথা নাই । কারণ, ২ বা ততোধিক ঔষধ একত্রে মিশাইলে উহার রাসায়নিক কার্য্য ফল (Chemical action) কি দাঁড়াইবে তাহা আমরা জানিতে পারি না । একে চিকিৎসা শাস্ত্র অনিশ্চিত, তাহাতে আবার অনিশ্চিত গুণ বিশিষ্ট ঔষধ দ্বারা রোগ চিকিৎসা করিলে যে কি ফল দাঁড়াইবে তাহা বিজ্ঞ পাঠক বিবেচনা করিয়া দেখিবেন । তবে যদি দুইটি বা ততোধিক মিশ্রিত ঔষধের রাসায়নিক কার্য্যে ফল আমরা জানিতে পারি, তবে বোধ হয় দুই বা ততোধিক ঔষধ একত্র মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিলেও করা যাইতে পারে । কিন্তু ঔষধ মিশ্রিত করিলে উহার রাসায়নিক ফল কি দাঁড়াইবে তাহা জ্ঞাত হওয়া একসুকঠিন বা দুঃসাধ্য ব্যাপার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না । জার্মেনী দেশীয় ডাক্তার লুজি (Dr. Lutze) ২১৩ টি ঔষধ একত্র মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করার ব্যবস্থা দিয়া গিয়াছেন ।

পাঠকের প্রতি । মূল গ্রন্থে ঔষধের গুণ ও কার্য্যাদির বিবরণ

নিম্নলিখিত শীর্ষে (Heading) লিখিত হইয়াছে । যথা, - (১) ঔষধ প্রস্তুতের সংক্ষিপ্ত নিয়ম (Preparation of Medicine) ; (২) সাধারণ ক্রিয়া, বা ঔষধের কার্য্যের প্র থা বা মুখ্য ক্রিয়া (Physiological action) । অর্থাৎ অহ শরীরে ঔষধ সেবন করিয়া কোন্ কোন্ যন্ত্রাদি প্রাকৃতিক হইয়া কি প্রকারের লক্ষণাদি প্রকাশ পায় । (৩) সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ (General Characteristic Symptoms) । অর্থাৎ ঔষধ উদরস্থ হওয়ার পর শরীরের ভিন্ন ভিন্ন বস্ত্রে কি রূপ কার্য্য করিয়া কিরূপ বিকৃত লক্ষণ প্রকাশ পায় । এই প্রকার কার্য্যকে গৌণ কার্য্য বলিলেও বলা যাইতে পারে । (৪) ঔষধের প্রয়োগ বা ব্যবহার (Therapeutics or Principal uses) । অর্থাৎ কোন্ কোন্ ঔষধ কোন্ কোন্ রোগে ব্যবহার্য্য । (৫) বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ (Special Characteristic Symptoms) ; অর্থাৎ যে সকল লক্ষণ প্রায় সমুদয় বোগীতেই দেখিতে পাওয়া যায় । (৬) সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ (Analogous Medicines) । অর্থাৎ যেসকল ঔষধের কার্য্যের লক্ষণ উক্ত ঔষধের কার্য্যের সাদৃশ্য আছে । (৭) প্রতিষেধক ঔষধ (Antidotes) । অর্থাৎ ঔষধ সেবনে বিবাক্ত হইলে বা উচ্চ দ্বারা অপকার হইলে উহার প্রতিকারার্থ যে সকল ঔষধ বা দ্রব্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে । (৮) ভাইলুশন বিচার (Selection of Potencies) । অর্থাৎ যে যে ঔষধের যে যে ক্রম যে যে বোগে ব্যবহার্য্য তাহার বিচার । অতএব কোন বোগীর চিকিৎসায় ঔষধ মনোনীত করিতে হইলে প্রথমতঃ রোগ নির্ণয় করিবে এবং তৎপব বোগের সাধারণ এবং বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণগুলির সঙ্গে যে ঔষধের সমুদয় বা অধিকাংশ লক্ষণের সাদৃশ্য থাকে সেই ঔষধই মনোনীত করিবে ।

হোমিওপ্যাথিক ঔষজ্যসোপান

প্রথম ভাগ

প্রথম শ্রেণীর ঔষধ সমূহ

অর্থাৎ

যে সকল ঔষধ সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

আসিডাম্ নাইট্রিকাম্,—নাইট্রিক্ আসিড্,—নাইট্রি-আস্ ।

(ACIDUM NITRICUM.—NITRIC ACID,—AC. NITR.)

কোন এক বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধ বিক্রেতার ঔষধালয় হইতে
অদিত নাইট্রিক্ আসিড্ ক্রয় করিয়া উহা হইতে ১ ভাগ একটি ষ্টপার্ড্
শিশিতে (Stoppered Phial) লইয়া উহাতে ৯ ভাগ চূড়ান জল (Distilled
Water) মিশাইয়া ৫০ ড্রাম্ পর্য্যন্ত ১ম শতভাগিক ক্রম বা ডাইলুশন
প্রস্তুত হয় । ১ম শতভাগিক ডাইলুশন চূড়ান জলেই প্রস্তুত হইয়া থাকে ।
৯২ ভাগ চূড়ান জলে ৫ ভাগ রেকটিফাইড্ স্পিরিট্ (Rectified Spirit)
মিশাইয়া উহা দ্বাদশাংকায় নিয়মে ২য় এবং ৩য় শতভাগিক ডাইলুশন প্রস্তুত হয় ।
৪র্থ শতভাগিক ক্রম ডাইলুট্ (Dilute) স্পিরিটে এবং ৫ম ও ততোধিক শত-
ভাগিক ক্রম বেক্টিফাইড্ স্পিরিটে প্রস্তুত হইয়া থাকে ।*

সাধারণ ক্রিয়া ।* রক্ত, শৈল্পিক নিক্রী, গ্রাস্ত, অতি চক্ষু, মুখগন্ধব,
ওষ্ঠা, কণ্ঠদ্বার, যোনিদ্বার ইত্যাদি ক্রৈয়িক বিষণী উপব ইহার কার্য্য

* ব্রিটিশ হোমিওপ্যাথিক ফার্মাকোপিয়ায় (British Homoeopathic Pharmacopoeia) নিয়ম অনুসারেই এই পুস্তকে ঔষধ প্রস্তুতের নিয়মাবলী নিবৃত্ত হইয়াছে ।

অত্যন্ত প্রবল। সূহৃদ্বিহায় শরীরের উক্ত প্রকারের অংশে এই ঔষধ প্রয়োগে উক্ত অংশ অত্যন্ত উত্তেজিত, প্রদাহ এবং ক্ষতযুক্ত হইয়া উঠাব বিনাশ হয় বা উঠা একবারে পচিয়া যাইতে পারে। ডাক্তার হেম্পেল (Dr. Hempel) বলেন যে, যে প্রকার রোগ কোন এক বিশেষ প্রকৃতির উগ্র বিষ হইতে উৎপন্ন হয় সে প্রকার বোগে নাইট্রিক অসিড্ বিশেষ উপযুক্ত। গণ্ড-মালা, গরমীষ বারান, অথবা পারার অপব্যবহার জনিত রোগ উক্ত প্রকার রোগের বিশেষ উদাহরণ।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মন। সৰ্বদা উত্তেজিত, আপন অস্থির এবং তুলা বিষয়ে চিন্তা কবিয়া সৰ্বদা মনেব চাকলা (আর্স্. একন্, সিনিসিক্); অত্যন্ত দ্রাবক এবং সহজেই উত্তেজিত হওয়া; সহজে চমকিয়া উঠা এবং ভয় থাওয়া (ক্যালী-কার্ক); পিট্ খিট্ করা, রাগ কয়া এবং সামান্য কারণেই ঝিক্র হওয়া (একন্); মানসিক অবসন্নতা, নিবাণা, অনন্তোষের ভাব, কন্দনের ইচ্ছা (ইগ্নেস্, নেট্রাম্ মিউব, পাল্‌স্, রাস্টার্ক); স্বপ্নশক্তির দুর্বলতা বা হ্রাস (আনাকার্ড্, লাক্, নাক্ মক্, ফস্); মানসিক পরিশ্রমে অনিচ্ছা (ফস্-আস্, নাক্ বন্); স্বপ্ন শক্তির অত্যন্ত হ্রাস।

মস্তক। চণিয়া বেড়াইলে বা বসিয়া থাকিলে মাথা ঘোরা; প্রাতঃকালে উঠিলেই মাথাঘোরা (আলাম্, ব্রাট্, ফস্, লাইকোপ্); মাথায় রক্তাবরোধ এবং উহাতে গরম বোধ; প্রাতঃকালে ঘুম ভাঙিলেই মাথা ধরা (নেট্রাম্ মিউব), বিছানা হইতে উঠিলেই যাহা সাবিত্রা যান; শক্ত কবিয়া বাধিয়া রাখিলে সেকপ হয় সেকপ মাথা ধরা (জেস্, ক্যালী-আরোড্, মার্ক্, সাল্‌ফ্); মাথায় পূর্ণ এবং চাপা বোধ, কপালের দুই পার্শ্বে কসিয়া ধরা বা স্ত্রী-বিধানের ভ্রায় বেদনা; অতিবিক্ত পরিমাণে মাথাব চুল পড়িয়া যাওয়া (গ্রাক্, ডিপ্-সাল্‌ফ্, মার্ক্, লাক্, নেট্রাম্ মিউব, লাইকোপ, পিট্রোল, ফস্, ডিপাপ সাল্‌ফ্); মাথায় পূর্ণ কন্‌তানি বিশিষ্ট চুলকানি উৎপাদক ফুস্‌ড়া (থ্রাক্); মাথায় অত্যন্ত কষ্টদায়ক মরাচর্ম বা থুশ্‌কী পড়া; মাথায় অত্যন্ত বেদনা এবং টাটানি (একন্, ব্যারাইটা কার্ক, চায়না,

মার্ক, নেট্রাম্ নিউর) বাহার দরুণ টুপী পরিলেও মাথায় লাগে বা কষ্টান্বূত হয় (কার্বো-বেজ্, সাইলিসি); মাথার স্থানে স্থানে ক্ষত বাহা জালা কবে এবং বাহা হইতে পূঁব পড়ে ।

চক্ষু । শৌজা ভাবে শোধান একটা বস্তু দুইটা দেখায় (অরাম্, বেল্; সিকুটা, ট্রামনু); পুস্তকাদি পড়িতে পড়িতে চক্ষু অন্ধকার দেখা; দূরের বস্তু দেখিতে পারিয়া যায় না; চক্ষুর আইবিসেব প্রদাহ (Iritis) বাবহার বাহার পুনবাক্রমণ হয়; পাবার অপবাবহার জনিত চক্ষু পুণাতন আকারের আই-রাইটিস্ (Chronic Iritis); গরমীর ব্যাবাম বা পাবার অপবাবহার জনিত চক্ষু প্রদাহ; চক্ষু মধো চাপা বোধ এবং উহাতে ভলকুটানেন তায় অন্বূত হয়; চক্ষুর কর্ণিয়ার (Cornea) স্থানে স্থানে দাগ পড়া (ইউফ্রেস্, সাইলিসি, সালফ্); চক্ষুর উপবেব পাতাব পক্ষাবাত (স্টিফ্, জেলস্, প্লাপ্); চক্ষুর মধো কামড়ানী এবং স্থতী বিধানের তায় অন্বূত হয়; কুয়াশার মধা দিয়া দেখিলে যেক্রপ ত্রুচক্ষু সেকপ আপনা দেখা; চক্ষুর তাবা সহজে সঙ্কচিত হয় না ।

কর্ণ । পাবার অপবাবহার জনিত কাণে কম শুনা (টাকিস্); কর্ণেব নিম্ন এবং পশ্চাৎ ভাগস্থিত গ্রন্থির ক্ষাতি; কাণদিয়া হর্গক্ষয়ক পূঁব নির্গমন (অরাম্, গ্রাফ্, হিপ্-সাল্ফ্, মার্ক); কাণে স্থতী বিধানের তায় অন্বূত হয় (কোনাবাম্, গ্রাফ্, ক্যালী-কার্ক); কাণে সোঁ নোঁ, কের্ কের্ শব্দ হয়; পূঁবে কাণের ভিত্র বদ্ধ হইয়া থাকে ।

নাসিকা । সদি এবং হৃদকণ নাক দিয়া প্রচুর গরিনাণে শ্লেষ্মা নির্গমন, নাকের মধো জালা ও টিটানি এবং নাকদিয়া রক্ত পড়া (ব্রোমিন্); নাসিকার অগ্রভাগ লালবণ (বেল্, রাস্টিয়্); নাকের মধো ক্ষত এবং জালা (আলুশিনা, আন্টি-ক্লুড্, অরাম্, গ্রাফ্, ক্যালী-বাই, পাল্‌স্); সদি এবং নাকে গাঢ় শ্লেষ্মা সঞ্চিত হওয়ার দরুণ নাক বদ্ধ হইয়া থাকা ও গলার মধে শুকানুভব; নাক দিয়া হবিদ্রা বণের গাঢ় শ্লেষ্মা নির্গমন (পাল্‌স্); এক থানি কাঠেব চোঁচ বিশিয়া লাগিষা থাকিলে যেক্রপ তয় স্পর্শনে নাকের মধে সেক্রপ স্থতী বিধানের তায় বেছনা বা বাতনা; নাকেব পাতার উপর গরমীর ব্যাবাম জনিত ঘা এবং উহা অত্যন্ত ক্ষাতি হইয়া উহাতে থোসা (মাম্‌ডী ল চুম্‌টী পড়ে; ইঁটি হইতে চাছে, কিন্তু ইঁটি হয় না; নাঞি অত্যন্ত হর্গক্ষ;

নাক দিয়া কাল্চে বন্ধ পড়া, কাঁদিলে অথবা প্রাতঃকালে বাহ্যর উদ্রেক বা আরম্ভ হয় ।

মুখমণ্ডল । মুখমণ্ডল হবিদ্রার আভায়ুক্ত (ডিপ্-সাল্ফ, নেট্রাম্ মিউর, সিপিরা) ; চক্ষু চতুর্দিক হবিদ্রাবর্ণ এবং গাল লালবর্ণ ; মুখমণ্ডলে পূর্ব বিশিষ্ট ফোঙ্কার ছায়া ফুৎড়া বাহ্যর দরুণ আক্রান্ত স্থান অনেকটা চক্ৰাকারে লালবর্ণ হয় এবং উহাতে থোসা বা চুমটী পড়ে ; মুখমণ্ডলে গরমীর ঘা ; মুখ মণ্ডলের আঁঠু বেদনাসূক্ত (কার্বো বেজ্, ডিপ্-সাল্ফ, ক্যালী বাত) ; ওষ্ঠ ক্ষীত হয়, ফাটে এবং চুলকায ; মুখ মণ্ডলে ব্রণের ছায়া ফুৎড়া, মুখমণ্ডলে কাল্চে দাগ পড়ে (নেট্রাম্ কাল্) ; হর্যাস্থ্যব নিবাসিত গ্রন্থি (Sub-Maxillary glands) ক্ষীতি এবং উহাতে অত্যন্ত বেদনা ।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য । দাঁত হান্দা বর্ণ হয় এবং নড়ে ; চিবাঁইতে দাঁতে বেদনা (মাক্, কার্বো-অ্যানিমেন্) ; গরম বা ঠাণ্ডা বোন পদার্থ লাগিলেই দাঁতে হুটী বিধান, ছিঁড়না ফেলা বা ছিদ্র কবন্ধ ছায়া বেদনাভব ; মাড়ি সাদা, ক্ষীত এবং উহা হইতে রক্ত পড়া (কার্বো-বেজ্, ক্যালী নাট্রিট, মার্ক্, ফস্) ; রাত্রিতে দাঁতের গোড়ায় চিড়কমরা, ঘোঁচাবিধা অথবা দন্দপিয়া বেদনা । জিহ্বার কোঁদার ছায়া ফুৎড়া এবং ক্ষত (বোবাক্, নাক্ বম্, সিপিরা, পুজা) ; জিহ্বার প্রান্তে ক্ষত এবং উহাতে জালা (মার্ক্) ; চিবাঁইবার সময় জিহ্বায় কামড় পড়ে (ইপ্-নেস) ; নরম দ্রব্য খাচ্ছে ও জিহ্বায় লাগে বা বাতনা বেধে হয় এবং আঁবা করে (কার্বো বেজ্) ; গায়েব মধ্যে স্থানে স্থানে ক্ষত এবং উহাতে চোচ বিধার ছায়া টাট্যান ; ভেন্টের কোণে ক্ষত (আন্টি-ক্লুড্, গাল, লাইফেপল্) ; মুখে চক্ক (অর্গনক, অ্যাম্, অয়েোড্) ; মুখগহ্বর এবং উহা পশ্চাত্তাগে শুশানভব এবং অত্যন্ত ক্ষত (অস্, ক্যাল্, কাপ্‌স, মার্ক্-ফর) ; মুখগহ্বর এবং গলায় মধ্যের শ্লেষ্মক বিল্লী ক্ষীত এবং উহাতে ক্ষত ও কুট্‌কটানি (পাবাব অপথ্যেটোব পব) ; মুখে প্রচুর পবিন্দ্রাণে লাল উচ্চ (খ্যোয়োড্, ইপ্-নেস, ক্যালী অ্যোয়োড, মার্ক্) ; মুখে রক্তমিশ্রিত লাল উচ্চ (সাল্ফ) ; মুখে টুক ঝাঁক (ক্যাল্-কাল্-চায়না, অ্যোয়ো-কাল্) ; 'জিহ্বা সবুজ লেপসূক্ত এবং উহা পক্ষে পক্ষে মুখে লাল উচ্চ । গলায় মূপ, শুব এবং গরম বোদ ; গলার মধ্যের পশ্চাত্তাগে শ্লেষ্মার

সঞ্চার ; ফুলিলে যেক্রপ হয় গিলিবার সময় গলার মধ্যে সেক্রপ বেদনা ; গলার মধ্যে ছাল উঠিয়া ক্ষত হয় ; চোঁচ বিধিয়া থাকিলে যেক্রপ হয় গলার মধ্যে সেক্রপ কুটু কুটানি (আলুমিনা, আর্জেন্ট্ নাইট্রি, হিপ্-সাল্ফ), গিলিবার সময় যাতার বৃদ্ধি হয় ; গলার মধ্য এবং মুখ গহ্বরের পশ্চাৎভাগে স্ফটী বিধানের স্থায় বেদনা ; চিবাইবার সময় মাড়ির অস্থি-সন্ধিতে কেরকের শব্দ হয় ; টন্সিল্ (Tonsils) এবং মুখ গহ্বরের পশ্চাৎভাগে ডিপ্‌থারিয়া রোগের পক্ষার স্থায় পক্ষা পাড়িয়া উঠা মুখগহ্বৰ, কণ্ঠ এবং নাসিকা পর্যন্ত বিস্তৃত হয় (মার্ক্, আয়োড্, ফাইটোল্) ; আহার বশ-গলনাধীন সংকোচনে (Stricture of the Oesophagus) সেক্রপ হয় গিলিবার সময় গলার মধ্যে সেক্রপ কষ্টান্নভব (বেল্) ।

পাকস্থলী এবং উদর । ক্ষুধাশূন্যতা (আস্, ক্যাক্, কার্ক্, চায়না, নেট্রাম্-মিউর, সাল্ফ্) ; প্রবল পিপাসা (একন্, আস্, ব্রাই, সাল্ফ্) ; আহারের পূর্বে ও পরে ব্যাঘ্রাব উদগার উঠা ; বমনোদ্বগ এবং শ্লেষ্মা, উদবহু অহ্নের জ্বা, অথবা আঠা, পূঁষসংযুক্ত ও রক্ত মিশ্রিত পদার্থ বমন (কম্) ; পাকস্থলীর মধ্যে স্ফটী বিধানের স্থায় অক্ষুভ হয় ; মুখে তিক্ত স্বাদ, বিশেষতঃ আহারের পর ; নাস এবং নিষ্ঠ্র জ্বব্য অকচি ; দুহ পরিপাক পায় না ; দূষিত বায়ু (Flatulence) দ্বারা উদর ক্ষীত হয় (কার্কো-বেজ্, চায়না) ; উদর টাটায় ; যকৃত প্রদেশে স্ফটী বিধানের স্থায় যাতনা ; উদরের বামদিকে চাপা বোধ ; উদরে কস্তনবৎ বা চিম্‌টিকাটাব স্থায়-চিন্‌টিনে বেদনা (কলোস্) ; উদরে দূষিত বায়ু রুদ্ধ হয়, প্রাতঃকালে এবং সন্ধ্যার সময় যাতার বৃদ্ধি হয় ; কুচ্‌কী সম্বন্ধীয় অঘবৃদ্ধি (Inguinal Hernia) ; শিশুর অঘবৃদ্ধি (আলাম্, নাক্, বম্) ; কুচ্‌কীর গ্রন্থি ক্ষীত (বাণী, — Bubo) এবং পাকিয়া উঠাতে পূঁষ গহ্বৰ (ক্যাক্, কার্ক্, মার্ক্, থুজা) ।

মল । অশব্দেগ ; অশের বমী বড় এবং ক্ষীত হইয়া মল ত্যাগের সময় উঠাদিয়া একপাতে, অশের বমীতে কখন বেদনা এবং জ্বালা থাকে, কখন বা বেদনা জ্বালা থাকে না ; গুহ দ্বারে চুলকানি (সাল্ফ্, সাইলিসি) ; গুহ এবং গুহ দ্বারে অশা এবং চুলকানি (আস্, ক্যাক্) ; গুহদ্বারে আঁটা বোধ এবং মল ত্যাগের সময় গুহ দ্বারের সংকোচন ; গুহদ্বার কাটিয়া ফুটু হয় (নেট্রাম্-মিউর, ফাইটোল্) ; মল ত্যাগের সময় গুহ ক্ষাটিয়া বাইবে

একরূপ অন্তর্ভূত হয়; আমাশয়ের ত্রায় মলত্যাগ; রক্ত মিশ্রিত মলত্যাগ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কষ্টদায়ক কোঁঠপাড়া (মার্ক); কাল্চে রক্ত ভেদ (আস্); শ্লেষ্মা ভেদ; গুহ দ্বারের চতুর্দিক অনবরত ভিজা থাকে এবং টাটায়; কষ্টদায়ক কোঁঠবন্ধ; অধিক পরিমাণে কঠিন মলত্যাগ (আলাম্, ব্রাই, সাল্ফ); তরল ভেদ এবং তৎপর কোঁটায় কোঁটায় রক্ত, পড়া; কঠিন মলত্যাগ এবং উহার পর কোঁটায় কোঁটায় রক্ত পড়া।

মূত্র বস্তু। প্রস্রাব করা ব সময় এবং উহার পর মূত্রনালীতে আলা এবং চিড়িক মারা (একন্, আস্, ক্যাহ্, কোনাযাম্); মূত্রনালী দিয়া রক্ত মিশ্রিত শ্লেষ্মা এবং পুঁথি নির্গমন (নেট্রাম, মার্ক-কব); মূত্রনালীর মুখে স্থচীবিধানের ত্রায় অন্তর্ভূত হয়; বারম্বার প্রস্রাবের ইচ্ছা এবং অতি কম পরিমাণে মূত্রত্যাগ (এপিস্, কলোন্, হেলিবোরাম্, মার্ক); মূত্র কাল্চে কটাবণ এবং পরিমাণে অল্প; অত্যন্ত উগ্র হর্গন্ধযুক্ত (বাড়ারমূত্রের ত্রায়) মূত্রত্যাগ (বন্জ্-আস্, আবিদিস্, নেট্রাম্ মার্ক); অসাড়ে বা অনিচ্ছাপূর্বক মূত্র ত্যাগ; ঠাণ্ডা মূত্র ত্যাগ।

জননেন্দ্রিয়। পুরুষাঙ্গের প্রতিবৎ অগ্রভাগ (Glans Penis) এবং উহার আবরক চর্মের (Prepuce) উপর গবমীর ঘায়েব ত্রায় ভ্রামান যা (ইপি-সাল্ফ, ফাইটোল্); উক্ত স্থানের যা পরিকার দেখায় বটে, কিন্তু উহা হইতে অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত কল্-তানি পড়ে (মাক্), পুরুষাঙ্গে গভীর, নালীবৃত্ত, অসমান (আবড়ু-খাবড়ু) ধার বিশিষ্ট উচ্চ এবং সীসার বন্ধ বিশিষ্ট ক্ষত, স্পর্শ করিলে বাহা হইতে সহজে রক্ত পড়ে; গরমীর ঘা; পারার অপব্যবহার জনিত পুরুষাঙ্গের মাথায় ঘা এবং উহাতে বিজ্-গুড়ী বিজ্-গুড়ী ফুসুড়ী; গরমীর পরবর্তী পীড়ার লক্ষণ (Secondary Syphilis); পুরুষাঙ্গের মাথায় ফুলকফির ফুলের ত্রায় ফুসুড়ী; পুরুষাঙ্গের মাথার আবরক চর্ম প্রদাহযুক্ত হইয়া স্ফীত হয় এবং খোলা যায় না (Phimosis); পুরুষাঙ্গের মাথার দাঁদের ত্রায় ফুসুড়ী (ঠাফিস্, খজা) স্পর্শ করিলে বাহা হইতে সহজে রক্ত পড়ে; পুরুষাঙ্গের মাথায় ফুসুড়ী এবং উহাতে শুকনা স্রোতী বহু মুটি পড়ে; পুরুষাঙ্গের আবরক চর্ম সচা বিধানের ত্রায় প্রথম বেদনা এবং চুলকানি; রাত্রিতে পুরুষাঙ্গ খাড়া হইয়া শক্ত হয় (Chordee) এবং তদবধি অত্যন্ত যাতনা

(গ্রাফ); জীপহবাসে অত্যন্ত ইচ্ছা, অথবা উহার ইচ্ছা একবারেই থাকে না; অণ্ডকোষের প্রদাহযুক্ত স্ফীতি; স্বপ্নদোষ বা বারম্বার অসাড় হওয়া বা অনিচ্ছাপূর্বক ধাতু নিঃসরণ; জ্বালোকের যোনিতে অত্যন্ত চুলকানি (মার্ক, নেট্রাফ্ মিউর, সাল্ফ); যোনি দ্বারে ক্ষত, উহাতে আলা এবং চুলকানি (কোনার্রাম্, সাল্ফ); দুর্গন্ধযুক্ত শ্বেতপ্রদব (Leucorrhœa); যোনিদ্বার দিয়া সবুজ, ইটেক রক্ত অথবা মাংসের রক্ত বিশিষ্ট রক্ত নিঃসরণ; জরায়ুর মুখের চতুর্দিকে কুলকফির ফুলেব জায় কুসুড়ী; রক্তরোধ; শুনের স্থানে স্থানে প্রস্ফীতির জায় কঠিনতা।

শ্বাস যন্ত্র। স্বরভঙ্গ (একন, হিপ্-সাল্ফ); শ্বাস কষ্ট; সিঁড়ি ভাঙ্গিতে হৃৎস্পন্দন এবং মনের উদ্বেগ; কুসুমাবরক-ঝিলী-কোটরের মধ্যে পুষের সঞ্চার (Empyema) এবং গলা দিয়া প্রচুর পুষসংযুক্ত শ্লেষ্মা নির্গমন; রাত্রে বা দিনের বেলা শয়ন করিলে কাশির উদ্বেগ বা বৃদ্ধি হয়; রাত্রি দুই প্রহরের পূর্বে শুক, কক্কশ কাশি; বুকের ডাইন পার্শ্বে স্ফটীবিধানের জায় বেদনা (ব্রাই, ক্যালী-কার্ক); কাশির সঙ্গে সঙ্গে গলাদিয়া পুষ সংযুক্ত হরিজ্ঞা বর্ণের শ্লেষ্মা নির্গমন; বুকের উদ্ধদিকে রক্তাবরোধ; বুকের মধ্যে আঁটা এবং পূর্ণাভব ও উহার সঙ্গে সঙ্গে মনের উদ্বেগ ও হৃৎস্পন্দন; কোন প্রকার শারীরিক পরিশ্রম করার সময় শ্বাস প্রস্থাসে সাঁই সাঁই শব্দ হওয়া।

পৃষ্ঠদেশ, ঘাড় ইত্যাদি। স্বক এবং স্বক্কের মধ্যবর্তী স্থানে স্ফটী বিধানের জায় বেদনা; ঘাড় শক্ত হয় বা উহা নোয়ান যায় না; পৃষ্ঠদেশ এবং কোমরের পশ্চাৎভাগে বেদনা (গরমীর ব্যারাম জনিত হইলে অধিক উপকারী); গ্রীবা এবং বগলের গ্রন্থি স্ফীতি (ব্যারাইটা কার্ক, ক্যাক্ কার্ক, আয়েড্, ঠাকিস); দুই স্বক্কাস্থির মধ্যবর্তী স্থানে বেদনা; বগলের গ্রন্থি স্ফীত হয় এবং পাকিয়া উহা হইতে পুষ পড়ে।

হাত, পা ইত্যাদি। উভয় বাহুতেই কসিয়া ধরার জায় বেদনা; স্বক্কে চাপিয়া ধরার জায় বেদনা; ঠাণ্ডা বাতাসে হাত একবারে অবশ হইয়া যায়। অধিক ক্লান্ত হইলে ক্ষেপ হয় পা ইত্যাদি নিম্ন শাখায় সেক্রপ পমাচ-ডাইরা পড়ার জায় বেদনা (চায়না, ক্যাক্ কার্ক); পায় ছিড়িয়া ফেলার জায় বেদনা, বিশেষতঃ রাত্রিতে; রাত্রিতে পায়ের ডিমে শুয়ানক খিলধরা

(ক্যাঙ্ক্ কার্ক্, নাক্স্ বম্, গাল্ফ্) ; অনেক দিন জলে ভিজিলে যেক্রপ হয় পায়ের আঙ্গুল সেক্রপ হেজে যাওয়া (সাদা ঘা হওয়া) (আগ্নিকীর্ণাশ, পাল্‌স্, জিক্) ; পায় প্রচুব পবিমাণে ভর্গন্ধযুক্ত ঘর্ম্ম হয় (ব্যারাইটা কার্ক্, সিপিয়া, সাইলিসি) বাতাব দরুণ পায় ঘা হয় এবং টাটায় ; পায়ের পাতা সর্বদাই ঠাণ্ডা ; হাঁটুর সন্ধি শক্ত হয় বা উহা নোয়ান যায় না এবং উহাতে সূচী বিধানের ন্যায় বেদনা ; চলিবার সময় পায়ের পাতার সন্ধিতে কেব্‌কেব্‌ শব্দ হয় ।

চর্ম্ম । চর্ম্ম শুষ্ক এবং আইষেব ন্যায় খোসা বিশিষ্ট (আস্) ; চর্ম্ম হবিত্রাবর্ণ ; চর্ম্মে গভীর ফাটা এবং উহা দিয়া বন্ধ পড়া ; গায়ে ক্ষত এবং চোচ বিশিষ্ট যেক্রপ হয় উহাতে ছলফুটানির ত্রায় সেক্রপ বেমনা এবং কুট্ কুটানি ; ঘাঘের ধাব অসমান বা আবদ্ধুখাবদ্ধ এবং উহাতে বিজ্‌গুড়ী বিজ্‌গুড়ী কুস্কুড়া ; পায়ের অপব্যবহার বা গরমীর ব্যাবহারে দরুণ উক্ত প্রকার ক্ষত বা কুস্কুড়া ; কল্‌তানি বিশিষ্ট, কুলকফির কুলের ত্রায় কঠিন ভূমুমান বা আবদ্ধুখাবদ্ধ ক্ষতি এবং ঘা ; গার আমবাত (Urticaria) এবং উহার দরুণ অত্যন্ত চুলকানি ; আচিল (Warts) ।

নিদ্রা । প্রথম রাত্রে ঘুম হয় : হয় অতি প্রত্যুষে ঘুম ভাঙ্গে, না হয় প্রাতে সহজে ঘুম ভাঙ্গে না ; ছট্‌কট্‌ কব ; ঘুম ভাল না হওয়া এবং ঘুমের ঘোরে ব্যাবহারচক্ষিয়া উঠিয়া ঘুম ভাঙ্গিয়া যাওয়া ; ঘুমের ঘোরে মনের উদ্বেগ, মাথার নন্দ্রপানি ; নিদ্রা ভাল হইলেও উহার দরুণ রোগী আপনাকে আপনি সূস্থ মনে করে না ।

জ্বর । অপরাধ এবং স্কাফকলে, শয়ন করিয়া থাকিলে শীত কম্প (নাক্স্ বম্) ; শরীর গরম এবং হাতের পাতায়ে ঘর্ম্ম ; গা গরম, বহুশয়তরাত্রে এবং উহান সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত পিপাসা ; মুগনগুলো এবং হাতে ব্যাবহার গরম বোধ ; ব্যতিতে প্রচুর ভর্গন্ধযুক্ত ঘর্ম্ম হয় (এক ব্যক্তি অত্যন্ত এক রাত্রিতে) ; সবিরামজ্বর ; অপরাধে শীত হইয়া গা গরম হয় এবং তৎপরে ঘর্ম্ম হয় ; জরের কোন অবস্থায়ই পিপাসা থাকে না ; প্রাতে কালে কম্প হয় (ক্যাঙ্ক্ কার্ক্, চক্ষ্মা, বাস্টেজ্) ; নাড়ী অত্যন্ত অনিয়মিত রূপে স্পন্দন করে ।

ব্যবহার : গরমীর ব্যাবহার বা গারার অপব্যবহার জনিত অসুখ ;

অস্থি এবং গ্রন্থির অসুখ ; চর্ম্ম, মুখগহ্বর, গুল্মদ্বার, নাসিকা ইত্যাদির ঝিল্লীর ক্ষত গরমীর ব্যারাম বা পারার অপব্যবহার জনিত হইলে অধিক উপকারী । চক্ষু প্রদাহ (পারার অপব্যবহার বা গরমীর ব্যারাম জনিত হইলে আরো উপকারী); সর্দি; ডিপথিরিয়া; কোষ্ঠবদ্ধ; অর্শরোগ; শ্বেতপ্রদর; প্রাণ্ণেহ রোগ; কামল রোগ; বাতরোগ; গরমীর ব্যারাম বা পারার অপব্যবহার জনিত বাগী (Buboes); নেত্রনালী (Fistula Lachrymalis); উদরাময়; আনাশয়; বোনিচারে ফুলকফির ফুলের ছায় ঘা বা ক্ষীতি; অসাড়ে বা অনিচ্ছাপূর্বক মুহূর্ত্তঙ্গ; অণ্ডকোষের প্রদাহ; কণ্ঠনালীর পুরাতন প্রদাহ (Chronic Laryngitis); আক্কেপিক কাশি; রক্তোৎকাশি; বুকে বেদনা; পুরাতন সবিরাম অর হেতু বকৃতের পুরাতন প্রদাহ ইত্যাদি অসুখে নাইট্‌ক্‌ আসিড্‌ ব্যবহার্য্য ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । যে প্রকার রোগ কোন বিশেষ প্রকৃতির বিবেচ্যপন্থ, —যথা পারাজনিত রোগ, গরমীর ব্যারাম বা গণ্ডমালাজনিত রোগ, সে প্রকার রোগে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী । অত্যন্ত দুর্বলতা, হাত পায়ে ভারি বোধ এবং উহার কাঁপনী; হঠাৎ বা সামান্য কারণেই সর্দি লাগার ধাতু; শরীরের প্রায় সমুদয় অংশেই বেদনা যাহা হঠাৎ হয় এবং হঠাৎ যায়; স্পর্শনে আক্রান্ত সমুদয় অংশেই চোঁচ বিঁধার ত্যায় বেদনানুভব; গ্রন্থি প্রদাহযুক্ত, ক্ষীত এবং উহাতে পুঁয় হওয়া; সন্ধ্যার সময়, রাত্রিতে, বহির্কায়ুর পরিবর্তনে, ঘুম ভাঙ্গিলে, চলিয়া বেড়াইলে, বসে অবস্থা হইতে দাঁড়াইলে; মল ত্যাগের পর গুল্মদ্বার দিয়া কোঁটায় কোঁটায় রক্ত পড়া, রাত্রি দুই প্রহরের সময় বা উহার অল্পকাল পর অসুখে বুদ্ধিও নাইট্‌ক্‌ আসিডের বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত । অতএব যে সকল রোগে এই ঔষধ ব্যবহৃত হওয়ার উপযোগী তাহাতে এই ঔষধটীর এই লক্ষণের বিষয় স্মরণ করিলে পাঁচ নিম্ফল হইবেন না লেখক তাহার আপন চিকিৎসার ফল দেখিয়া একরূপ বিশ্বাস করবেন ।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ । মিউবিয়াটিক্‌ আসিড্‌, মার্কিউরিয়াম্‌ এবং থুজা নাইট্‌ক্‌ আসিডের প্রকৃত সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ । এতদ্বির ক্যালকেরিয়া কার্বোনিকা, হিপার সাল্‌ফিউরিস্‌, সাল্‌ফার, মেজিরিয়াম্‌, সাইলিসিয়া

ইত্যাদি ঔষধ জলিও নাইট্রিক অ্যাসিডের সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ বলিলেও বলা
যাইতে পারে।

প্রতিষেধক ঔষধ । ক্যালকেরিয়া কার্ব, ক্যালকার, হিপার সাল্ফ, মার্কিউরিয়াম্, মেজিবিয়াম্, সালফার । অধিক মাত্রায় শাইটিক্ অ্যাসিড্ দ্বারা বিবাক্ত হইলে ক্ষারগুণবিশিষ্ট ঔষধ (Alkalies), স্যাপান (Soap), মাগনেসিয়া ইত্যাদি ঔষধ ব্যবস্থা ।

ডাইনুশন বিচার। এর ইহতে ষষ্ঠ শতাব্দীক ক্রম সচবচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। গরমীর ব্যারাম বা পারাব অপব্যবহার জনিত রোগে (স্নাইকে, মুখে, গায় ঘা ইত্যাদিতে) ১ম দর্শনিক ক্রম ১ ফোঁটা মাত্রায় ব্যবহার করিয়া লেখক বিশেষ ফল পাইয়া থাকেন। ডাক্তার রাউন্ড ১ম দর্শনিক ক্রমের ২১০ ফোঁটা এক এক মাত্রায় ব্যবহার করিতে বলেন। শুষ্ক এবং শুষ্ক ছারের অন্তর্গত ১২ এবং ৩০ ডাইনুশন ব্যবহারে বিশেষ উপকার দর্শে। ৩০ ক্রম ব্যবহারে একটা রোগীর এবং ২০০ ক্রম ব্যবহারে ৩টা রোগীর জ্ঞানানার (Fistula Lacrymalis) চিকিৎসায় লেখক অশোভিত্বিক ফল পাইয়াছেন। উক্ত সকল রোগটি ৫।৬ সপ্তাহ কালের মধ্যে আরাম হইয়া গিয়াছে। মাত্রা ৩ ফোঁটা ১ এক দিন অপর এক দিন ১ মাত্রা সেবা। এইরূপে ৭।৬ সপ্তাহের মধ্যে কোন উপকার না হইলে উপকারের সম্ভাবনা অতি কম।

आमिडाम्, कस्करिकाम्,—कस्करिक् आमिड्,—कस्-आमि

(ACIDUM PHOSPHORICUM, — PHOSPHORIC ACID, — AC. PHOS.)

কোন এক দিশস্ত হোমওপ্যাথিক ঔষধ বিক্রেতার প্রদান কর্তৃক
ইহার প্রথম দশমিক ক্রম ৬ লব্ধ কাঁচা বা যথা নিয়মে চূষনি জলে মিশাইয়া
২৪ ঘণ্টা ১ম শতভাগিক ক্রম বা ডাফলগন প্রস্তুত করিবে। ১৫ ভাগ চূষনি জল
এবং ৫ ভাগ বেকটেকাইড স্পিনিট একত্রে মিশাইয়া উহা দ্বারা যথা নিয়মে ওষ

• • অ্যামোনিয়ামিক বিউট ফসফোরেসিং ট্রিবিট ডাউলট ফসফোরিক অ্যাসিড (Dilute Phosphoric Acid), চোরিওপ্লাস্টিক সঞ্চয়িত পান্ডের সমন্বিত ক্রম বা ডাইলুশনের সম ভেদ বা শক্তি বিশিষ্ট বলিয়া গ্রহণ্য।

দশমিক এবং ২য় শততমিক ডাইলুশন প্রস্তুত করিতে হয়। ৫ম দশমিক ডাইলুশন ডাইলুট্ স্পিরিটে প্রস্তুত হয়; ৩য় এবং ততোধিক ডাইলুশন রেক্টিফাইড্ স্পিরিটে প্রস্তুত হয়। ৩য় দশমিক ক্রম পর্য্যন্ত ষ্টপার্ড্ শিশিতে রাখা কর্তব্য। উহা অপেক্ষা উচ্চ ডাইলুশন কর্ক আঁটা শিশিতে রাখিলেও চলিতে পারে।

সাধারণ ক্রিয়া। স্নায়বিক মণ্ডলীর উপর এই ঔষধের কার্য অত্যন্ত প্রবল। ক্রমাগত শোক দ্বারা ভোগ, অতিরিক্ত পৰিমাণে শারীরিক বা মননশীল পরিশ্রম, জ্ঞান সহবাস, হস্ত মৈথুন ইত্যাদিতে অত্যাচার দ্বারা স্নায়বিক মণ্ডলীর যেরূপ নিতেজ অবস্থা হয়, স্বেচ্ছা স্বাভাবিক ফক্সবিক্ আসিড্ প্রয়োগেও স্নায়বিক মণ্ডলীর দেহের অবস্থা হইয়া থাকে। ইহা স্নায়বিক মণ্ডলীকে নিতেজ বা অবসন্ন করে (চাঘনা স্নায়বিক মণ্ডলীকে উত্তেজিত করে) এবং এরূপ মূৰ্ছ কোষ এবং পুরুষের জননেন্দ্রিয়ার উপর স্থানিক কার্য দেখাইয়া তৎপর অস্থি এবং চৰ্ম্ম আক্রমণ করে।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মন। স্বাধীন শক্তির হ্রাস বা হ্রাসলতা (আনাকাৰ্ড্, আস্থা, ক্রিয়াজ, ল্যাক্, মার্ক্, নেট্রাম্ মিউন, নায়্, মক্); নিস্তব্ধতা; সকল বিষয়েই বৈরাগ্য বা মন নিবিষ্ট হইয়া (সিপিয়া, বাস্কেরিস্, সেলেন্); কোন বিষয় বুঝিতে পারা যায় না; নান্দনিক শক্তির অত্যন্ত হ্রাস বা বিনাশ; কোন বিষয়ে চিন্তা করিতে অশক্তি (এপ্, সিগনিসক্, জেন্, নাক্স্, বম্); কথা বলিতে অনিচ্ছা; কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে অনিচ্ছা পূৰ্বক উত্তর দেওয়া (আগাবিকাশ্, ফন্); সন্দেহা শব্দী শব্দে বা বাজীতে থাকার ইচ্ছা (কোপস্, হেরিবোবাস্) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কাদিবার ইচ্ছা; চুপে চুপে বিড়্ বিড়্ করিয়া প্রলাপ বলা (Low-muttering delirium) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মাথা ঝিম্ ঝিম্ করা (এপ্, বাস্ ট্যা, ফন্)।

মস্তক। নেসা কঁপিলে যেরূপ হয় মাথায় সেরূপ গোলামেলে বোধ এবং ঝিম্ ঝিম্ করা; মাথা ঘোঁরা; কোন একটা বোঝা রাখিলে যেরূপ হয় মাথায় সেরূপ ভাবি বোধ; প্রাতঃকালে এবং ঘুম ভাঙ্গিলে কপালে প্রবল চাপা বোধ; অত্যন্ত প্রবল শিরঃপীড়া যাহার দরুন রোগী শয়ন করিতে

বাধা হয় এবং যাহা সামান্য নড়াচড়া বা গোলমালে অত্যন্ত অসহ্য হইয়া পড়ে বা বৃদ্ধি হয় (বেল্); ছুরী দিয়া টাটিলে যেকপ হয় মাথার হাড়ের আবরক চর্মে সেক্রপ ঘটনা ; অকালে চুল পাকে (লটিকোপ্) বা কোষ্ঠী পাটের ছায় হয়; মাথার চুল পড়িয়া যায়, (প্রধানতঃ শোক হুঃখ পাওয়ার পর); মাথা চুলকায় (ক্যাঙ্ক্ কার্ক, কার্কো আনিমেল, সাল্ফ্); প্রাতঃকালে শিরঃপীড়া; কপালের দুই পার্শ্বে ছুরী বিধানের ছায় বেদনা ।

চক্ষু । চক্ষুর মধ্যে অত্যন্ত চাপা বোধ যাহার দৰুণ মনে হয় যেন চক্ষুর গোলক স্বাভাবিক অগেফা বড় হইয়াছে (প্রাঙ্ক্, স্পাইজেল্); চক্ষুর স্বেতাংশে হরিদ্রার দাগ পড়ে; চক্ষুর তাবা বিস্তৃত (বেল্, হায়োস্, ট্রায়ম্); চক্ষুর পাতার মধ্যে এবং উহার কোণে জালা; চক্ষু প্রদাহ এবং চক্ষুর স্বেতাংশ লাল হয়; চক্ষু দিয়া এল পড়ে; দ্রবের বস্তু দেখিতে অক্ষম হওয়া ।

কর্ণ । কাণে প্রত্যেক শব্দই প্রতিধ্বনিত হয় (কষ্ট্, মার্ক্, কন্); কাণে শব্দ, বিশেষতঃ বাদ্য, সহ্য হয় না (একন্, আয়্); কাণে সোঁ সোঁ শব্দ হয় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কাণে কম শুনা (ক্যাঙ্ক্, কার্ক্, মার্ক্, নিকেল্, সাল্ফ্); কাণে কসিয়া ধরার ছায় আফেপিক বেদনা; কাণে ঘোঁচা বিধানের ছায় বেদনা ।

নাসিকা । নাক দিয়া কান্চেরক্ত পড়া (ক্রোকাস্, হামামেলিস্); নাকে ক্ষত হইয়া উহাতে খোসা বা চুমটী পড়া ।

মুখ মণ্ডল । মুখ মণ্ডল শিটা বা ফিকা; মুখ মণ্ডলে লণের ছায় ফুস্ফুড়ী; গালে জালাযুক্ত বেদনা; গাল, ওষ্ঠ এবং ওষ্ঠের কোণে কল-তানি বিশিষ্ট দাদেব ছায় ফুস্ফুড়ী ।

মুখ গহ্বর । জিহ্বাব মধ্য ভাগে লাল দাগ পড়ে; জিহ্বা; তাল্কা এবং সমুদয় মুখ গহ্বরে শুষ্ক বোধ, কিন্তু পিপাসা থাকে না (এপিস্, নাজ্, মফ্, পাল্); আনচ্ছাপূৰ্ণক (রাত্রীতেও) জিহ্বাব পার্শ্ব কামুড়ান; জিহ্বা এবং সমুদয় মুখ গহ্বর চট্চটিয়া আঠা লাল দ্বারা আবৃত ।

পাকস্থলী এবং উদর । খাওয়ার অনেককাল পর পর্য্যন্তও মুখে আহার দ্রব্যের স্বাদ থাকে, বিশেষতঃ কটর স্বাদ (আলাম্, আর্স্, চায়না, নেট্রাম্ মিউয়, সাল্ফ্); অসহ্য পিপাসা (একন্, আর্স্, ব্রাই, নাইট্রিক্ আর্স্);

ঠাণ্ডা এবং রসাল দ্রব্য খাওয়ার স্পৃহা (ফস্) ; উগ্র এবং টক স্বাদ বিশিষ্ট উদগার উঠা (কার্বো বেজ্, নাক্স্ বম্, ফস্, পাল্‌স্, সাল্‌ফ্) ; কাকি পানে অনিচ্ছা (লাইকোপ্) ; হৃদ্ব খাইতে অনিচ্ছা (ককিউল্, পাল্‌স্) ; কোন একটা ভারি দ্রব্য থাকিলে যেরূপ হয় প্রত্যেকবার আহ্বারের পর পেটে সেক্রপ ভারবোধ (একন্, আস্, ব্রাই, নাক্স্ বম্, পাল্‌স্, সিন্‌পিফ্) ; পাকস্থলীতে চাপিয়া ধরার স্থায় বেদনা (স্পর্শনে) ; অনবরত বমনোদগ্গ । এক পাশ হইতে অত্র পাশে যেন কোন পদার্থ বিছাওনের স্থায় বারম্বার হঠাৎ যাইতেছে পেটের মধ্যে সেক্রপ অনুভূত হয় (একন্) এবং পেটের মধ্যে গড়্ গড়্ কল কল শব্দ হয় ; উদরে আক্কেপিক বেদনা, বিশেষতঃ নাভি প্রদেশে ; তলপেটে চাপা বোধ ; পেটে অতিরিক্ত পারমাণে দূষিত বায়ুর সঞ্চয় এবং গুহদ্বার দিয়া উহার নিঃসরণ (ক্রীসহবাস বা ইন্তমৈথুনে অত্যাচারিদিগের হইলে অধিক উপকারী) ।

মল । উদরাময় (দুর্লভকারক নহে) (পাল্‌স্) যদিচ অনেক কাল ব্যাপিয়া থাকে (দুর্লভকারক হইলে আস্, চায়না, ফস্, সিকেল্) ; অনিচ্ছা পূর্বক বা অসাভে মলত্যাগ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গুহ দ্বার দিয়া দূষিত বায়ু নিঃসরণ (আলোজ্) ; সাদাটিয়া পুষ্প বর্ণের তরল ভেদ (ফস্) ; হরিদ্রার আভাযুক্ত এবং অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত ভেদ (আসাকিটিডা) ।

মূত্র যন্ত্র । হৃদয়ের স্থায় মূত্রত্যাগ (স্টিলিজ্) থানা থানা বা জমাট ; প্রচুর পরিমাণে মূত্রত্যাগ (আসিটিক্ আম্, ইউপেট্-পাপূর, ফাইনষ্ট্) বিশেষতঃ রাত্রিতে (আম্‌ট্রা, আমন্ নিউর) ; প্রচুর পরিমাণে বারম্বার জলের স্থায় মূত্রত্যাগ, কিন্তু মূত্রত্যাগের কতকক্ষণ পরই উহার নীচে গাঢ় এবং সাদা তলানি পড়ে ; মূত্র ত্যাগের সময় মূত্র নালীতে ছুবি দিয়া কাটার স্থায় অনুভূত হয় ।

জননেন্দ্রিয় । পুরুষের বারম্বার এবং দুর্লভকারক ধাতু নির্গমন (চায়না) ; জননেন্দ্রিয়ের দুর্লভতা (আগারিকাশ্, আগ্নাশ্, ব্যারাইট্) কার্ব্, কোনায়াম্, ফস্, সাল্‌ফ্) এবং উহাব সঙ্গে সঙ্গে হস্ত মৈথুন এবং ক্রীসহবাসের সামান্য ইচ্ছা ; ক্রীসহবাস এবং অসাভে ধাতু নির্গমনেব পর অত্যন্ত দুর্লভতা এবং অবসন্নতা (আগারিকাশ্, ক্যালী কার্ব্, চায়না, স্ট্রীফিস্) ; পুরু-

ষাঙ্গের মাথার আবরক চশ্মের (Prepuce) উপর দাঁদের ন্যায় ফুসুড়ী এবং উহাতে কুটকুটানি; পুরুষাঙ্গে দাঁদের ন্যায় শুকনা পুতান আকাবের ফুসুড়ী; পুরুষাঙ্গে আঁচিল এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গরমীর ঘা; মলত্যাগের সময় বেগ দিলে ধাতু নির্গমন; নিয়মিত সময়ের অনেক পূর্বে জ্বীলোকের অনেক দিন ধরিয়া অতিবিক্ত পরিমাণে কাল্চে রক্তস্রাব; রক্তস্রাবের সময় যকৃতে বেদনা; প্রচুর পরিমাণে হৃদিদ্বা বর্ণের স্বেদ প্রদর (অধিকাংশ রক্তস্রাবের পর); জরায়ু ক্ষীত হয় এবং উহাতে যেন বিছাতের ন্যায় কোন পদার্থ বারম্বার মড়ে; সন্তানকে স্তনদুগ্ধপান কবাইবার দরণ দুর্বলতা ।

শ্বাস যন্ত্র । স্বরভঙ্গ এবং গলায় মধ্যে থলথলে বোধ (ফস্ কাঙ্কো বেজ্, নাজ্ বম্); শুক কাশি, বকের মধ্যে কুটকুটানোর দণ্ড বাহার উদ্রেক হয় এবং সন্ধ্যার সময় শয়ন করিয়া থাকিলে বাহার প্রকৃতি হয়; প্রাতঃকালে কাশি এবং গলা দিয়া হৃদিদ্বাবর্ণের স্বেদ নির্গমন; কাশি এবং গলা দিয়া প্রচুর পরিমাণে ঘাসের স্বাদ এবং গন্ধ বিশিষ্ট স্বেদ নির্গমন; শ্বাস কষ্ট; দুর্বলতার দণ্ড যেকপ হয় বকের মধ্যে সেকপ বেদনাভাব (ষ্টোনাম); কাশিতে কাশিতে উদরস্থ আহার দ্রব্যাদি বমন; কাশি এবং গলাদিয়া পূঁথ সংযুক্ত স্বেদ নির্গমন; বকের দুর্বলতা এবং শ্বাস কষ্টের দণ্ড অনেকক্ষণ ধরিয়া কথা বলিতে অশক্তি; বকে ভাবি এবং চাপা বোধ ।

হৃৎপিণ্ড । যে সকল গুণ শীত শীঘ্র বড় হয়, অকালে যৌননাবতা প্রাপ্ত হয়, এবং হস্তমৈথুন বা স্ত্রাসহবাসে অত্যন্তার করে, তাহাদিগের হৃৎস্পন্দন ।

হাত, পা ইত্যাদি । প্রাতঃকালে হাত পা এবং শরীরের সমুদয় সন্ধিত বেদনা; হাত পায়ের হাড় চন্দনবৎ, ভিড়িয়া ফেলার স্থায় বেদনা এবং জ্বালা; উদরাময়, রক্তস্রাব, ধাতু নির্গমন ইত্যাদির পর হাত পায়ের দুর্বলতা (ক্যাঙ্ কাঙ্ক্, চাবনা, ফস) ।

চর্ম্ম । সমুদয় শরীরে চুলকানি এবং কুটকুটানি; শরীরের স্থানে স্থানে পোবাণ পোবাণ ফোঙ্কান স্থায় কুসুড়া; আঁচিল (Warts); ক্ষত এবং উহার চর্ম্ম হাড়ের সঙ্গে বেন লাগিয়া থাকে; পুরুষাঙ্গ এবং জ্বীলোকের যোনি দ্বারে ফুলকাকির ফুলের স্থায় কল্‌তানি বিশিষ্ট বা শুকনা ফুসুড়ী এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে উক্ত যন্ত্রদ্বয়ে গরমীর ঘা এবং হাড় বেদনা ।

নিদ্রা । অত্যন্ত নিদ্রালুতা বা নিদ্রাবেশ এবং গা মাটি মাটি করা ; রাত্রি ছই প্রহরের পর ঘুম হব না ; স্ত্রীসহবাস বিষয়ে স্বপ্ন দেখিয়া (সাই-লিসি) ধাতু নির্গমন ; গভীর নিদ্রা ; দিনের বেলা, সন্ধ্যার সময় এবং প্রাতঃ-কালে ঘুমের ইচ্ছা ; মৃত্যু বিষয়ে স্বপ্ন দেখিয়া মনের অত্যন্ত উদ্বেগ ।

জ্বর । শীত এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কম্প (প্রায়ই সন্ধ্যার সময়) , এবং উহার পর অত্যন্ত দুর্বলকারক ঘর্ষ : শরীরের বাহ্যিক শীতলতা অপেক্ষা আভ্যন্তরিক শীতকম্প অধিক (টউপেট্) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে হাত এবং আঙ্গুলের মাথা ঠাণ্ডা ; সন্ধ্যার সময় সমুদয় শরীর গরম হয় ; আভ্যন্তরিক গরম বোধ, কিন্তু গায় ছাত দিলে গরম বোধ হয় না ; রাত্রিতে এবং প্রাতঃকালে প্রচুর ঘর্ষ (ক্যাক্ কার্ক, চায়না, মার্ক, সাইলিসি, সান্ড্-আস্) ; শরীর এত গরম হয় যে উহার দক্ষণ অনেক রোগীর চেতনা একবারে থাকে না ; নাড়ী অনিয়মিতরূপে স্পন্দন করে এবং অনেক সময় অসম (Intermittent) হয় ; আঙ্গিক-জ্বর বা জ্বরবিকার । সবিরাম জ্বর এবং সমুদয় শরীরে শীত কম্প, আঙ্গুল বরফের ন্যায় শীতল, পিপাসা থাকে না এবং তৎপর শরীর উষ্ণ হইয়া পিপাসার উদ্রেক হয় ; অথবা শরীর অত্যন্ত গরম হইয়া বোগের চেতনা একবারেই থাকে না ।

ব্যবহার । অকালে মদিত বা যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হওয়া জনিত অসুখ ; স্ত্রীসহবাসে অত্যাচার এবং হস্তমৈথুন, শোক, দুঃখ, বাড়ীতে থাকা বা বাড়ীতে যাওয়ার ইচ্ছা বা কাহাবো প্রেমে নৈরাশ হওয়া জনিত অসুখ ; অস্থির আবরণ পদার অসুখ ; হাড পোকায় থাওয়া (Caries) ; গ্রন্থিব অসুখ ; হিষ্টিরিয়া ; মনোবোগ (Hypochondriasis) ; আঙ্গিক-জ্বর বা জ্বর বিকার ; সবিরাম জ্বর ; অজীর্ণ ; পুষ্কাত উদবাসন ; ধ্বজভঙ্গ ; শুক্রক্ষরণ ; স্নায়ুকের বিষাক্ত প্রদাহ ; কষ্টকর রক্তস্রাব এবং শাখকের বেদনা ; প্রচুর রক্তস্রাব ; শ্বেত প্রদল ; বক্তমূত্র ; যক্ষাক্ষ এবং স্নায়বিক দুর্বলতা ; হস্তমৈথুন এবং স্ত্রী সহবাসে অত্যাচার হেতু শুক্রক্ষরণ ; নাখার চুল পড়িয়া যাওয়া ইত্যাদি রোগে কক্ষরিক আসিড্ ব্যবহার্য্য ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । অত্যন্ত দুর্বলতা এবং বলক্ষয়, বিশেষ-যতঃ প্রাতঃকালে ; ইহার কার্য্য সাময়িক মণ্ডলীতেই অধিক প্রবল ; বেদনা-

হীন উদরাময় ; যে সকল বালক বালিকা বা যুবক যুবতী শীঘ্র শীঘ্র বাড়ে বা বড় হয় ; হাড়ের আবরক পর্দাতে চাঁচিয়া ফেলার ভ্রান্ত বেদনা ; বিশ্রামে, রাত্রিতে, গায় কাপড় না দিলে এবং গরম আহার দ্রব্যে অস্থিরতা বৃদ্ধি ; নড়াচড়া এবং উত্তাপে অস্থিরতা বৃদ্ধি ; কোন কার্য্যই করিতে ইচ্ছা যায় না ; গ্রন্থির বেদনাহীন ক্ষীণতা ; অনবরত নড়াচড়ার ইচ্ছা ইত্যাদি কক্ষরিক আসিডের কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । হস্তমৈথুন বা স্ত্রীসংবাসে অত্যাচার হেতু অস্থি এই ঔষধ বিশেষ উপকারী ।

সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ । কক্ষরাসের প্রায় সমুদয় কার্য্যই কক্ষরিক আসিডের কার্য্যের স্থায় । এতদ্ভিন্ন কোন কোন বিষয়ে ক্ষুরোরিক আসিড, সাইনিসিয়া, চায়না, আনাকাডিয়া, ইগ্রেসিবা, অগ্নাত্ত আসিড, আসিনিয়, ক্যালকেরিয়া কার্ব, সালফার, লাইকোপডিয়া ইত্যাদি ঔষধগুলির কার্য্যও অনেকটা কক্ষরিক আসিডের কার্য্যের স্থায় ।

প্রতিষেধক ঔষধ । ক্যাম্ফার এবং কফিরা

ডাইলুশন বিচার । স্নায়বিক অস্থি, শুষ্কবৎমূত্র, জ্বর ইত্যাদিতে ৩ হইতে ১২ ডাইলুশন ব্যবহার্য্য । ধ্বজভঙ্গ, স্ত্রীসংবাস বা হস্তমৈথুনে অত্যাচার হেতু অস্থি, মুখে ঘা, বহুমূত্র, অস্থি পোকায় ধরা (Caries), বাইটস্ ডিজিজ্ (Bright's Disease) ইত্যাদি রোগে ১ম বা ২য় দশমিক ডাইলুশন দ্বারা ২। ৩ ফোঁটা মাত্রায় বিশেষ উপকার পাওয়া যায় । এতদ্ভিন্ন অগ্নাত্ত রোগে ৩, ১২ এবং ৩০ ডাইলুশন ব্যবহার্য্য । শুষ্কবৎ মূত্র (Chylous Urine) রোগাক্রান্ত একটা রোগীর চিকিৎসায় ১ম দশমিক ডাইলুশন, ২ ফোঁটা মাত্রায় প্রতিদিন প্রাতে ১ মাত্রা করিয়া ব্যবহার করিয়া ২ সপ্তাহ কাল মধ্যে বিশেষ ফল পাওয়া গিয়াছে । বহুমূত্র, শুষ্কবৎ মূত্র, ধ্বজভঙ্গ, বাইটস্ ডিজিজ্ ইত্যাদি রোগের চিকিৎসায় কক্ষরিক আসিডের ১ম দশমিক অপেক্ষা উচ্চ ক্রমে ব্যবহার করা এক প্রকার সময় নষ্ট, লেখক তাঁহার আপন চিকিৎসার ফল দেখিয়া একরূপ বিশ্বাস করেন ।

একোনাইটাম্ নেপেলাস,-একোনাইট,-একন্

(ACONITUM NAPELLUS,-ACONITE,-ACON.)

মধ্য এবং দক্ষিণ ইউরোপ এবং রুসিয়া ও মধ্য আশিয়াতে এই গাছের জন্ম। ইহা হিমালয় পর্বতেও জন্মিয়া থাকে। এতদ্দেশে ইহাকে মিঠা বিষ বলে। ইহা একটা অত্যন্ত বিবাক্ত দ্রব্য। এই গাছের ফুল দেখিতে অত্যন্ত সুন্দর ; এতদ্ভুক্ত অনেকে ইহা বাগানে রোপণ করিয়া থাকে। এই গাছের কাঁচা পাতা, ফুল, ফুলের নিকটবর্তী কোমল পাতাদি এবং মূল দ্বারা মূল আবোক বা মাদার টিংচার (Mother tincture) প্রস্তুত হয়। পাতাদির আরোক অপেক্ষা মূলের আরোকের তেজ অধিক। কাঁচা পাতা, ফুল এবং ফুলের নিকটবর্তী কোমল পাতার মূল আরোক প্রক্ স্পিরিটে (Proof spirit) প্রস্তুত হয়। কাঁচা মূলের আবোকও সচরাচর প্রক্ স্পিরিটে, এবং কখন কখন রেকটীকাইড্ স্পিরিটে প্রস্তুত হইতে পারে। শুকনা মূলের আরোকও প্রক্ স্পিরিটে প্রস্তুত হইয়া থাকে। শুকনা মূলের আরোক রেকটীকাইড্ স্পিরিটে প্রস্তুত করিলে আরোকের তেজ বৃদ্ধি হয়। মূল হইতে আরোক প্রস্তুত হইলে ইহাকে একোনাইট রাডিয়ন্স বলে।

সাধারণ ক্রিয়া। মনুষ্য দেহে এমন তরুণ রোগ অতি কমই আছে যাহার হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসায় একোনাইট্ নুনাধিক ব্যবহৃত না হইয়া থাকে। এতদ্ভুক্ত ডাক্তার হেম্পেল (Dr Hempel) ইহাকে হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য-তত্ত্বের “মেকদণ্ড” বালিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। মস্তিষ্ক এবং কসেরিকা-মজ্জা সম্বন্ধীয় স্নায়বিক মণ্ডলাব উপর ইহার কার্য অত্যন্ত প্রবল। ইহা প্রবোগে সুস্থ শরীরে ধমনী সম্বন্ধীয় রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়ার (Arterial circulation of the blood) বেগ অত্যন্ত বৃদ্ধি করিয়া, কৈশিক ধমনী (Capillary arteries) পক্ষাঘাত উৎপাদন করা হেতু শরীরের নানা স্থানে বিশেষতঃ মাস্তক, কসেরিকা মজ্জা, মাস্তক এবং শ্লেষ্মিক ফিলী (Serous and Mucous membranes), পেদী এবং সন্ধিতে বক্তৃতি বা বক্তাবোধ হইয়া উঠতে প্রবাহ হইয়া থাকে। ডাক্তার বার্খোলো (Dr. Barholow) বলেন যে একোনাইট্ জ্ঞান

উৎপাদক স্নায়ু সমূহকে (Sensory nerves) প্রথমতঃ আক্রমণ করিয়া তৎপর গতি উৎপাদক স্নায়ুগুলিকে (Motor nerves) আক্রমণ করিয়া থাকে। ইহা প্রথমতঃ যন্ত্রের অগ্রভাগ, তৎপব স্নায়ুর গোড়া এবং অবশেষে, কসেরুকা-মজ্জা আক্রমণ করিয়া উহার পক্ষাঘাত উৎপাদন করে। ইহা কসেরুকা মজ্জার গোণ (Reflex) কার্যেব বন্ধাঘাত জন্মায় বটে; কিন্তু ইহা জ্ঞানউৎপাদক স্নায়ুর পক্ষাঘাতের এক গোণি ফল মাত্র। কসেরুকার গতি উৎপাদক কেন্দ্র হইতে ইহা গতি উৎপাদনের ব্যাঘাত জন্মায়। হৃৎপিণ্ডের উপর ইহার কার্য অত্যন্ত প্রবল,—ইহা প্রথমতঃ হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনের সংখ্যা কম করে এবং অবশেষে ইহা হৃৎপিণ্ডের কার্য রোধ করে। ইহা ধমনিতে রক্তের বেগ কমায়। অতএব ইহা হৃৎপিণ্ডেব গ্যাঙ্গলিয়া (Ganglia), স্নায়ু এবং পৈশিক নিশ্চয় আক্রমণ করিয়া থাকে। একোনাইট্ নিউমোগাস্ট্রিক স্নায়ুর (Pneumogastric nerve) উপরের আংশাল অংশ দিয়া খাস প্রস্থানের সহায়ক পেশী পক্ষাঘাত উৎপাদন করে। ইহা চর্দ্র এবং মূত্রকোষের স্বাভাবিক নিঃসরণ বৃদ্ধি করে বাহ্যবদকন মূত্র, ঘর্ম ইত্যাদির সঙ্গে সঙ্গে যথোচিত পরিমানে শরীরে সঞ্চিত দূষিত ঘন পদার্থ জ্বলিও নির্গত হইয়া থাকে। অর এবং স্বাস্থ্যবিক অস্থিরতা একোনাইটের প্রাকৃতিক নির্দিষ্ট চিহ্ন মধ্যে পরিগণিত। ইহা একটা উৎকৃষ্ট প্রদাহ নিবারক (Antiphlogistic) ঔষধ মধ্যে পরিগণিত।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মন । অত্যন্ত ভীকতা (অরাম্, বেল্, চায়না, ইগ্‌নেস্, ফস্) বিশেষতঃ ভয় খাওয়ার পর; অককারে ভয়, ভূতের ভয় (পান্‌স্, অস্); উগ্র প্রলাপ, বিশেষতঃ রাত্রিবোধে; নিকটবর্তী মৃত্যুভয় (অগ্‌নাশ্, অস্, সিমিসিক্, নাটটিক্ অস্, সিকেল্); রোদী বলে যে সে অমুক দিন মরিবে (এপিস্); অনিবার্য মনের উদ্বেগ এবং চিন্তা; মর্দাদা হৃৎ প্রকাশ করা, সামান্য কারণেই বক্ বক্ করা, হৃৎ প্রকাশ করা এবং তিরস্কার করা (মাইটিক্ অস্); অত্যন্ত অস্থিরতা, নিদ্রাশূন্যতা এবং বিছানায় ছটফট করা (এথুসা, অস্, রাস্টল্, নেট্রাম্, ক্যাম্ফার); এপোমেনো রোধ;

স্মরণ শক্তির হ্রাস বা দুর্বলতা; মনের অবস্থা সর্বদাই পরিবর্তিত হয়,—অর্থাৎ একবার সন্তোষের ভাব এবং উহার পরক্ষণই বিমর্ষভাব (ইগ্নেন্স; নাক্স্ ফস্); ভয় থাইয়া অস্থ (জেল্‌স্, ওপিয়াম্); বৈরক্তি এবং ক্রোধ জনিত অস্থ (ব্রাই, ক্যাম্); বিছানা হইতে দৌড়িয়া যাওয়ার চেষ্টা; রাক্রিতে প্রলাপ ।

মস্তক। মাথাঘোরা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বমনোদ্বেষ্ট এবং চক্ষু অন্ধকার দেখা; শয়নাবস্থা হইতে উঠিলে মাথাঘোরা (ব্রাই, ক্যাম্, ফস্) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মুছাঁ থাইয়া মুখ মণ্ডল মলিন বা শিটা হওয়া (বেল্, পাল্‌স্, সাল্‌ফ্); মাথা হেট করিলে মাথাঘোরা; চলিতে টলিয়া পড়া, বিশেষতঃ ডাইন দিকে; মাথায় রক্তাবরোধ, ক্রোধ, ভয় এবং হঠাৎ রক্ত-রোধ হেতু মাথাঘোরা; জল সিদ্ধ করিলে যেরূপ হয় মস্তিষ্কে সেরূপ আন্দোলন বোধের সহিত মাথাধরা; মাথায় পূর্ণ এবং ভারিবোধ বাহার দরুণ মনে হয় কেন্‌কপাল কাটিয়া মস্তিষ্ক ঠেলিয়া বাহির হইবে (ব্রাই, সাল্‌ফ্); সূর্য্যাস্ত (Sunstroke) (বেল্, গ্লোনয়েন্) বিশেষতঃ সূর্য্যের উত্তাপে ঘুমাইলে; মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ; মনের উদ্বেষ্ট; মুখমণ্ডল লালবর্ণ এবং উষ্ণ (ফেরাম্), ফিকা বা শিটা; গ্রীবার ধমনী অত্যন্ত প্রবল বেগে দপ্ দপ্ করে (বেল্); নাড়ী পূর্ণ, মোটা, প্রবল অথবা ক্ষুদ্র এবং দ্রুতগামী; সন্ধ্যার সময় অস্থের বৃদ্ধি; কপালে নাকের গোড়ায় নিউডা-নের তায় অন্তর্ভূত হয় এবং বাহার দরুণ রোগী (জীলোক) মনে করে যে তাহাব হিতাহিত জ্ঞান আর থাকিবে না; মনে হয় যেন চুল খাড়া হইয়াছে; স্পর্শনে মাথা টাটায় বা বেদনাযুক্ত হয় (বারাইটা কাল্‌, বেল্, চায়না, নৈট্রাম্ মিতউব, নাইট্রিক্ অ্যাস্, মার্ক্, মেক্সিবিয়াম্, নাক্স্ বম্)।

চক্ষু। চক্ষুর তরুণ প্রবল প্রদাহের প্রথম অবস্থায় (বেল্), চক্ষের মধ্যে ছাপিয়া ধরা, খোঁচাবিধার তায় বেদনা এবং আলোকভব, বিশেষতঃ চক্ষুর গোলক ঘুরাইলে; চক্ষুর মধ্যে বালিব কণা, চক্ষুর পাতার পক্ষ (Eyelashes) প্রবিষ্ট হইয়া রা হিম ঠাণ্ডা বা শুষ্ক বাতাস লাগিয়া চক্ষু বোজক্ ঝিল্লী প্রদাহ (Conjunctivitis); চক্ষে আলোক, বিশেষতঃ সূর্য্যের, সহ্য হয় না (সাল্‌ফ্); আলোক চক্ষে লাগে বা সহ্য হয় না (বেল্); মনে

হয় যেন চক্ষুর গোলক স্বাভাবিক অপেক্ষা বড় হইয়াছে, যাহার দক্ষণ চক্ষু উহার কোটির হইতে বাহির হইয়া পড়িবে একরূপ অমুভূত হয় ; চক্ষুর পাতা কঠিন, লালবর্ণ, ক্ষীত এবং উহাতে কসিয়া ধরার স্থায় যাতনা বা আঁটা বোধ ; চক্ষে গরম, শুষ্ক ও জ্বালাবোধ এবং উহাতে বাতাস লাগিলে অস্বস্তি বোধ হয় ; চক্ষু দিয়া প্রচুর পরিমাণে জল পড়া ; চক্ষুর তানু বিস্তৃত হয় ; চক্ষে আলোক একবারে সহ হয় না অথবা উজ্জ্বল আলোকে ধাক্কার ইচ্ছা ।

কর্ণ । কাণে গোলমাল একবারেই সহ হয় না এবং সকল প্রকার শব্দই কাণে লাগে (বেল্, লাইকোপ্) বিশেষতঃ বাদ্য (আম্‌স্, কন্স-আস্) ; কাণেব মধ্যে নৌ নৌ শব্দ হওয়া (চাঘনা, বেল্, লাইকোপ্) ; কাণের বহির্দেশে উষ্ণ, লালবর্ণ এবং ক্ষীত হয় (বেল্, এপিস্) ; ডাইন কানে বেদনা (একন্, অবাম্, বেল্, কন্‌চ্, হিপ্-সান্‌চ্, লাইকোপ্, গ্রাক্) ।

নাসিকা । শ্রাণ শক্তির অত্যন্ত প্রথরতা, বিশেষতঃ দুর্গন্ধই সহজে নাকে অধিক লাগে ; নাক দিয়া রক্ত পড়া (বেল্, ব্রাই) ; নাক দিয়া লাল রক্ত পড়া (ইবিজারণ) ; নাকি এবং উহার মধ্যে সঙ্গে ইঁটি (আর্কেস্ট, ইউক্সিয়াম্, অস্মিয়াম্) ; জ্বর, পিপাসা এবং অস্থিরতা ; নাকের গোড়ায় চাপিয়া ধরার স্থায় অত্যন্ত কষ্টকর বেদনা (ক্যালী বাই, মার্ক্, আয়েন্ড, নেটাম্, আর্স্, প্লাটিনা) ।

মুখমণ্ডল । মুখমণ্ডল উদ্বিগ্ন এবং ভয়ের চিহ্নযুক্ত ; গাল পর্যায়ক্রমে লাল এবং ফিকা বা শিটা হয় ; অথবা এক গাল লাল এবং অপব গাল ফিকা বা শিটা (ক্যাম্) ; মুখমণ্ডল লালবর্ণ এবং টল্টলে (বেল্, ওপি-রাম্) ; মনে হয় যেন মুখমণ্ডল স্বাভাবিক অপেক্ষা বড় হইতেছে ; বসি অবস্থা হইতে দাঁড়াইলে লাল মুখমণ্ডল মৃতবৎ ফিকা বা শিটা হয় (বিরেট্টাম্ আল্‌চ্) ; মুখমণ্ডলের বাম পাশেব মাস্‌শুল (স্পাইজেল্) ; মুখমণ্ডল লালবর্ণ এবং উষ্ণ ; অস্থিরতা, মনের উদ্বিগ্ন এবং চোঁৎকার করা ।

মুখ-গহ্বর এবং গলার মধ্য । দাঁতের গোড়ায় চিড়িক মাঝার স্থায় বেদনা এবং উহাৰ সঙ্গে সঙ্গে জরতাব এবং মাথার রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধেব ভাব । ওষ্ঠ, মুখগহ্বর এবং জিহ্বায় জ্বালা, কুটুটানি এবং উহাতে অবশবোধ, মুখে শুষ্কবোধ (এইলেচ্, আর্স্, ব্রাই, হারোস্,

নাক্স-মফ্); হিম ঠাণ্ডা অথবা শুষ্ক ঠাণ্ডা বাতাস লাগিয়া এক পাখের দাঁতের গোড়ায় দপ্‌দপিয়া বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গাল লালবর্ণ এবং মাথায় রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ; দাঁতে ঠাণ্ডা বাতাস সহ্য হয় না (স্পাইজেল্); মুখে তিক্তস্বাদ (ব্রাই, কলোস্, চায়না, নাক্স-বম্, হিপ্-সাল্‌ফ্, পাল্‌স্); মুখ দিয়া প্রচুর পরিমাণে লাল পড়ে (চায়না, মার্ক্-আয়োড্, নাইটি-আস্)। গলার মধ্যে জ্বীলা এবং অবশ বোধ (ক্যাপ্); কোমল তালুকা (Soft-palate) এবং আল্‌জিহ্বা গালবর্ণ (বেল্); মুখ-গহবরের পশ্চাৎ ভাগ এবং আহারবহা গলনালীর উপরিভাগ কাগ্‌চে লালবর্ণ (ব্যাণ্ট্) এবং উহাতে জ্বালা এবং কুট্‌কুটানি (এপিস্); গলার মধ্যে অত্যন্ত শুষ্কবোধ বাহার দরুণ মনে হয় যেন গলার মধ্যে কোন বস্তু লাগিয়া রহিয়াছে (আলাম্, হিপ্-সাল্‌ফ্, নাইটি-আস্)।

পাকস্থলী এবং উদর । অক্ষুধা এবং আহারে অরুচি (আন্টি-কুড্, আর্গিক্, আস্); অত্যন্ত প্রবল অনিবার্য পিপাসা (আস্, ব্রাই, চায়না, মার্ক্, নেট্রাম্ মিউর, রান্ টক্স্); বিয়ার (Beer) নামক মদ্য পানের ইচ্ছা (ককিউল্, সাল্‌ফ্); মদ্যপানের ইচ্ছা (ব্রাই, চায়না), অথবা ব্রাণ্ডি (Brandy) মদ্য পানের ইচ্ছা (পাল্‌স্); শরীর অত্যন্ত উত্তপ্ত হইয়া ঠাণ্ডা হইতে না হইতেই বরফ মিশ্রিত জল পান করিয়া পাকস্থলীর শৈথিল্য বা আম রোগ; অত্যন্ত কষ্টকর হিকা (হারোস্, নাক্স-বম্, ট্রায়ম্); লম্বা স্বপ্নবৎ গোল কুমি বমন (সাক্সনেবিয়া); পিত্তবমন (আস্, পডোফ্); সবুজ পদার্থ বমন; শ্বেতাবমন (আন্টি টার্ট্, ইপিকাক্) উদরস্থ জল বা জলীয় পদার্থ বমন (আস্, ফস্); বমনের সঙ্গে সঙ্গে মনের উদ্বেগ, গরম বোধ, পিপাসা, প্রচুর ঘন্থ এবং বারম্বার মূত্রত্যাগ; এক খানি ভারি বস্তু বা পাথর থাকিলে যে রূপ হয় পাকস্থলীর মধ্যে সে রূপ ভারি বোধ (ইস্কুলাস্, আস্, ব্রাই, নাক্স-বম্, পাল্‌স্); পাকস্থলী হইতে আহারবহানালী দিয়া মুখ পর্যন্ত জ্বালাহুভব (আস্); স্পর্শনে পাকস্থলী প্রদেশে বেদনার উদ্বেক হয় বা টাটায়। উদরের দুই পার্শ্বে চাপাযুক্ত বেদনা; যকৃত প্রদেশে আঁটা বোধ এবং সূচী বিধানের জ্বায় বেদনা বাহার দরুণ শ্বাস প্রশ্বাসের ব্যাঘাত জন্মে (আস্, ব্রাই, চায়না, ক্যালী-ক্লার্ক্); উদর ক্ষীত, অত্যন্ত উষ্ণ এবং

চাপিলে বা স্পর্শ করিলে টাটায় বা বেদনায়ুক্ত হয় (বেল্, কুপ্রাস্); উদরে যেন কোন পদার্থ এদিক হইতে ওদিকে হঠাৎ বারম্বার ঘাইতেছে একরূপ অহুভূত হয় (কস্-আস্); বমন এবং মূত্রত্যাগে অশক্তি; অন্ত্রের মধ্যে জ্বালা এবং কঠিনবৎ বেদনা, চাপিলে বা ডাইন পার্শ্বে শয়ন করিলে বাহ্যিক বৃদ্ধি হয়; কামল রোগ; উদরের শোথের জ্বায় স্থিতি (উদরী)।

মল। মল জলবৎ তরল (আণ্টি-কুড্, আর্গিকা, চায়ীরা, পডোফ্), সাদা, এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে লালমূত্র ত্যাগ, ঘাসের জ্বায় ছেকরা ছেকরা, কাল, দুর্গন্ধযুক্ত (আস্), রক্ত মিশ্রিত এবং সাদা চট্‌চটিয়া মলত্যাগ; মল পরিমাণে অল্প, তরল, এবং বারম্বার স্বাভাবিক মলের সঙ্গে আম মিশ্রিত মলত্যাগ ও উহার সঙ্গে সঙ্গে কোঁথপাড়া; ছোট কুমির দরুণ রাত্রিতে শুষ্ক দ্বারে অসহ্য চুলকানি এবং কুট্‌কুটানি (আস্, সিনা, গ্রাফ্); এক-বারে কোষ্ঠবদ্ধ; বারম্বার অল্প পরিমাণে মলত্যাগ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কষ্টদায়ক কোঁথপাড়া।

মূত্রযন্ত্র। বারম্বার কষ্টকর মূত্র ত্যাগের ইচ্ছা (বোরাক্স্); কষ্টকর মূত্র ত্যাগ, মূত্র ফোঁটায় ফোঁটায় পড়ে; মূত্র লালবর্ণ বা কালচে, পরিমাণে অল্প, আগুনের জ্বায় গরম এবং জ্বালা উৎপাদক (এপিস্, আস্, বেল্, ক্যাছ্); মূত্রাবরোধ (এপিস্, হায়েরোস্, ট্রামন্) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মূত্রাধারে চাপাবোধ ও মূত্রকোষ প্রদেশে স্থিতিবিধানের ন্যায় বেদনা; ঠাণ্ডা লাগিয়া সম্ভবরোধ, বিশেষতঃ ছোট বালক বালিকাগণের এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে ক্রন্দন এবং অস্থিরতা।

জননেন্দ্রিয়। অণ্ডকোষে মোচড়াইয়া পড়ার জ্বায় বেদনা (আর্জেন্ট্, আর্গিকা); অণ্ডকোষ ক্ষীত এবং কঠিন (আগ্নাশ্, অবাম্, কোনীয়াস্); ভয় পাইয়া স্ত্রীলোকের রজঃরোধ (লাইকোপ্); বৈবরক্তি বা ঠাণ্ডা লাগিয়া রজঃরোধ, বিশেষতঃ রক্তাধিক্য দ্বারা বিশিষ্ট স্ত্রীলোকের; জরায়ু দিয়া উজ্জল লাল রক্ত স্রাব (ইরিজারগ, সিকেল্, ইপিকাক্); সর্বদা মনের উত্তেজনা; নাথাঘোরা; সোজা হইয়া বসিতে অশক্তি; মূত্রাভয়; যোনিদ্বার শুষ্ক, উষ্ণ এবং বেদনায়ুক্ত (বেল্); সন্তান প্রসবের পর যোনি দ্বার দিয়া রক্ত (Lochia) নিঃসরণ বদ্ধ হওয়া (সিমিসিফ্); চন্দ্র উষ্ণ এবং শুষ্ক; স্তনের

দ্রুত পরিমাণে অল্প; পেট ফাঁপা এবং চাপিলে উহাতে বেদনা বা টাটানি (বেল্); হঠাৎ প্রজঃরোধ হইয়া দিম্বকোষের প্রদাহ (Ovaritis); (সিমিসিফ্); ভয় বা বৈবরক্তির দরুণ গর্ভস্রাব হওয়ার উপক্রম হওয়া।

শ্বাস যন্ত্র। স্বরভঙ্গ (কষ্ট, ক্যালীবাই, ফস্, স্পঞ্জ); শ্বাসনে কঠিনালী টাটাক (ল্যাক্); শ্বাস দ্বারা বায়ু টানিলে কঠিনালীতে বেদনা (স্পঞ্জ); কঠিনালী প্রদাহ (Laryngitis) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে প্রদাহজনিত জ্বর এবং শ্বাসরোধক আক্ষেপ; ঘনভী কাশি এবং উহার দরুণ ঘুম যাওয়ার অনতিকাল বিলম্বেই ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়, অত্যন্ত কষ্ট হয় এবং রোগী ছট্‌ছট্ করে; কণ্ঠহারী শুক কাশি; শুক, ঠাণ্ডা বাতাস লাগিয়া কাশি (হিপ্-নাল্, স্পঞ্জ); শুক, স্বরভঙ্গ বিশিষ্ট, উচ্চ শব্দযুক্ত কাশি (স্পঞ্জ); আক্ষেপিক, কর্কশ কাশি যাহার দরুণ শ্বাসরোধ হইয়া ফাঁপড় হওয়ার ভয়ে রোগী আগিয়া থাকে (ল্যাক্); শুক, কঠিন এবং ঠণ্ডনিয়া শব্দ বিশিষ্ট কাশি; প্রত্যেক বার কাশিই আক্রমণের সময় রোগী (ছোট বালক বা বালিকা হইলে) আপন গলা চাপিয়া ধরে (আয়োড্); গলা দিয়া উজ্জল লাল রক্ত পড়ে; রক্তোৎকাশি এবং গলা সামান্য থক্ থক্ করিলে, কাশিলে বা গলা থেকুর দিলেই রক্ত নির্গত হয়; বুকে আঁটাবোধ বা উদ্বেগ, স্বাস্পন্দন, নাড়ী ক্রতগামী এবং বুকে স্থতীবিধানের জ্বার বেদনা (ব্রাই, ক্যালী কার্ক্, ফস্); মনের সামান্য উত্তেজনা, মদ্যপান অথবা শুক ঠাণ্ডা বাতাসে গলা দিয়া রক্ত পড়ে; রোগী ডাইন পার্শ্বে শয়ন করিতে পাবে না, সে চীৎ হইয়া শয়ন করিয়া থাকে (মার্ক্); বুকে স্থতীবিধানের জ্বার বেদনার সঙ্গে সঙ্গে কাশি (ব্রাই, ক্যালী কার্ক্, মার্ক্, ফস্); বুকের মধ্য দিয়া ছুবি বিধানের জ্বার বেদনা, গা গরম, শ্বাস কষ্ট এবং অনেক সময় অত্যন্ত শীত কম্প; বিলম্বে বিলম্বে কষ্টকর নিশ্বাস পশ্বাস অথবা শ্বাস প্রশ্বাস ঘন ঘন, ভাসান; বুকের মধ্য অত্যন্ত বাতনা যাহার দরুণ রোগী সোজা হইয়া বসিয়া থাকিতে বাধ্য হয়; নিশ্বাস প্রশ্বাসে অত্যন্ত কষ্ট অনুভূত হয়; নাড়ী স্তব্ধ হস্ত (আন্টি-টার্ট্, আন্, সাধ্ কাশ্); কাশিতে কাশিতে বমন দ্বারা রক্ত উঠে; ঘণ্টা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত উদ্বেগ; খাট পাজরার হাড়ের নীচে ক্ষীণতা; তাড়াতাড়ি চলিবার সময় বা নিম্ন স্থান হইতে উচ্চ

স্থানে উঠিবার সময় বৃক্ক অঁটািবোধ এবং শ্বাস কষ্ট (আস্‌ন কার্ক, ক্যাক্, আস্‌) ; হৃৎপিণ্ডের অস্থখ ঐক্লপ হইলে (ক্যাক্টাস) ; বক্ষাস্থির (Sternum) নীচে ভারি এবং আলাবোধ ।

হৃৎপিণ্ড এবং নাড়ী । হৃৎপ্রদেশে ভয়ানক কষ্ট এবং উদ্বেগ ; হৃৎস্পন্দন (ক্যাক্টাস, ক্যাক্) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে হৃৎপ্রদেশে ভয়ানক কষ্ট (স্পাইজেল, আস্‌) এবং অস্থিরতা, শ্বাসকষ্ট, মাথায় গোলবোগ, মুখমণ্ডলের স্থানে স্থানে গবম ; হৃৎপ্রদেশে চাপিয়া ধরার জ্বায় বেদনা ; হৃৎপ্রদেশে পূর্ণবোধ ; নাড়ী কঠিন, প্রবল, পূর্ণ এবং নোটা ; হৃৎপ্রদেশে কসিয়া ধরার জ্বায় সঙ্কোচন এবং উহাতে স্থচীবিধানের জ্বায় বেদনা ; বৃক্ক অঁটিয়া ধরা ; হৃদযাহাবরক কিয়া প্রদাহ (Pericarditis) ; হৃৎপিণ্ডের সামান্য অস্থখ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বাম বাহতে অবশবোধ (রাস্টক্স) ; আঙ্গুলে কুটকুটানি এবং মূচ্ছা ; অরে নাড়ী প্রবল, পূর্ণ, কঠিন (বেল, বিরেটাম্‌ বির) ; হাঁপানি কাশিতে নাড়ী ক্ষুদ্র, অসম এবং মনিয়মিত স্পন্দনবিশিষ্ট (আস্‌) ; অজাবরক কিয়া প্রদাহে (Peritonitis) নাড়ী ক্রান্তগামী, কঠিন, ক্ষুদ্র ; নাড়ী সঙ্কুচিত, পূর্ণ, প্রবল এবং প্রতি মিনিটে ১০০ বার স্পন্দন করে এবং হৃৎপিণ্ড হইতেও অধিক ক্রান্তগামী, লুপ্তপ্রায় বা লুপ্ত বা স্থব্রবৎ কল্প এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত উদ্বেগ (আস্‌) ।

ঘাড় এবং পৃষ্ঠদেশ । ঘাড়ে ছিঁড়িয়া ফেলার জ্বায় বেদনা ; ঘাড় শক্ত হয় বা উহা নোয়ান যায় না এবং উহাতে অত্যন্ত বেদনা, ঘাড় নাড়িলে যাহার রুদ্ধ হয় ; এই বেদনা ডাইন দ্রুত পর্যান্ত বিস্তৃত হয় (জেন্স) ; হৃদযাহাবরক মধ্যবর্তী স্থানে নোচড়াইয়া পড়ার জ্বায় বেদনা (রাস্টক্স) ; হৃদযাহাবরক কসিয়া ধরা বা ছিঁড়িয়া ফেলার জ্বায় বেদনা ; পৃষ্ঠদেশ শক্ত হয় বা উহা নোয়ান যায় না (রাস্টক্স) ; কোমরের পশ্চাৎ ভাগে অবশবোধ বাহা পা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় ; পৃষ্ঠদেশে বেদনার দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যাঘাত জন্মে ।

হাত পা ইত্যাদি । হৃদযাহাবরক সন্ধি, কনুইয়ের সন্ধি, হাত, মণি-নক্ক এবং হাতের আঙ্গুলে কসিয়া ধরা বা ছিঁড়িয়া ফেলার জ্বায় বেদনা (ব্রাই, ব্রডোড্‌, রাস্‌ টক্স, পাল্‌স্‌) ; বাহতে অবশ বোধ বাহ্যিক দ্রুত হাত চালনে অশক্তি ; বাহ, হাত এবং হাতের আঙ্গুলের মধ্য দিয়া কোন

প্রাক্তি হামা দিয়া বাইতেছে একরূপ অম্লভূত হয় বা হৃদ্‌হৃড়ী (রাস্‌ টক্স্‌) ; ঘৃণা বা প্রবল আঘাত ইত্যাদি লাগিলে যেকরূপ অবশ্য হয় বাহ্য সেরূপ অবশ্য হইয়া খুলিয়া পড়ে বাহার দরুণ মনে হয় যেন উক্ত অঙ্গের পক্ষাঘাত হইয়াছে ; হাতের আঙ্গুলে হৃদ্‌হৃড়ী, বিশেষতঃ লিখিবার সময় ; হাত বরফের জায়গা ; হাতের পাতায় শীতল বস্তু ; হাতের পাতা গরম। উরু এবং পায়ের সমুদয় সন্ধিতে কসিয়া ধরা বা ছিঁড়িয়া ফেলার ন্যায় বেদনা (ব্রাই, রাস্‌ টক্স্‌, পাল্‌স্‌) ; বিশ্রাম বা শয়নকালীন পা ইত্যাদি নিম্নাঙ্গে ক্লান্তি বা অবশ্য বোধ (রাস্‌ টক্স্‌) ; বসিয়া থাকিলে পা প্রায় শক্তিহীন হইয়া অবশ্য হয় (রাস্‌ টক্স্‌) ; পায়ের ডিমে (খোড়ায়) খিল ধরে (ক্যাক্‌, ক্যান্‌ফার, নাক্স্‌ বম্‌, সাইলিস্‌, সাল্‌ফ্‌) ; চলিতে গেলে হাঁটুর সন্ধি ঠিক স্বাভাবিক ভাবে থাকে না ; পায়ের পাতা, বিশেষতঃ পায়ের আঙ্গুল, ঠাণ্ডা।

চর্ম্ম । চর্ম্ম লাল, উষ্ণ, উজ্জ্বল এবং ক্ষীণ এবং উহাতে প্রবল বেদনা (বেল্‌, ব্রাই) ; শরীরের নানা স্থানে স্ফুটনবিধানের জায় বাতনা ; মোমাছিতে কামড়াইলে যেকরূপ হয় শরীরের স্থানে স্থানে সেরূপ দাগ পড়ে (কোমায়াম্‌) ; চুলকাইলেও চুলকানি কমে না ; শিশুগণের গায় নানা প্রকারের ফুস্‌ফুস, বিশেষতঃ হাম, আরক্ত অরে (এপিস্‌, বেল্‌, পাল্‌স্‌) ।

নিদ্রা । শেব রাত্রিতে নিদ্রাশূন্যতা এবং তদরূপ বারম্বার বিছানায় এপাশ ওপাশ করিয়া ছট্‌ফট্‌ করা (এবিস্‌ ক্যান্‌) ; ঘুমের ঘোরে উদ্বিগ্ন উৎপাদক স্পষ্ট স্বপ্ন দেখার দরুণ হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া ঘুম ভাঙ্গে (আর্স্‌, বেল্‌, হায়োস্‌) ; চক্ষু বুজিলে নানা প্রকারের চিন্তা উপস্থিত হওয়ার দরুণ ঘুম হয় না ; রোগী এক পাশে কোন মতেই অনেকক্ষণ শুইয়া থাকিতে পারে না ; ঘুমের ঘোরে বারম্বার চমকিয়া উঠা।

জ্বর । সামান্য নড়া চড়া, গায়ের কাপড় ফেলিয়া দিলে বা কেহ শরীর স্পর্শ কবিলেই শীত বোধ ; শীত কম্প পায়ের পাতা হইতে উপরের দিকে বৃক্কে বিস্তৃত হয় ; বাহ্যিক শীত বোধ এবং আভ্যন্তরিক গরম বোধ, অত্যন্ত উদ্বিগ্ন এবং গাল লালবর্ণ ; গা গরম এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে প্রবল পিপাসা ; নাড়ী কঠিন, পূর্ণ, মোটা এবং দ্রুতগামী ; শ্বাস কষ্ট, মনের উদ্বিগ্ন ; অধৈর্য্যতা ; অশান্তি এবং কষ্ট যন্ত্রণায় বারম্বার বিছানায় এপাশ

ওপাশ করা ; ঘূমের অবস্থায় প্রচুর উষ্ণ ; ঘর্ম গায় বসিয়া যাইয়া জর ; অন্নকাল স্থায়ী জর ; প্রদাহ জনিত জর ; সবিরাম জ্বরের প্রারম্ভে ।

ব্যবহার । যে প্রকার প্রদাহ জনিত রোগে আলোপ্যাথিক মতে চিকিৎসায়, অস্ত্র দ্বারাই হউক, বা জৌক লাগাইয়াই হউক রক্তমোক্ষণ (Blood-letting) ব্যবস্থা, হোমিওপ্যাথিক মতে সে প্রকার রোগের চিকিৎসায়ই একোনাইট্ ব্যবহার্য এবং উপকারী । মনুষ্যের মঙ্গলের জন্য যে একোনাইটের সৃষ্টি এবং আবিষ্কার হইয়াছে তাহা, বোধ হয় বিজ্ঞ পাঠক মাত্রেই স্বীকার করিবেন । রক্ত মোক্ষণের অপকারীতা আজ কাল আলোপ্যাথিক মতে চিকিৎসকগণও বুঝিতে পারিয়া উক্ত চিকিৎসা প্রণালী ত্যাগ করিয়া তৎপরিবর্তে একোনাইট্ ব্যবহার করিতেছেন । প্রদাহ জনিত জ্ব অথবা যে প্রকার জ্বর মস্তিষ্কের আবরক ঝিল্লী প্রদাহ (Meningitis), বায়ুনল প্রদাহ (Bronchitis), ফুফুসাবরক ঝিল্লী প্রদাহ (Pleuritis), ফুফুস প্রদাহ (Pneumonia), শস্রাণ্ডিরক ঝিল্লী প্রদাহ (Peritonitis), জবাযু প্রদাহ (Metritis), মূত্রাশয় প্রদাহ (Cystitis), বাতরোগ (Rheumatism), যকৃত প্রদাহ (Hepatitis), অন্ত্রপ্রদাহ (Enteritis), ঘুংড়ী কাশি (Croup), সন্ধিস্রব, তরুণ চক্ষু প্রদাহ (Acute Ophthalmia), গলার মধ্যে বেদনা (Sorethroat) ইত্যাদি রোগের সঙ্গে সঙ্গে থাকে, তাহাতে একোনাইট্ ব্যবস্থা এবং বিশেষ উপকারী । অনেক সময় হৃদযন্ত্রাবরক ঝিল্লী প্রদাহ (Pericarditis), হৃদযন্ত্রাবরক ঝিল্লী প্রদাহ (Endocarditis), হৃৎস্পন্দন বা হৃৎবেদনা (Angina Pectoris), হাম জ্বর এবং ছোট বালক বালিকার জ্বরেও অনেক সময় একোনাইট্ আবশ্যিক হইতে পারে । কণ্ঠশূল, ক্রমি জনিত বোগ ; শুষ্ক ঠাণ্ডা বাতাস লাগিয়া অশুথ ; ঘর্ম বসিয়া যাইয়া অশুথ ; অত্যন্ত উত্তেজনা, ভয়, ক্রোধ এবং বিরক্তি জনিত অশুথ ; বিদগ্ধের হার প্রদাহ ; মাথার রক্তাবরোধ এবং তদ্রূপ মাথা কিম্বা ক্রিম করা ; রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ হেতু বা স্নায়বিক মাথা ধরা ; মস্তিষ্ক প্রদাহ ; মস্তিষ্কের তরুণ শোথ (Acute hydrocephalus) ; দন্তশূল ; পিত্ত জনিত অশুথ ; কামল রোগ ; অন্ত্রবৃদ্ধি ; হৃপিৎ কণ্ঠের প্রথনাবস্থা ; ইঁপানি কাশি ; রক্তোৎকাশ ;

জ্বংস্পন্দন ইত্যাদি অস্থখে একোনাইট্‌ ব্যবহার্য্য। স-বিষোৎপন্ন জ্বরে (Specific fevers) একোনাইট্‌ দ্বারা উপকার দর্শে না।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ। সন্ধির বাত জনিত প্রদাহ; সন্ধ্যার সময় এবং রাত্রিতে অস্থখের বৃদ্ধি; আক্রান্ত স্থান অত্যন্ত উজ্জ্বল লালবর্ণ (বেল), চক্‌চকে এবং ক্ষীত; স্পর্শনে আক্রান্ত স্থান অত্যন্ত বেদনায়ুক্ত হয় বা টাটায় (ব্রাই); আক্রান্ত অংশে অবশবোধ; অসহ বেদনা যন্ত্রণা এবং শরীরের আক্রান্ত সমুদয় অংশে অবশবোধ ও কুট্‌কুটানি বা স্ফুড় স্ফুড় করা; সোজা হইয়া বসিলে অবসন্নতার ভাব; সামান্য ঠাণ্ডা লাগিলেই অস্থখ হয় (ককিউলাস্‌, নাক্স-মক্স); অনেকক্ষণ ধরিয়া অস্থিরতা বা ছট্‌ফট্‌ করা (অস্‌); প্রায় সমুদয় অস্থখেই শীত কম্প, মনের উদ্বেগ এবং মৃত্যুভয়; রক্তাধিক্য ধাতু; বুক, মাথা এবং হৃৎপিণ্ডে রক্তাবরোধ; বেদনাদির সঙ্গে সঙ্গেই পিপাসা এবং মুখমণ্ডল লালবর্ণ হয়; আক্রান্ত স্থানে হলকুটানের স্থায় বেদনা। সন্ধ্যার সময় রাত্রিতে, বাম পার্শ্বে বা চীৎ হইয়া শয়ন করিলে, বিছানায় গেলে, বসি অবস্থা হইতে উঠিলে, উষ্ণ ঘরে, তামাকু খাইলে অস্থখের বৃদ্ধি (ইগ্নেস্‌)। বহির্বাযুতে, হির ও নিস্তব্ধভাবে বসিয়া থাকিলে (বাত রোগে), মদ্যপানে অস্থখের উপশম। সাধারণতঃ বিশ্রামে অস্থখের উপশম হয়; কিন্তু রাত্রিতে বিছানায় শয়ন করিলে বেদনা যন্ত্রণাদি অসহ হইয়া পড়ে (মার্ক)।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ। যে সকল রোগে গতি উৎপাদক পেশী এবং স্নায়ু আক্রমণ করে তাহাতে একোনাইটের কার্য্য বা গুণ সিকুটা বিরোসা এবং হাইড্রোসায়েনিক্‌ আসিডের স্থায়। বাত রোগে একোনাইটের কার্য্য এবং গুণ ব্রাইওনিয়া এবং সিমিসিফিউগা রেসিমোসার স্থায়। হৃৎপিণ্ডের উপর একোনাইটের কার্য্য অনেকটা ক্যাক্‌টাস্‌, নেজা এবং স্পাইজেলিয়ার স্থায়। এতদ্ভিন্ন আর্নিকা, বেলাডোনা, ক্যান্টাবিশ্‌, ক্যামোমিলা ইত্যাদি কতক গুলি ঔষধের কার্য্যের সঙ্গেও একোনাইটের কার্য্যের কতক সাদৃশ্য আছে।

প্রতিষেধক ঔষধ। আসিটিক্‌ আসিড্‌, সাল্‌ফার, বেলাডোনা, নাক্স-বমিকা ইত্যাদি একোনাইটের প্রতিষেধক ঔষধ মধ্যে পরিগণিত।

একোনাইট্ দ্বারা বিষাক্ত হইলে বমন উৎপাদক ঔষধ, সূরা, কোন কোন প্রকার অম্লোষধ এবং বিনিগার (Vinegar) ব্যবস্থা।

ডাইলুশন বিচার। হানিম্যান্(Hahnemann) এবং তাঁহার শিষ্যগণ জ্বর রোগে একোনাইটের ১৮ হইতে ৩০ ডাইলুশনের ১ মাত্রা প্রয়োগ করিয়া উহার ফল দেখিবার জন্ত কিছু কাল অপেক্ষা করিতেন, এবং এই প্রকার চিকিৎসা প্রণালী দ্বারা তাঁহারা বিশেষ ফলও পাইতেন। কিন্তু আজ কাল আমরা একোনাইটের ১ হইতে ৬ ডাইলুশন রোগীর বয়স অনুসারে ৬, ৯, ১ বা ১ ফোঁটা মাত্রায় রোগের অবস্থা বুঝিয়া, যে পর্য্যন্ত ঔষধ হইয়া জ্বর ভাগ্য না পায়, সেপর্য্যন্ত ১২৩৪৫৬ ঘণ্টা অন্তর ১ মাত্রা ব্যবস্থা করিয়া থাকি। শিশু ও ছোট বালক বালিকার বোলে লেখক ৩ এবং ৬ দশমিক ডাঃ সচরাচর ব্যবহার করিয়া থাকেন। বাত রোগ এবং অত্যন্ত প্রকোপ প্রদাহ জনিত রোগে ১ দশমিক ডাইলুশন বিশেষ উপকারী। ঘুংড়ী কাশি, হৃৎপিণ্ডের আক্ষেপ এবং ধতুহীকার রোগে ১ম দশমিক ডাইলুশন বিশেষ উপকারী। ওলাউঠা রোগে ১ম দশমিক ডাইলুশন এবং মূল আবোক ১ ফোঁটা মাত্রায় বিশেষ ফল পাওয়া যায়। স্নায়ু শূলে ৩য় দশমিক ডাইলুশন বিশেষ উপকারী। শিশু এবং ছোট বালক বালিকার হুপিং কফ এবং হাঁপানি কাশিতে ৩ ডাঃ ব্যবহার্য্য। জ্বরের শীত কল্প, রক্তস্রাবে বন্ধ সঞ্চালন ক্রিয়ার বৈলক্ষণ্য হেতু যে সকল অস্থির হয় এবং হৃৎপিণ্ডের কতক পরিমাণে পুরাতন অস্থির এবং অনেক কাল ঔষধ ব্যবহার করা আবশ্যক হইলে ৬ষ্ঠ ডাইলুশন ব্যবহার্য্য। ডাক্তার বেজ্ (Dr. Bayes) বলেন যে অত্যন্ত উত্তেজনার দরুণ রাত্রিতে ঘুম না হইলে একোনাইটের ১২ ডাঃ এক ফোঁটা মাত্রায় প্রত্যহ রাত্রিতে শয়ন করার সময় ১ মাত্রা সেবনে ভাল ঘুম হয়। ডাক্তার বেজের এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া লেখক বিশেষ ফল পাইয়াছেন। কোন কোন রোগীকে চিকিৎসায় তিনি ৩০ ডাইলুশন ব্যবস্থা করিয়া ১২ ডাইলুশন অপেক্ষাও অধিক ফল পাইয়া থাকেন। একোনাইটের গাছের মূল বা শিকড় হইতে যে মূল আবোক প্রস্তুত হয়, হাঁপানি কাশির প্রবল আক্রমণের সময় উহার ১ ফোঁটা মাত্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর এক মাত্রা একরূপ তিন মাত্রা সেবনে রোগের আক্রমণের বেগ কমিয়া ফাইতে লেখক স্বয়ং দেখিয়াছেন।

আন্টিমোনিয়াম্ টার্টারিকাম্,—টার্টার এমিটিক্,—আন্টি-টার্ট

(ANTIMONIUM TARTARICUM,—TARTAR EMETIC,—ANT. TART.)

এই ঔষধের ১ম দশমিক ক্রম যথা নিয়মে গুঁড়ার আকারে প্রস্তুত হইয়া থাকে। টার্টারের এমিটিক্ জলে দ্রব হয় বলিয়া ৯৫ ভাগ চূর্ণাণ্ জলে ৫ ভাগ রেক্টিফাইড্ স্পিরিট্ মিশাইয়া উহা দ্বারা যথা নিয়মে ইহার ২য় শততমিক ক্রম প্রস্তুত করা যাউতে পারে। ইহার ২য় শততমিক ক্রমের আরোক ডাই-নুট্ স্পিরিটে প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহার ৩য় এবং ততোধিক উচ্চ ক্রম যথা নিয়মে রেক্টিফাইড্ স্পিরিটে প্রস্তুত হইয়া থাকে। ১ম ক্রমের গুঁড়া প্রস্তুত করিতে হইলে আদত টার্টার এমিটিক্ কোন এক বিকৃত হোমিও-প্যাথিক ঔষধ বিক্রেতার ঔষধালয় হইতে ক্রয় করা উচিত।

সাধারণ ক্রিয়া। মস্তিষ্কের নিম্নভাগ এবং উহার মেডুলা-অব-লংগেটা নামক অংশের (Base of the Brain and Medulla-Oblongata) মধ্য দিয়া স্নায়বিক মণ্ডলের উপর ইহার কার্য অতি প্রবল। স্নায়বিক মণ্ডল দিয়া পাকস্থলীর স্নৈয়িক কিল্লী, ফুফুস এবং যকৃতের উপর ইহার কার্য প্রকাশ করে এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে নিউমোগ্যাস্ট্রিক্ স্নায়ু (Pneumogastric nerve) দিয়া শ্বাস প্রশ্বাস এবং রক্ত সঞ্চালন সম্বন্ধীয় বস্ত্রের অত্যন্ত অবসন্নতা উৎপাদন করে। সুস্থ শরীরে এই ঔষধে স্নৈয়িক কিল্লীতে স্নেয়াজনিত প্রদাহ উৎপাদন করে এবং তদরূপ প্রদাহবৃত্ত স্থানে ফোঁকার হায় এক প্রকার ফুস্ফুড়ী প্রকাশ পায়। এই ফোঁকার হায় ফুস্ফুড়ীগুলি চন্দ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া গায় বসন্তের গুটির হায় এক প্রকার ফুস্ফুড়ী প্রকাশ পায়। বৃকে অধিক পরি-মাণ স্নেয়া সঞ্চিত হইয়া বৃকে ঘড়্ ঘড়্ শব্দ হওয়া, বিশেষতঃ শিশু এবং ছোট বালক বালিকাগণের, এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বমন এবং নিদ্রালুতা টার্টার এমিটিক্ দ্বারা বিষাক্ত হওয়ার বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মন। শরীর স্পর্শ করিলেই কাঁদা। (রোগী শিশু বা ছোট বালক বা বালিকা হইলে); সর্বদা থিট্ থিট্ করা; ভয়াভূততা এবং অস্থিরতা

নিরুৎসাহ এবং নিরাশা ; সন্ধ্যার সময় ভবিষ্যৎ বিষয়ে চিন্তা উপস্থিত হইয়া মনের অত্যন্ত উদ্বেগ ; সন্ধ্যার সময় অনবরত এলোমেলো রকমের আনন্দ প্রকাশ করা ।

মস্তক । একগাছি ফিতা দিয়া আঁটিয়া বাঁধিয়া রাখিলে যেরূপ হয়, সেরূপ মাথা ধরা (জেল'স্, নাটট্রিক্ অস্, মার্ক্, সাল'ফ্); কপালে চাপিয়া ধরা বা সূচী বিধানের দ্বারা বেদনা যাহা বাম চক্ষু পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়; কপালের ডাইন পার্শ্বে দপ্পদপানি; কপালের ডাইন পার্শ্বে কসিয়া ধরার দ্বারা বেদনা যাহা গালের হাড় এবং মাড়ি পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়; মাথার কাঁপনি যাহা অনেক দিন ব্যাপিয়া থাকে; মাথায় চাপাযুক্ত বেদনা যাহার দরুন মনে হয় যেন মস্তিষ্ক কসিয়া ধরিয়া এক গোলাকার কঠিন পদার্থের দ্বারা রহিয়াছে এবং যাহা নানিকার মূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়; এই বেদনা কখন সন্ধ্যার সময়, কখন বা রাত্রিতে হয় ।

চক্ষু । দৃষ্টির গোলযোগ বা চক্ষে আঁধার দেখা এবং, প্রদীপের আলোক বাতাসে যেরূপ ধড়'কড়' করে চক্ষে সেকপ দেখায়; চক্ষু বক্তবর্ণ; চক্ষে অত্যন্ত ক্রান্তিবোধ যাহার দরুন চক্ষু আপনা আপনিই বুজিয়া আসিতে চাহে; চক্ষু চাপিয়া বা শক্ত করিয়া বুজিয়া থাকার ইচ্ছা; অন্ধতার প্রথমাবস্থা; চক্ষে কনকনানি; চক্ষুর সম্মুখে আঙনের কণার দ্বারা দেখায় ।

নাসিকা । তরল সর্দি এবং নাক দিয়া জলবৎ তরল স্লেষ্মা নির্গমন, শীতবোধ, বারম্বার হাঁচি ও উহার সঙ্গে সঙ্গে ভ্রাণ শক্তির হ্রাস এবং ক্ষুধা শূন্যতা; নাসিকার মধ্যদিয়া আড়া আড়ি এক গাছি ফিতা দিয়া কসিয়া বাঁধিয়া রাখার দ্বারা অবসন্নকারক টাটানি (আস্, ক্যাম্ফার, বিরেট্ অল'ব্) এবং নাসারন্ধ্রে ক্ষত ।

মুখ মণ্ডল । মুখ মণ্ডল শিটা বা ফিকা হয় এবং দসিয়া যায় (আস্, কার্বো বেজ্, বিরেট্ অল'ব্); মুখ মণ্ডল নীলের আভাযুক্ত; মুখ মণ্ডলের প্রায় সমুদয় পেশীরই আক্কেপিক স্পন্দন (আগারিকান্, সিকুটা, ইগ্'নেস্); মুখ মণ্ডলের সমুদয় অংশে, এমন কি মাথা এবং ঘাড়ো, ছিড়িয়া ফেলার ন্যায় বেদনা; ওষ্ঠ শুষ্ক এবং মর্য্যচর্ম্মযুক্ত অথবা কাটাযুক্ত (আস্) ।

মুখ গহ্বর এবং গলীর মধ্য। জিহ্বা, সাদা কাইয়ের স্থায় পদার্থ দ্বারা পুরু লেপযুক্ত, উহাতে লাল রেখা পড়া এবং উহার মধ্য স্থান অত্যন্ত লাল বর্ণ ও শুষ্ক (রাস্ টক্‌); জিহ্বা নাড়িতে অত্যন্ত কঠিনভব বা বেদনা। গলার মধ্যে বেদনা; গিলিতে গলার মধ্যে বেদনা যাহার দরুণ রোগী কোন দ্রব্য একবারে গিলিতে পারে না।

পাকস্থলী এবং উদর। টকদ্রব্য খাওয়ার ইচ্ছা (আন্টি-কুড্‌, চায়না); পিপাসা একবারেই থাকে না (এপিস্‌, নাক্স্‌ মফ্‌, পাল্‌স্‌); রাত্রিতে পচাডিমের গন্ধবিশিষ্ট কাঠ উদগার উঠা (আগারিকাশ্‌, আপিকা, মোরিনাম্‌, সিপিয়া); মধ্যাহ্নে আহারের পর উকী উঠা বা পেট জুলিয়া উঠা; বমনোদ্বগ এবং উদগার দরুণ অত্যন্ত উদ্বগ, উহার সঙ্গে সঙ্গে পাকস্থলীর মধ্যে সামান্য চাপাবোধ এবং তৎপর মাথা বেদনা যাহা কপালেই অধিক অনুভূত হয়; অনবরত বমনোদ্বগ এবং সমুদয় রাত্রিতেই বমন; অত্যন্ত বেগ দিয়া ০৭ম্ন; অনেকক্ষণ স্থায়ী প্রবল বমন (ইপিকাক্‌) যে পর্যন্ত মুচ্ছা না হয়, তৎপর গা মাটি মাটি করা, নিদ্রালুতা (এইলেফ্‌, নাক্স্‌, মফ্‌), সমুদয় কাছোই অনিচ্ছা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মাথাধরা ও হাতের কাপনি (প্লাটিনা); পাকস্থলীর মধ্যে চিড়িক মারা বা দপ্পদপানি (আসা-ফটিডা, পাল্‌স্‌, সিপিয়া). অথবা উদরেও ঐ প্রকার বোধ; টকদ্রব্য বিশিষ্ট পদার্থ এবং শ্লেষ্মা বমন, বিশেষতঃ রাত্রিতে; অধিক খাইলে বেক্রপ হয় পাক-স্থলীতে সেরূপ বেদনা। উদবে অত্যন্ত বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মন এবং শরীরের আন্দোলন ও শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রমে অনিচ্ছা; কিছু না খাইলেও উদরে পাথরাদি পুরিয়া রাখিয়াছে এরূপ ভারবোধ হয় অথচ চাপিলে উদর কঠিন বলিয়া বোধ হয় না; মল ত্যাগের পূর্বে উদরে শূলবেদনার স্থায় কঠিনবৎ বেদনা (কলোস্‌, মার্ক্‌); যেন বিছাতের স্থায় ঠাণ্ডা-এদিক ওদিক কোন পদার্থ সরিয়া যায় উদরের মধ্যে এরূপ অনুভূত হয়।

মল এবং গুহ্যদ্বার। চট্‌চটয়া আঠা রক্ত মিশ্রিত জলবৎ তরল ভেদ; উদরাময় এবং বমন (ইপিকাক্‌); অত্যন্ত দুর্গন্ধবৎ তরলভেদ।

মূত্র যন্ত্র। মূত্র ত্যাগের সময় এবং উহার পর মূত্রনালীতে জ্বালা

(কাহ্ন, ক্যানাবিস্ ট্রাট্); বারম্বার প্রস্রাবের বেগ; মূত্র পরিমাণে অল্প; মূত্র ফোঁটার ফোঁটার পড়ে এবং শেষে কএক ফোঁটা রক্ত পড়ে ও উহার সঙ্গে সঙ্গে মূত্রাধারে ভয়ানক প্রবল বেদনা; মূত্র কালচে, কটার আভাষুক্ত লালবর্ণ এবং ঘোলাটিয়া (চেলিডন্), অত্যন্ত উগ্র গন্ধযুক্ত (বেল্ল-আস্, নাইটিক্ আস্।)

শ্বাস যন্ত্র । শ্বাস প্রশ্বাস ঘন ঘন, ভারি, উদ্বিগ্নবৃত্ত^১ এবং অত্যন্ত কষ্টকর, যাহার দরুণ রোগী কোন বস্তুতে হেলান দিয়া বিছানায় সোজা হইয়া বসিতে বাধ্য হয় (একন্, আস্); রোগীর শ্বাস বন্ধ হইয়া ফাঁপড় হওয়ার উপক্রম হয় এবং বাতাস টানিতে পারে না, অতএব সে বিছানায় সোজা হইয়া বসিতে বাধ্য হয় (একন্, আস্, সাধুর্কাশ্); বুকে শ্লেষ্মা বদ্ধ হওয়ার দরুণ শ্বাস কষ্ট বা শ্বাস প্রশ্বাস ঘন ঘন, গলা দিয়া শ্লেষ্মা উঠিলে শ্বাস কষ্টের উপশম হয়; ক্ষণস্থায়ী কাশি এবং কাশিবার সময় এক প্রকারের কর্কশ শব্দ হয়; কাশির দরুণ রোগী সোজা হইয়া বসিয়া থাকিতে বাধ্য হয়; বুকের মধ্যে শ্লেষ্মার ঘড়্ ঘড়ী, কিন্তু কাশিলে শ্লেষ্মা নির্গত হয় না; কার্বোন্ (Carbon) দ্বারা বিবাক্ত হইলে ঘেরূপ হয় রোগী সেরূপ অবসন্ন হইয়া পড়ে; বুকের মধ্যে শ্লেষ্মার অত্যন্ত ঘড়্ ঘড়ী (ইপিকাক্, ফস্, সেনিগা, ষ্টানাম); বুকের মধ্যে শ্লেষ্মা সঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে অথচ রোগী শ্লেষ্মা তুলিতে পারে না; অত্যন্ত উদ্বিগ্ন, বুকের মধ্যে কষ্টানুভব এবং হৃৎপিণ্ডে গরমবোধ; বুকে আঁটা বোধ; কাশি এবং শ্বাস প্রশ্বাসের প্ররাস পাওয়া (ওপিয়াম্) বিশেষতঃ ছোট বালক বালিকাগণের, এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে ক্রন্দন, নিশ্বাবল্য (কিমেন) এবং মুখ মণ্ডলের স্পন্দন।

হৃৎপিণ্ড এবং নাড়ী । হৃৎস্পন্দন (একন্, আস্, ক্যাটোস্, ক্যাক্ কার্ক্, স্পাইঞ্জেল্, সাল্ফ্); নাড়ী দ্রুতগামী, হ্রস্বল, এবং কম্পমান; হৃৎপিণ্ডে কষ্টানুভব বাহা ঘর্ম না হওয়া পর্য্যন্ত দূরীভূত হয় না; নাড়ী পূর্ণ এবং বৃহৎগতি বিশিষ্ট (ক্যানাবিস্ ইণ্ড্, ডিলিট্) অথবা সঙ্কুচিত এবং লুপ্তপ্রায় (একন্); হৃৎপিণ্ডে অত্যন্ত কষ্টানুভব এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে শ্লেষ্মা ও পিত্তবমন।

পৃষ্ঠদেশ । কোমর এবং কোমরের নিম্ন প্রদেশে প্রবল বেদনা;

সামান্য শারীরিক পরিশ্রমেই ঠাণ্ডা চট্‌চটিয়া ঘর্ম হয়; ক্রান্ত হইলে ঘেঙ্গণ হয়, বসিয়া থাকিলে পৃষ্ঠদেশে এবং কোমরে সেক্রপ বেদনা হয়।

হাত, পা ইত্যাদি। হাত ঠাণ্ডা এবং উহাতে স্পর্শজ্ঞান থাকে না; সমুদয় অঙ্গেই অবশবোধ; হাতের কঁপনি; হাত ঠাণ্ডা এবং ভিজা; হাতের অঙ্গুলি অগ্রভাগ মৃতবৎ বরফের তায় ঠাণ্ডা। চলিবার সময় হাঁটুর পশ্চাৎ ঠাণ্ডা এবং পারের পাতার সন্ধিতে কসিয়া ধরা (আমন-মিউর)।

চর্ম। গায় বসন্তের গুটির তায় পুরু কুস্কুড়ী; অনেক সময় গায় ফোস্তার তায় কুস্কুড়ী; কুস্কুড়ী প্রায় মটরের তায় বড়; সমুদয় শরীরেই ফোস্তার তায় কুস্কুড়ী; মুখে ফোস্তার ন্যায় কুস্কুড়ী শুকাইয়া গৈলে মুখ নগলে নীলের আভাযুক্ত লালদাগ থাকে; এই প্রকার কুস্কুড়ী জননেত্রিয় এবং উরুতেও হয় এবং আক্রান্ত স্থান বেদনায়ুক্ত হয় বা টাটায়।

নিদ্রা। অত্যন্ত নিদ্রাবেশ বা নিদ্রালুতা (এপিস); দিনের বেলা অনিবার্য কুস্কুড়ী ইচ্ছা (নাক্স মক); হাই তোলা এবং গা ভাঙ্গা; ঘুমেরদ্বায়ে গায় যেন হঠাৎ ধাক্কা বা ঝাকি লাগে।

জ্বর। সমুদয় শরীরে শীত এবং কম্প; শরীর অত্যন্ত উষ্ণ; সমুদয় শরীরেই ঠাণ্ডা চট্‌চটিয়া ঘর্ম; সমুদয় শরীরে প্রচুর ঘর্ম,—অনেক সময় ঠাণ্ডা চট্‌চটিয়া ঘর্ম হয়; শীত কম্প এবং বাহ্যিক শীতলতা যাহা দিনের বেলা সকল সময়ই হয় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে নিদ্রাবেশ বা নিদ্রার ভাব; মনে হয় যেন ঠাণ্ডাজল সমুদয় শরীরে ঢালিয়া দিয়াছে; সামান্য শীতের পর শরীরের উত্তাপ অনেককাল ব্যাপিয়া থাকে, উহাব সঙ্গে সঙ্গে নিদ্রাবেশ বা নিদ্রার ভাব এবং কপালে ঘর্ম; নাড়ী পূর্ণ, কঠিন, মোটা এবং জন্তগামী; সামান্য শারীরিক পরিশ্রমেই নাড়ার স্পন্দন বৃদ্ধি হয়।

ব্যবহার। স্নেয়িক বিলীর স্নেয়া জনিত প্রদাহ, বিশেষতঃ পাক-হৃদী এবং কুক্ষুসের; পাকুহৃদীর স্নেয়া জনিত অস্রুথ; বায়ুনল প্রদাহ; (Bronchitis); কুক্ষুস প্রদাহ; (Pneumonia); শিশু বা ছোট বালক বালিকার উক্ত রোগ; হৃদিস্থির শোথ (Hydrocephalus); গায় লাল কুস্কুড়ী সম্বলিত হাঁপানি; হুপিং কফ; কৈশিক বায়ুনল প্রদাহ (Capillary Bronchitis); কুক্ষুস প্রদাহ সম্বলিত বায়ুনল প্রদাহ (Broncho-

Pneumonia); ঘূর্ণীকাশি; আক্ষেপ; নবপ্রসূত শিশুগণের শরীর ঠাণ্ডা হইয়া নীলবর্ণ হইয়া নিশ্বাস বদ্ধ হয়; বসন্ত, জল বা পানি বসন্ত, চর্ম এবং শৈথিল্যিক বিলীর ফোড়ার হ্রাস ফুফুড়ীবিধিষ্ট প্রদাহ জনিত রোগ ইত্যাদিতে এই ঔষধ ব্যবহার্য্য।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ। সমুদয় শরীরের কম্পন; রোগী (শিশু হইলে) কোলে চাপিয়া বেড়াইতে চাহে (ক্যাম), তাহাকে স্পর্শ করিলেই সে কাদে (আণ্টি ক্রুড্) এবং সে কাহাকেও তাহার নাজী দেখিতে দেয় না; কাশি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বকের মধ্যে শ্লেষ্মার ঘড় ঘড়ী, কিক্ত কাশিলে শ্লেষ্মা নির্গত হয় না; শ্লেষ্মা বমন; শ্বাস যন্ত্রের শ্লেষ্মা জনিত প্রদাহ। আহার বা পানের পর, শয়নের পর, নড়াচড়া, রীতিতে, উত্তাপে, হিম ঠাণ্ডা বা শীতকালে অস্থিরতা বৃদ্ধি হয় এবং উদগার উঠিলে, শ্লেষ্মা উঠিলে, সোজা হইয়া বসিলে বা শীতল বহির্বাযুতে অস্থিরতা উপশম ইত্যাদি আণ্টিমোনিয়াম্ টার্টারিকামের কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ। ইপিকাকিউএনাব কার্যের সঙ্গে আণ্টিমোনিয়াম্ টার্টারিকামের অনেক সাদৃশ্য আছে। এতদ্বিন্ন মেডানা অবলুঙ্গেটার (Medulla oblongata) উপর ডিজিটালিস্, লোবিলিয়া, টেবেকাম্ এবং বিরেট্রান্ বিরাইডের কার্য অনেকটা আণ্টিমোনিয়াম্ টার্টারিকামের হ্রাস। শ্বাস যন্ত্রের উপর টার্টার এমিটিকের কার্য অনেকটা কক্ষবাসের কার্যের হ্রাস। চর্মের উপর টার্টার এমিটিকের কার্য অনেকটা আণ্টিমোনিয়াম্ ক্রুডাম্ এবং ক্রিমেটিসের হ্রাস। এতদ্বিন্ন কোন কোন বিষয়ে টার্টার এমিটিকের কার্যের সঙ্গে একোনাইট্, ক্যামোমিলা, ইগ্নেসিয়া, নাক্স বমিকা এবং পালসেটিলার কার্যের কতক সাদৃশ্য আছে।

প্রতিষেধক ঔষধ। অসাফিটিডা, চায়না, ককিউলাস্, ইপিকাক্, অ্যাকেসিস্, ওপিয়াম্, পালসেটিলা এবং সিন্টিয়া ইত্যাদি আণ্টিমোনিয়াম্ টার্টারিকামের প্রতিষেধক ঔষধ মধ্যে পরিগণিত। টার্টার এমিটিক্ দ্বারা বিষাক্ত হইলে অধিক মাত্রায় সিঙ্কোনা (চায়না) এবং ইপিকাক্ ব্যবস্থা।

ডাইলুশন বিচার। ফুফুস্ প্রদাহ এবং কণ্ঠনালী প্রদাহে ২য় বা

৩য় দশমিক ক্রমের গুঁড়া বায়ুস্থ। বায়ুনল প্রদাহে, বিশেষতঃ শিশুগণের, ১২ ডাঃ বিশেষ উপকারী। ঘুংড়ী কাশি এবং বসন্ত রোগেও ২ বা ৩ দশমিক ক্রম বিশেষ উপকারী। ফুস্ফুসের শোথে ১২ বা ৩০ ডাঃ ব্যবহার্য। এই ঔষধের ৬ ডাইলুশনও অনেকে সচরাচর ব্যবহার করিয়া থাকেন।

আর্নিকা মন্টেনা, আর্ন-মন্ট ।

(ARNICA MONTANA,—ARN.-MONT.)

মধ্য এবং দক্ষিণ ইউরোপের পার্বত্যস্থানে এই গাছ জন্মে। আমেরিকা এবং এতদ্দেশে হিমালয় পর্বতেও ইহা জন্মে। ইহার ফুল দেখিতে অতি সুন্দর। গাছের বাকল, ফুলের বোটার নিকটবর্তী কোমল পাতা এবং ফুল দ্বারা যথা নিয়মে প্রকৃৎ স্পিরিটে মূল আরোক প্রস্তুত হয়। ইহার কেবল ফুল দ্বারাও প্রকৃৎ স্পিরিটে মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই গাছের শিকড় বা মূল দ্বারাও প্রকৃৎ স্পিরিটে মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে। শিকড় দ্বারা মূল আরোক প্রস্তুত হইলে উহাকে আর্নিকা-মন্টেনা রাডিক্স বলে।

সাধারণ ক্রিয়া । মাস্তক ক্লিন্নী, পেশী, শরীরের চর্বিবস্তু অংশ এবং পেশীর কঠিন অগ্রভাগের (Tendons) উপর এই ঔষধের কার্য অত্যন্ত প্রবল। পড়িয়া বাইয়া আঘাত লাগিয়া বা খেঁতলিয়া বাইয়া আঘাত প্রাপ্ত অংশের যে প্রকার অবস্থা হয়, সুস্থ শরীরে আর্নিকা প্রয়োগেও উক্ত অংশের সেরূপ অবস্থা ঘটয়া থাকে। এজন্ত আঘাত জনিত রোগে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী। গতি উৎপাদক স্নায়ুর (Motor nerves) মধ্য দিয়া মস্তিষ্ক এবং কসেরূক্সা মজ্জার উপর ইহার কার্য প্রবল হওয়া হেতু কসেরূক্সার উত্তেজনা এবং তজ্জনিত অসুখ এবং পক্ষাঘাত ইত্যাদি অসুখ হইয়া থাকে। ইহা পরিপাক কার্য সম্বন্ধীয় যন্ত্রগুলি উত্তেজিত করিয়া এক প্রকার মূহ প্রদাহে উৎপাদন করে যাহার দরুন এক দিকে অজীর্ণের লক্ষণ এবং পক্ষান্তরে বিকারের লক্ষণাদি প্রকাশ পায়। মোচড়াইয়া পড়া বা খেঁতলিয়া যাওয়ার

ভ্রায় বেদনা এবং টাটানি উৎপাদন করা (এই ঔষধের একটি বিশেষ প্রাকৃতিক শক্তি বা গুণ মধ্যে পরিগণিত ।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মন । অচেতনতা (ক্যাম্ফার, বেল্, ওপিয়াম্) ; রোগীর নিকট কথা বলিলে সে যথোচিত উত্তর দিয়াই পুনরায় অচেতন হয় এবং প্রলাপ বলে (ব্যাপ্ট্, হায়োস্) ; অর্ক জ্ঞানবহিততা (Stupor) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অসাড়ো বা অনিচ্ছাপূর্ণক মলত্যাগ ; সমুদয় বিষয়েই নৈরাগ্য (ফন্, ফন্-আস্) ; রোগী ভয় করে যে তাহার দিকে যে সকল লোক আইসে তাহার যেন তাহাকে মারিবে ; রোগী একটি কথাও বলে না অথবা কোন প্রশ্নের উত্তরও দেয় না (আনাকার্ড্, লাক্, নাক্স্ মফ্) ; কথা বলিতে বলিতে বক্তব্য কথা ভুলিয়া যায় (ব্যাপাইটা-কাক্স্) ; মনের অত্যন্ত উদ্বেগ এবং তন্দ্ররূপ ছট্‌ফট্‌ করা, হৃদেদন বা অংগাম্বুশূল (Angina Pectoris) ; অনর্থক চিন্তা বা মনের উদ্বেগ (অরাম্, নাক্স্ বম্, পাল্) ।

মস্তক । মাথাধোরা ; বোপী (স্থীলোক হইলে) মনে করে যেন তাহার সঙ্গে সঙ্গে চতুষ্পার্শ্ববর্তী পদার্থ ঘূর্ণিত হইছে (আলাম্, বেল্, কোনা-রাম্, নাক্স্ বম্) ; চক্ষু বুজিলে মাথাধোরা ; মাথায় গোলনেলে বোধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মাথাব ডাইন অর্দ্ধাংশ, বিশেষতঃ চক্ষুর ভ্রূর উপরিভাগে, চাপা বোধ ; মস্তিষ্কে জ্বালা (একন্, কাক্স্), কিন্তু রাগিত এবং প্রাতঃকালে শরীরের সমস্ত অঙ্গাঙ্গিকই থাকে ; নড়াচড়াতে মাথায় জ্বালা বৃদ্ধি এবং বিশ্রাম বা নিস্তব্ধভাবে থাকিলে অস্ত্রপের উপশম হয় (ব্রাই) ; চাপিয়া ধরাব ভ্রায় মাথা বেদনা যাতাব দ্রুত মনে হয় যেন মাথা ফুলিয়াছে ; মাথার মধ্য দিয়া আড়ে একখানি ছুঁদা বিদ্যুৎযুক্ত রাখিলে যেকপ হয় মাথায় সেরূপ বেদনামুভব এবং তৎপব ঠাণ্ডাবোধ ; কপালের পার্শ্বে যেন কাঁটা বিদ্যুৎযুক্ত রাখিয়াছে মাথায় একপ বেদনা (আনাকার্ড্, আগারিকাস্, কফিয়া, ইথ্রেস্) ; কপালে এবং কর্ণের পশ্চাদ্ভাগে ঘাটিয়া ধরার ভ্রায় বেদনা ; কপালের কোন এক ক্ষুদ্র নির্দিষ্টস্থানে ঠাণ্ডা বোধ ; পড়ুয়া বাইয়া বা আঘাত লাগিয়া মাথার অস্থি ; মাথায় গরম এবং জ্বালাবোধ ।

চক্ষু । শুষ্ক এবং সানাত ক্ষত হইলে বেক্রপ হয়, চক্ষুর পাতা সঞ্চা-

লনে সেরূপ ঘটনা অনুভূত হয় ; চক্ষু প্রদাহ এবং কোন প্রকার আঘাত লাগিয়া আঘাত প্রাপ্ত স্থানে ছাল উঠিয়া যাওয়া বা উহা নীলবর্ণ হওয়া ; আঘাত লাগিয়া ক্ষত এবং চক্ষুর মধ্যের সম্মুখ কোটরে রক্তস্রাব ; চক্ষুর রটিনায় (Retina) রক্তস্রাব ; ইহা চক্ষুর মধ্যে সঞ্চিত থানা থানা রক্তের শাষণ কার্য্যে সাহায্য করে ; চক্ষু লালবর্ণ এবং প্রদাহযুক্ত ; চক্ষুর তারা বন্ধুচিত ; চক্ষে জ্বালা এবং চক্ষু দিয়া জ্বালা উৎপাদক জল পড়া ।

কর্ণ । কানে মোচড়াইয়া পড়ার স্থায় ঘটনা ; কানের মধ্যে এবং উহার পশ্চাৎ ভাগে সূচী বিধানের স্থায় অনুভূত হয় এবং কানে জ্বরে কোন শব্দই সহ্য হয় না ; কানের মধ্য অত্যন্ত শুষ্ক ; মাথায় চোট লাগিয়া মস্তিষ্কের কার্য্যাবরোধ হওয়া হেতু বমিরতা এবং কানে বজ্ বজ্ শব্দ হওয়া ।

নাসিকা । নাক দিয়া রক্ত পড়ে এবং রক্ত পড়িবার পূর্বে নাকে কুটকুট্ হুড়্ হুড়্ করে (একন্) ; আঘাত লাগিয়া নাক দিয়া রক্ত পড়া ; হৃৎপিণ্ডের ব্যাধির বিকারের আক্রমণের সময় নাক দিয়া রক্ত পড়া ; কোন ভারি দ্রব্য উঠাইবার ছই দিবস পর বারবার ইচ্চি ; নাসিকা ক্ষীত এবং উহাতে লোমছা বাওয়া ।

মুখ মণ্ডল । মুখ মণ্ডল দিকা বা শিটা এবং বসিয়া যায় বা ক্ষীত ও টলটলে হয় ; শরীর গরম না হওয়া সত্ত্বেও মুখমণ্ডল গরম ; ডাইন গালের লাল ক্ষীতি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে উক্ত স্থানে দন্দপানি, চিম্টি কাটার স্থায় বেদনা এবং মাথায় গরম বোধ, কিন্তু শরীর ঠাণ্ডা ; এক গাল লাল বর্ণ এবং উহাতে জ্বালা (একন্, ক্যান্) ।

মুখগহ্বর । মুখের মধ্যে পচা গন্ধ (আরাম্, হিপ্-সাল্ফ্, আয়োড্, ক্রিয়াজোন্ট্, মার্ক্, নাইট্রিক্ আম্, ন্যাম্ বম্) ; মাড়ী ক্ষীত, উহাতে ক্ষত বা টাটানি, দন্দপানি এবং কুটকুটানি ; মুখের মধ্যে শুষ্কবোধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত পিপাসা (আস্, জাই) ; দাঁত তুলিয়া ফেলার পর বা পোকায় খাইলে দাঁতের গর্ত্ত প্লাগ্ (Plugging) করার পর দাঁতে বেদনা ; জিহ্বা সাদা লেপযুক্ত (আণ্টিক্লড্, ব্রাই, মার্ক্, ন্যাম্ বম্) ; মুখে তিক্ত বিশ্চী সাদ্ (হিপ্-সাল্ফ্) ; মুখে পচা চট্ চট্টিয়া স্বাদ (আস্-ক্লি-পিয়াস্ টিউবার, মার্ক্, ন্যাম্ বম্, পাল্জ্, মিপিয়া) ; মুখে পচা ডিমের স্বাদ ।

পাকস্থলী এবং উদর । আহাৰ্য্য অরুচি ; মাংসে অরুচি ; (আলান্, গ্রাফ্, পিট্রোল্, পাল্ন্) ; মাংসের ঝোলে অরুচি ; পচা ডিমের ছায় বা তিক্তস্বাদ বিশিষ্ট উদগার উঠা (আগারিকান্, আণ্টি-টার্ট্, ক্যাম্, সোরিনাম্, সিপিয়া, বেলিরিয়ান্, পিট্রোল্) ; বমনোদ্বেষ্ট এবং কঠিবমী ; জমাট থানা থানা রক্ত বমন ; পাকস্থলীতে আক্‌ড়াইয়া ধন্যুর ছায় আক্ষেপিক বেদনা । পেট কাঁপা (চায়না) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বারম্বার বাহ্যের চেষ্টা ; উদরে প্রচুর দূষিত বায়ুর সঞ্চার (ইস্কুলান্, আলোজ্, ব্রাই, কার্কোবেজ্, গ্রাফ্) এবং উহাতে পচা ডিমের ছায় দুর্গন্ধ (সাল্ফ্) । • •

মল এবং মলদ্বার । অসাড়ে বা অনিচ্ছাপূৰ্ণক মলত্যাগ (আস্, কার্কোবেজ্) ; রাত্রিতে অসাড়ে বা অনিচ্ছাপূৰ্ণক মলত্যাগ (হায়োস্) ; ঘূমের অবস্থায় অসাড়ে মলত্যাগ ; কটা বণের ডিমের লালের ছায় ঘোলা-টিয়া উদরাময় ; উদরস্থ অজীর্ণ আহার দ্রব্যের কণা বিশিষ্ট, (আণ্টি-ক্লড্, চায়না, পডোফ্), রক্ত, পুঁয় মিশ্রিত রাঁধা আহারকটের ছায় ঘোলাটিয়া টক গন্ধযুক্ত তরল ভেদ এবং তৎপর অত্যন্ত কষ্ট দায়ক কোথপাড়া এবং বাব-ছার বাহ্যের বেগ ; আমাশয় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মূত্র কুচ্ছ বা মূত্রাবরোধ ; কোষ্ঠবদ্ধ ।

মূত্র যন্ত্র । মূত্র কালচে এবং পরিমাণে অল্প (একন্) ; মূত্রে ইটের জড়ার ছায় তলানি পড়ে (লাইকোপ্, চায়না, নেট্রাম্-মিউব্, ফস্) ; কোন প্রকার আঘাত পাইয়া রক্ত মূত্রত্যাগ ; মূত্র ত্যাগের সময় কোঁথপাড়া ; অনিচ্ছাপূৰ্ণক বা অসাড়ে মূত্র ত্যাগ (আস্, বেজ্, হায়োস্) ; রাত্রিতে, ঘূমের ঘোরে অসাড়ে বা অনিচ্ছাপূৰ্ণক মূত্র ত্যাগ (কষ্ট্, কুপ্রাম্, পাল্ন্) ; মূত্র ত্যাগ করিতে অনেকক্ষণ লাগে ; অতিরিক্ত শারীরিক পরিশ্রম হেতু মূত্রাবরোধ ।

জননেন্দ্রিয় । কোন প্রকার আঘাত লাগিয়া মূত্র দ্বার বা যোনি দ্বার দিয়া রক্তস্রাব এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পুরুষাঙ্গে বা যোনিদ্বারে স্ফীতি, বেদনা এবং টাটানি ; অতিরিক্ত জীসহবাসের দরুন ঘূর্ণবে পুরুষাঙ্গের গ্রন্থির ছায় মাথার আবরক চর্মের ছাল উঠিয়া যাওয়া এবং তদ্রূপ উহার স্ফীতি ; জীলোকের সন্তান প্রসবের পর যোনি এবং যোনিদ্বারে বেদনা বা টাটানি ;

স্তনের বোঁটায় টাটানি ; পড়িয়া বাইয়া জরায়ু স্থানভ্রষ্ট হওয়া বা সরিয়া পড়া (Prolapsus-uteri) ; রজঃস্রাবের আভ্যন্তরিক কালে জরায়ু হইতে রক্তস্রাব এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বমনোদ্বেষণ ।

শ্বাস যন্ত্র । কাশি ; কঁাদার দরুণ শিশু এবং ছোট বালক বালিকা গাণের কাশি ; অনবরত শুষ্ক কাশি ; কাশিবার সময় সমুদয় শরীর আন্দোলিত হয় এবং উহার দরুণ পাক্সরায় বেদনা ; বায়ুনলে স্ফু-স্ফুড়ী বা কুট-কুটানির দরুণ কাশি ; গলাদিয়া রক্ত পড়ে (নাক্সাম্) ; হাঁপানির ত্রায় শ্বাস প্রশ্বাস ঘন ঘন ; বুকে (বামপার্শ্বে) স্ত্রী বিধানের ত্রায় বেদনা ও শুষ্ক কাশি, নড়াচড়াতে বাহার বৃদ্ধি হয় এবং বাহ্যিক চাপ দিলে বাহার উপশম হয় (ব্রাই); অত্যন্ত শ্বাস কষ্ট ; বুকের ঠিক মধ্যস্থলে স্ত্রীবিধানের ত্রায় বেদনা (ব্রাই, ক্যালী কার্ক) ; বুকে মোচড়াইয়া পড়া বা থেঁতলিয়া যাওয়ার ত্রায় বেদনা (এপিস্.চারনা, সাইলিসি) ; অথবা চলিবার সময়, শ্বাস প্রশ্বাসের সময় অথবা কাশিবার সময় বুকের উপাংশ বা সন্ধিতে মোচড়াইয়া পড়ার ত্রায় বেদনা ।

হৃৎপিণ্ড এবং নাড়ী । নিংড়াইলে বা মোচড়াইলে যেরূপ হয়, হৃৎপ্রদেশে সেরূপ বেদনা (ক্যাক্টাস্, লিলিয়াম্) ; ধাক্কা লাগিলে বা চোট পাইলে যেরূপ হয় হৃৎপ্রদেশে সেরূপ যাতনা বা বেদনা ; বেগে দৌড়িবার দরুণ হৃৎপিণ্ডে কষ্টানুভব ; বক্ষাধিব নীচে চাপা বোধ, যাতনা এবং অসাড় বোধ ; নাড়ী ক্ষুদ্র এবং অনিয়মিত রূপে স্পন্দন করে ; শ্বাসকষ্ট : হৃৎবেদনা বা হৃৎস্বাসযন্ত্র (Angina pectoris) ; শ্রম করিলে যেরূপ হয় চলিবার সময়, নিশ্বাস প্রশ্বাস এবং কাশিবার সময় বুকের উপাংশ এবং অস্থির সন্ধি গুলিতে সেরূপ বেদনা ; হৃৎপ্রদেশে স্ত্রীবিধানের ত্রায় বেদনা (ব্রাই, ক্যাক্ট, ক্যালী-কার্ক, স্পাইজেল্) ; নাড়ী অসম, দুর্বল, ক্রতগামী এবং আনয়ামিতরূপে স্পন্দন করে ।

ঘাড় এবং পৃষ্ঠদেশ । অনেকক্ষণ মাথা হেঁট করিয়া উপুড় হইয়া থাকার পর হঠাৎ সোজা হইলে যেরূপ হয়, মেরুদণ্ডে সেরূপ প্রবল বেদনা (চারনা, ভাঙ্ক, পাল্‌স্) ; আঘাত লাগিয়া যেরূপ হয় পৃষ্ঠদেশে সেরূপ অত্যন্ত বেদনা এবং টাটানি (আর্স্, ব্রাই) ; মেরুদণ্ডের ঘাড়ের অংশের হাড় বেদনা বা টাটানি ।

হাত, পা ইত্যাদি। খেঁংলিয়া গৈলে বা মোঁচড়াইয়া পড়িলে যেরূপ হয় বাহ্যতে সেরূপ অবশ্যবোধ বা বেদনা (সিমিসিক্) ; বাতর সমুখ দিকে মোঁচড়াইয়া পড়া বা খেঁংলিয়া যাওয়ার ভায় বেদনা ; মোঁচড়াইয়া পড়িলে যেরূপ হয় বাহ্যর সন্ধি এবং মনিবন্ধে সেরূপ বেদনামুভব ; হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলির মাথায় খেঁংলিয়া যাওয়ার ভায় বেদনা। বসা অধুয়ার পা প্রসারণে উরু বা কুচ্কির সন্ধিতে কসিয়া তা চাপিয়া ধবার ভায় বেদনা ; কুচ্কির সন্ধিতে মোঁচড়াইয়া পড়া বা খেঁংলিয়া যাওয়ার ভায় বেদনা ; আঘাত লাগিলে বা খেঁংলিয়া গেলে যেরূপ হয় চলিবার সময় উৎকণ্ঠে সেরূপ বেদনা ; আঘাত লাগিলে যেরূপ হয় ডাইনুপায়ের ডিমে (খোড়ায়) সেরূপ বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অক্রান্ত পায়ের অবশ বা ক্রান্তিবোধ ; পায়ের পাতার সন্ধিতে মোঁচড়াইয়া পড়া বা খেঁংলিয়া যাওয়ার ভায় বেদনা ; সন্ধার সময় পায়ের পাতার ক্রুর সন্ধিব্যতীর বেদনার ভায় বেদনা ; পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলির সন্ধি লালবর্ণ এবং উহাতে খেঁংলিয়া যাওয়া বা মোঁচড়াইয়া পড়ার ভায় বেদনা।

চর্ম্ম। চর্ম্ম লালবর্ণ, উষ্ণ এবং শোথের ভায় ক্ষীত (এপিস্, রাস্টিক্) ; চর্ম্ম এবং উগ্রব নীচের চর্ম্মবৃত্ত অংশের প্রদাহ বাহ্য চাপনে অত্যন্ত বেদনা যুক্ত হয় বা টাটায় ; কোন পোকায় কামড়াইলে সেরূপ হয় চর্ম্ম সেরূপ উষ্ণ, কঠিন, উজ্জল এবং ক্ষীত হয় (অর্গটি ক্রুড্, এপিস্, লেডাম) ; চর্ম্মে হার্মের ভায় কুস্তুরা (অস্, কস্, বিকেস্) ; লোমছা বাওয়া (কস্, সিকেল্) ; স্থানে স্থানে একটার পর আর একটা, একপ অনেক ব্রণ হয় বাহ্য অত্যন্ত বেদনামুক্ত হয় এবং টাটায়।

নিদ্রা। ঘুমের ইচ্ছা বা নিদ্রাবল্য (নাক্স নক্) ; ঘুম মধ্যে মধ্যে ভাবিয়া যায় অর্থাৎ ঘুম ভাঙ্গ হয় না (প্রাপনাম্, ভায়না, লাবোস্) ; ঘুমের ঘোরে, স্পষ্ট ভয় এবং মনের অশান্তি উৎপাদক স্বপ্ন দেখা (অয়াম্, পাল্দ্, সাগ্দ্)।

জ্বর। প্রাতঃকালে বিছানায় শয়ন কর্ত্তীন শীত ; শীত এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে এক গাল গরম ও লালবর্ণ ; সমুদয় শরীর এবং মাথায় কম্পন, উহার সঙ্গে সঙ্গে মাথা গরম, নৃণনগুন লালবর্ণ এবং উহাতে গরম বোধ

(হাস্); হাত ঠাণ্ডা; মোচড়াইয়া পড়িলে বা খেঁৎলিয়া গেলে যেক্রপ হয় কুচকী, পৃষ্ঠদেশ এবং বাহ্যতে সেইরূপ বেদনানুভব; বিছানায় শুইলে শরীরে শুষ্ক উত্তাপ, প্রবল পিপাসা, শরীর ঢাকিয়া রাখিলেও শীতবোধ; বিছানায় নড়িলেও শীতবোধ, কেবল মাথা, না হয় কেবল মুখমণ্ডল গরম; শরীর ঠাণ্ডা; আভ্যন্তরিক অত্যন্ত উত্তাপ এবং হাত ও পায়ের পাতা ঠাণ্ডা (হাস্); টক্ট বা দুর্গন্ধযুক্ত ঘর্ম্ম (হাস্)। বাহ্যিক শীত এবং আভ্যন্তরিক উত্তাপানুভব; সবিরাম অর; প্রাতে শীত এবং অর আইসার পূর্বে হাড়ে বেদনা; অর-বিকার এবং উহাতে সমুদয় বিষয়ে বৈরাগ্য, মুখে দুর্গন্ধ এবং গায় লাল, কাল অথবা হরিদ্রাবর্ণের চিহ্ন ও কণা বলিবার সময় বক্তব্য কথা ভুলিয়া যাওয়া; বিছানা অত্যন্ত কঠিন বোধ হওয়ার দরুণ বারম্বার পাশ পরিবর্তন করা।

ব্যবহার। পড়িয়া বাইয়া, আঘাত লাগিয়া বা খেঁৎলিয়া যাওয়ার দরুণ প্রদাহ ইত্যাদি অস্থি (কসেরুকা মর্জ্জায় আঘাত লাগিয়া অস্থিতে হাইপারিকাস্, চোট লাগিয়া বা হইয়া মাংসাদি ছিড়িয়া পড়িয়া যাওয়া বা আঘাত-প্রাপ্তস্থান পচিয়া উহাতে পূর্ণ হইলে ক্যালেকুলা, এবং মোচড়াইয়া পড়িলে রাস্ট্রা বিশেষ উপকারী)। সংন্যাশ রোগ; অজীর্ণ রোগ; পেটীতে বেদনা (অতিরিক্ত শারীরিক পরিশ্রম হেতু); হাড় ভাঙ্গিয়া চর্ম্ম ভেদ করিয়া বাহির হওয়া (Compound Fracture) এবং তদরুণ আক্রান্ত স্থানে প্রচুর পূর্ব উৎপন্ন হওয়া; কসেরুকার উত্তেজনা এবং পক্ষঘাত; বাতরোগ; কুদ্র সন্ধিবাত (Gout); ফুফুস প্রদাহ, ফুফুসাবরক বিল্লী প্রদাহ, বিশেষতঃ কোন-প্রকার আঘাত লাগিয়া হইলে; ব্রণ; আঘাত জনিত অর; মাথায় আঘাত লাগিয়া মস্তিষ্কের কার্যাবরোধ (Concussion of the brain) হেতু অস্থি; স্নায়বিক শিরঃপীড়া; আঘাত লাগিয়া চক্ষু প্রদাহ; নাক দিয়া গলা দিয়া রক্ত পড়া; -আঘাত জনিত সিস্প বা ইরিসিপেলাস্ (Traumatic Erysipelas) ইত্যাদি অস্থি আণিকি ব্যবহার্য্য।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ। রক্তাধিক্য বাতু শরীরে মোচড়াইয়া পড়া বা খেঁৎলিয়া যাওয়ার ত্রায় বেদনা বা কন্কনানি; আঘাত জনিত অস্থি; অত্যন্ত কোমল বিছানায় শয়ন করিলেও বিছানা শক্ত বোধ হয়।

শরীরের উর্দ্ধাংশ গরম এবং নিম্নাংশ ঠাণ্ডা । প্রাতঃকালে, বিশ্রামকালীন, শয়ন করিয়া থাকিলে বা মদ্যপানে অশুখের প্রকৃতি ; সন্ধ্যার সময় এবং রাত্রিতে, আক্রান্ত স্থানে চাপ লাগিলে বা চলিলে অশুখের উপশম ইত্যাদি আর্গিকার কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত ।

সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ । আঘাত জনিত কোন কোন অশুখের আর্গিকার কার্যের সঙ্গে রাস্টটন্স এবং হাইপারিকামের কতক সাদৃশ্য আছে বলিলেও বলা বাইতে পারে । পেশীর উপর আর্গিকার কার্যের সঙ্গে ব্রাইওনিয়া এবং সিমিসফিউগার কার্যের কতক সাদৃশ্য আছে । চর্মের উত্তেজনা উৎপাদনে আর্গিকার কার্যের সঙ্গে রাস্টটন্স এবং কোটি-নের কার্যের কতক সাদৃশ্য আছে । এতদ্ভিন্ন আর্গিকার কার্যের সঙ্গে একোনাইট, এপিস্, অসিনিক, ব্যাপ্টাইনিয়া, ক্যামামিলা, চায়না, ইগ্-নেসিয়া, ইপিকাকিউএনা, মাকিউরিয়াস্, ফক্ষরিক্ অসিড্, পাল্‌মেটোনা, কুটা, দিপিয়া, সাইলিসিয়া ইত্যাদি ঔষধের কার্যের কতক সাদৃশ্য থাকিলেও থাকিতে পারে ।

প্রতিবেদক ঔষধ । কাম্ফার, ইপিকাকিউএনা, চায়না, ইগ্-নেসিয়া, ফেনাম, সোমগা, দিকুটা ইত্যাদি আর্গিকার প্রতিবেদক ঔষধ মধ্যে পরিগণিত ।

ডাইলুশন বিচার । আঘাত জনিত তরুণ বোলে ১, ৩, ৬ দশ-মিক্রম ব্যবস্থা । প্রবাতন অশুখে ১২ বা ৩০ ডাইলুশন বিশেষ উপকারী । রক্তামশবে পেটকামড়ানীতে ৬ ডাইলুশন ব্যবহাবে বিশেষ উপকার পাওয়া যায় । আঘাতাদি পাইয়া কোন স্থান বেঁটনিয়া গেলে বা মোচড়াইয়া পড়িলে বা অস্থির সন্ধি মচকাইলে আর্গিকার মূল আঘাতকে ১০ ফোঁটা ২ কাঁচা জলে নিশাউয়া উঠাতে একখানি স্তার কুপড়ের নেকড়া ভিজাইয়া আঘাতপ্রাপ্ত স্থানে লাগাইলে বিশেষ উপকার দর্শে । আঘাতপ্রাপ্ত স্থানের চর্ম ছিড়িয়া গেলে ২ কাঁচা জলে ২৩ ফোঁটার অধিক আর্গিকা দেওয়া উচিত নহে ; কারণ, অধিক মাত্রার আর্গিকা প্রবেশে আঘাতপ্রাপ্ত স্থানে বিসর্প বা ইরিসিপেল্যেদের স্তার প্রদাহ হইতে পারে । আঘাতপ্রাপ্ত স্থানে আর্গিকার অপব্যবহার জনিত কুসুড়া ইত্যাদি হইলে ৪।৫ ফোঁটা স্পিরিট্ ক্যাম্ফার

২ কাঁচা জলে মিশাইয়া উহা আক্রান্ত স্থানে লাগাইবে। আঘাতজনিত রোগে আর্গিকার বাহুপ্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে ১, ৩ বা ৬ ডাইলুশনের আভ্যন্তরিক প্রয়োগে বিশেষ উপকার দর্শিতে দেখা যায়। ৫ বৎসর স্থায়ী ক্ষাঘাতজনিত বাতের বেদনার স্থায় বাম বাহুর বেদনা বা কনকনানীতে একটা রোগীর চিকিৎসায় আর্গিকার ২০০ ক্রম ২ কোঁটা মাত্রায় ১ দিন অন্তর এক দিন ১ মাত্রা ব্যবহারে উক্ত বেদনা ১ সপ্তাহে সারিয়া গিয়াছে।

আর্সিনিকাম্ আল্‌বাম্,-আর্সিনিক্,-আর্স্‌ ।

(ARSENICUM ALBUM,—ARSENIC,—ARS. ALB.)

কোন এক বিখ্যস্ত হোমিওপ্যাথিক ঔষধ বিক্রেতার ঔষধালয় হইতে আর্সিনিকের ১ম শতভাগিক ক্রম ক্রয় করিয়া উহার এক ভাগ, ৯ ভাগ ২০° ডিগ্রী ওবার্‌ স্পিরিটে (20° Over proof spirit) মিশাইয়া যথা নিয়মে ৩য় দশমিক ক্রমের আরোক প্রস্তুত হয়। ৪র্থ এবং ততোধিক দশমিক ক্রমের আরোক যথা নিয়মে রেক্‌টিফাইড্ স্পিরিটে প্রস্তুত হইয়া থাকে। গুঁড়া প্ররোজন হইলে কোন এক বিখ্যস্ত হোমিওপ্যাথিক ঔষধ বিক্রেতার ঔষধালয় হইতে আদত আর্সিনিকাম্ আর্সিড্ ক্রয় করিয়া সুগার অব্‌ মিল্কের (Sugar of milk) সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া যথা নিয়মে আর্সিনিকের ১, ২, ৩ এবং ততোধিক দশমিক ও শতভাগিক ক্রমের গুঁড়া প্রস্তুত করিতে হয়।

সাধারণ ক্রিয়া । মনুষ্য দেহে এমন অংশ, যন্ত্র বা নিঃসরণ নাই যাহার উপর আর্সিনিকের কার্য নাই। রক্ত, শবীরের না নী প্রকারের নিষ্কাশন এবং স্বাভাবিক মণ্ডনের উপর ইহার কার্য অত্যন্ত প্রবল, সুব্যক্ত বা সোজাশোক্ত। ইহা উক্ত যন্ত্র বা অংশের চর্চলতা উৎপাদন করে বা উহা ব্রাবনাশক্তির হ্রাস করিয়া উহা কার্যের ব্যাঘাত জন্মায় এবং কোন কোন নম্র উহার পক্ষাঘাতও উৎপাদন করিয়া থাকে। এই প্রকার অবসন্নতার দৃষ্টান্ত অলসবোধ বা গা মাটিমাটি করা, বলক্ষয় বা জীবনী শক্তির হ্রাস এবং চর্চলতা ইত্যাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে। বস্ত্রাদির যান্ত্রিক বিকৃতির দরুন যে কেবল একরূপ অবস্থা ঘটিয়া থাকে এমন নহে,

উহার কার্যের বৈলক্ষণ্য হেতুও এরূপ ঘটিতে পারে। শরীরের অন্তান্ত অংশ অপেক্ষা স্নায়িকঝিল্লীই ইহা দ্বারা অধিক পরিমাণে আক্রান্ত হইয়া উত্তেজিত, প্রদাহযুক্ত এবং ক্ষতযুক্ত হয়। স্নায়িকঝিল্লী (Serous Membranes) এবং চর্মও ইহা দ্বারা আক্রান্ত হইয়া এক বিশেষ প্রকৃতির উত্তেজনা এবং প্রদাহ উৎপন্ন হয়, তদ্বর্ণন্য স্নায়িক ঝিল্লীতে ওচুর পরিমাণে দূষিত জলীয় পদার্থ সঞ্চিত হয় এবং চর্মে নবা চর্মেণ্ডা তায় ধোঁস্বর্ণ বিশিষ্ট এবং ফোঁস্বার তায় ফুস্ফুসী প্রকাশ পায়। স্নায়বিক অস্থিরতা (Nervous Restlessness), অতি শীঘ্র শীঘ্র বলক্ষয়, জীর্ণ শীর্ণ হওয়া এবং উহার সঙ্গে এক বিশেষ প্রকৃতির পিপাসা আদিনিহের বিশেষ বা প্রধান প্রাকৃতিক চিহ্ন বা লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মন। রাত্রিতে প্রলাপ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত অস্থিরতা (একন্, রাস্টক্স্); সর্বদাই দুঃখিত, কঁাদ কঁাদ এবং চিন্তা বা উদ্বেগের ভাব (ইগ্বেস্, লাইকোপ্, নেট্রান্-মিউব, নাক্সমক্, পাল্‌স্, রাস্টক্স্); সর্বদা মনের উদ্বেগ বা চিন্তা এবং নিরাশা; মনের ব্যতনার উপশমের আশায় স্থানে স্থানে ছুটিয়া বেড়ান (অবান্); শেব বাত্রি ওটাব সময় মনের অত্যন্ত উদ্বেগ এবং অস্থিরতা (একন্, ক্যাম্ফার, রাস্টক্স্) বাহ্যিক দর্শন রোগী বিছানা ছাড়িয়া ছুটিয়া পলার; মূত্ৰা ভব (একন্, সিমিসিক্, আগ্রাশ্, নাইট্রিক্-অস্, সিকেল্); বিছানায় শয়ন কবিতা থাকিলে বা একাকী থাকিলে মূত্ৰা ভব; বস্ত্রপাতি সন্ধ্যা করিতে না পারিয়া আত্মহত্যা করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হওয়া; সর্বদা খিট্ খিট্ করা, অসদৃষ্ট থাকা, অসংলগ্ন দোষ ধরা, স্বেচ্ছাচাপিত্তা এবং সহজে রাগ করা (ব্রাই, ক্যান্, নাক্স বন্); অত্যন্ত ভয় এবং মনের উদ্বেগ; দিবা বাত্রি ২৪ ঘণ্টা কালিনিক ভূত প্রেত দেখা (একন্, পাল্‌স্) এবং তদ্বর্ণন্য লুকাটিয়া থাকার ইচ্ছা; কোন প্রকার অনায়াস কাজ করিলে যেরূপ হয় মনে সেরূপ অশান্তি বা উদ্বেগ; অরণ শক্তির অত্যন্ত হ্রাস বা হ্রাস; চেতনা এবং স্পর্শজ্ঞান রহিততা; শুষ্ক বায়ু (Melancholia) এবং তদ্বর্ণন্য বিষম ভাব।

মস্তক । মাথাঘোরা যাহার দরুণ রোগী মনে করে যেন সে টলিয়া পড়িয়া যাইবে ; মাথার গোলমালে বোধ, মাথা কিম্ কিম্ করা এবং তদ্রূপ অবসন্নতা ; মাথায় ভারিবোধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কানে শব্দ শব্দ ভন্ ভন্ ঝঙ্ক হওয়া যাহা বহির্বাযুতে গেলে কমে এবং সরে প্রবেশ করিলে পুনরায় আরম্ভ হয় ; প্রবল মাথা বেদনা, আলোক এবং গোলমালে যাহার বৃদ্ধি হয় (বেল্) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মাথাঘোরা ; চলিবার সময় মনে হয় যেন মস্তক নড়িতেছে (হারোস্, ম্রোনয়েন্, রাস্টল্, সাল্ফ্, সাল্ফ্-আস্) ; কপালের ডাইন পার্শ্বে কসিয়া বা চাপিয়া ধরার ভ্রায় বেদনা বা যাতনা ; নাকের উপর এবং কপালে মোচড়াইয়া পড়া বা খেঁচলিয়া বাওয়ার ভ্রায় বেদনা বা টাটানি, রগড়াইলে যাহার ক্ষণিক উপশম হয় ; মাথা এবং মুখমণ্ডলে বেদনা ; এই বেদনা বাম পার্শ্বেই অধিক অন্তর্ভূত হয় ; মাথার চুল পড়িয়া যায় (গ্রাফ্, হিপ্ সাল্ফ্, নাইট্রিক্ আস্, ফস্, সিপিয়া, সাল্ফ্) ; মাথা এত বেদনায়ুক্ত হয় বা টাটানি যে উহার দরুণ রোগী তাহার মাথা কাহাকেও স্পর্শ করিতে দেয় না ; মাথার পুরাতন আকারের কুস্কুড়ী এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পুষ্ণ পূর্ণ ফোন্সার ভ্রায় কুস্কুড়ী ; মাথায় দপ্ দপিয়া বেদনা ; মাথার বেদনা কোন নির্দিষ্ট সময়ে হয়, প্রধানতঃ আহারের পর ; মাথা এবং মুখ মণ্ডলের ক্ষীতি ।

চক্ষু । চক্ষে কনকনানি এবং খোঁচা বিঁধার ভ্রায় বা জালাযুক্ত বেদনা, আলোক এবং চক্ষু নাড়িলে যাহার বৃদ্ধি হয় ; চক্ষু এবং চক্ষুর পাতার প্রদাহ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে চক্ষে প্রবল জালাযুক্ত বেদনা বা যাতনা (আলাম্) ; বালির কণা প্রবেশ করিলে ঘেরূপ হয় চক্ষুর মধ্যে সেকপ অন্তর্ভূত হয় (কষ্ট্, সাল্ফ্, ইথ্রেস্, নেট্রাম্-মিউর, ফাইটোল্) ; চক্ষুর বোজক ঝিল্লী (Conjunctiva) যেন একখানি গুরু কঁচা মাংসের ভ্রায় দেখায় ; চক্ষুর মধ্যে দপ্ দপানি এবং প্রত্যেকবার স্পন্দনের সময় চিড়িক মারা ; চক্ষুর পাতায় শোথের ভ্রায় ক্ষীতি বাহার দরুণ চক্ষু যেন একবারে বুজিয়া যায় (এপিস্, ক্যালী-কার্ব্, রাস্টল্) ; চক্ষুর উপরের পাতার কাঁপনি (অরাম্) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে চক্ষু দিয়া জল পড়া ; চক্ষে আলোক একবারেই সহ হয় না (একন্, বেল্, সাল্ফ্) ; চক্ষুর পাতার প্রান্তে জালাভব ; চক্ষুর পাতার শুষ্কতা ; চক্ষু

দিয়া ক্ষত কারক জল পড়া যাহার দরুণ চক্ষু পাতা এবং গালের ছাল উঠিয়া যাইয়া আলা করে (ইউফ্রেস্, মার্ক্কর); শিশুর চক্ষু প্রদাহ; চক্ষুর চর্ম্ম খস্খসে, শুষ্ক এবং কাল্চে; চক্ষে আলোক সহ্য হয় না এবং আলোক লাগিলে চক্ষু দিয়া ক্ষতকারক জল পড়ে এবং উষ্ণ প্রয়োগে যাহার উপশম হয়; কেতুরেব দরুণ চক্ষু পাতায় পাতায় লাগিয়া থাকে; আলোক লাগিলে চক্ষু আক্ষেপিকদ্রুপে বুজিয়া যায়; চক্ষুর কর্ণিরার (Fornia) স্থানে স্থানে ক্ষত এবং দাগ পড়ে; চক্ষুর ষ্ঠেতাংশ হরিদ্রাবর্ণ।

কর্ণ। রাত্রিতে কাণের মধ্যে স্থতীবিধানের ছায় বেদনা (ক্যালী-বাই); কানে টন্ টন্ শব্দ হয় (বেল্, চায়না, নাক্স বম্); প্রত্যেকবার বেদনার সঙ্গে সঙ্গে কানে সৌ সৌ শব্দ হয় (বেল্, ক্যাক্, গ্রাক্, ক্যানী বাই)।

নাসিকা। নাক দিয়া ক্ষতকারক ক্ষেদ নিঃসরণ (এইলেব্, আমন্-কার্ক্, এরাম্, ইউফ্রেস্, দিপা, লাইকোপ্); সদি এবং তদ্রূপ নাক দিয়া প্রচুর পরিমাণে জলবৎ তরল শ্লেষ্মা নিগমন ও উহা ব সঙ্গে সঙ্গে হাঁচি (একন্-জেলন্), স্বরভঙ্গ এবং নিদ্রাশূন্যতা; প্রাতঃকালে অসুখের বন্ধি এবং বাহ্য-যুগ্মে অসুখের উপশম (পাল্ন্); নাকে আগার দ্রব্যের গন্ধ সহ্য হয় না; নাকের গোড়ায় শ্লেষ্মা বদ্ধ হইয়া থাকে; নাকের স্থানে স্থানে শুট্-লের ছায় স্ফীতি; নাক দিয়া বক্ত পড়া।

মুখমণ্ডল। মুখমণ্ডল শিটা, মলিন এবং মৃতবৎ, (বিরেট্-আল্-ব্) হরিদ্রাবর্ণ, নীলের আভাযুক্ত অথবা একবারে শিটা বা ফিকা, কৃষ্ণ এবং অত্যন্ত কঠিনাতনার চিহ্নযুক্ত; ওষ্ঠ নীলবর্ণ বা নীলের আভাযুক্ত, কাল এবং ফাটা ও ক্ষতযুক্ত; শোণের ছায় ক্ষাতি (আর্টি-ক্লুড্) এবং নীলব রঙ্গ বিশিষ্ট, চক্ষু বসিয়া যায়, নীলের আভাযুক্ত রেখা দ্বারা পরিবেষ্টিত হয় এবং নাসিকার অগ্রভাগ স্থঙ্গ হয়; মুখমণ্ডল নীলবর্ণ এবং টলটলে; মুখমণ্ডলের কর্ণিন স্ফীতি দাড়া চ্যাপলে গঠিত হয় এবং চ্যাপ ছাড়িয়া দিলে স্বাভাবিক হয় বা গঠিত থাকে না; এই স্ফীতি প্রাতঃকালে চক্ষুর পাতায় উপরিভাগেই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়; মুখ মণ্ডল শীতল ঘর্ম্ম দ্বারা আবৃত এবং মৃতবৎ (বিরেট্-আল্-ব্); মুখ মণ্ডল অদৃশ্য বস্তুর চিহ্নযুক্ত (ক্যাক্ফার,

প্লাস্মা, বিরেট্-মাল্) ; ওষ্ঠ নীলবর্ণ, ক্ষীত, কাল এবং শুষ্ক, ফাটা ও ক্ষতযুক্ত ; মুখ মণ্ডলের শোথের ত্রায় ক্ষীতি (এপিস) ; ওষ্ঠ এবং মুখমণ্ডলে কৰ্কট রোগের ক্ষত (Cancerous ulcers) এবং উহাতে জালাযুক্ত বেদনাযাতনা ; হ্নাস্থির নিম্নস্থিত গ্রন্থির (Sub-maxillary glands) ক্ষীতি এবং উহাতে বেদনা ও টাটানি ।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য । ঘূনের ঘোরে দাঁত কান্ডানি (হেলিবোর, হায়োস্, পডোক্) ; দাঁত দ্ভাবিক অপেক্ষা লম্বা বলিয়া অতুভূত হয় ; দাঁত নড়ে (মাক্, নাইটিঙ্ক-আস্, রাস্টক্স্) এবং চাপিলে অথবা ঠাণ্ডা জল লাগিলে অত্যন্ত বেদনায়ুক্ত হয় বা টাটায় ; মাড়া ক্ষীত ও বেদনায়ুক্ত হয় এবং উহা হইতে রক্ত পড়ে ; রাত্রিতে দাঁতের গোড়ায় চিড়িকমারা বা দপ্দ্দপানি যাহা কপালের পার্শ্ব পর্য্যন্তও বিস্তৃত হয় ; ওষ্ঠ, দাঁতের গোড়া এবং মুখের মধ্যে ঘা ; জিহ্বা কারযুক্ত (Furred) এবং উহা মুখ্য ভাগে লাল চিহ্ন এবং উহাব অগ্রভাগ লাল বর্ণ (কোই-টোল্, রাস্টক্স্) ; জিহ্বা সাদাটেয়া, আঙনের ত্রায় লালবর্ণ, নির্মল এবং শুষ্ক (বেল্, রাস্টক্স্) এবং কটাৰ্ণ (ব্যাপ্ট্, রাস্টক্স্) ; জিহ্বার অত্যন্ত জলনী এবং উহাতে ঘা হইয়া পচা লাগা ; জিহ্বার গোড়ার ক্ষীতি ; মুখে অত্যন্ত শুষ্ক বোধ এবং অত্যন্ত প্রবল পিপাসা (ব্রাই, রাস্টক্স্) ; মুখের মধ্য এবং জিহ্বার অত্যন্ত কষ্টদায়ক ফোকার ত্রায় ফুসুড়ী ; রোগী বারম্বার জলাদিপান করে, কিন্তু সে একবাবে অধিক পাননায়ে জলাদি পান করিতে পারে না (হায়োস্, চায়না, নেট্রান্) ; মুখের মধ্য এবং জিহ্বায় বা ; মুখের মধ্য, আহার বহা গলনালা এবং উহার উপরিভাগে জালাশুভব (একন্, ক্যাপ্, ক্যাপ্) ; অত্যন্ত পিপাসা, কিন্তু জলাদি পান করিলে রোগী পবিতৃ হয় না এবং জলাদি পানের পর ধমনোদ্বেষ বা ধমন (টেউপেট্-পার্ক্) ; অত্যন্ত প্রবল পিপাসা, কিন্তু কোন নির্দিষ্ট বা বিশেষ প্রকারের জলাদি দ্রব্য পানে ক্ষুধা থাকে না ; আহারেব পব মুখে তিত্ত স্বাদ (ব্রাই, চায়না, কলোস্, ন্যাক্, বম্, পাল্, সাল্) ; জিহ্বা কটার অভাঙ্গু বা কালচে, শুষ্ক ফাটায়ুক্ত এবং কম্পনান ; মুখগহ্বরের পশ্চাৎভাগ এবং গলার মধ্যে শুষ্ক এবং জালাবেদ (একন্, বেল্, ক্যাপ্, ক্যাপ্) ; গিলিতে

অত্যন্ত কষ্টানুভব ; গলার মধ্যে সঙ্কোচন বা আঁটা বোধ (বেল, হায়োস্) ; গিলিবার সময় গলার মধ্যে জ্বালাবোধ ; আহার দ্রব্য গলার মধ্যে কতক দূর যাইয়া গলা দিয়া পুনরায় বাহির হইয়া পড়ে ; গলার মধ্যে লোন্তা বা তিক্ত স্বাদবিশিষ্ট জল উঠা ।

পাকস্থলী এবং উদর । আহার বা পানের পর মূখে তিক্তস্বাদ ; সকল রকমের আহার দ্রব্যেই অকচি ; যাহা কিছু খাওয়া যায় মনে হয় যেন গলাব মধ্যে আটকাইয়া বহিয়াছে ; আহারে অনিচ্ছা বা অকচি (আলাম্) ; আহার দ্রব্যাদি দেখিলেই যেন গা বমিবমি করে (একন্, আন্টি-টার্ক) ; জ্বরের নির্দিষ্ট সময়ে জ্বরের পরিবর্তে হিষ্কা ; অনেকক্ষণ ধবিয়া বমনোদ্বেগ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে শরীর অবসন্ন হওয়া বা মূর্ছা বা ওরা ; সমুদয় শরীরেই উষ্ণানুভব এবং কম্প ; অনবরত প্রবল বমন, আহার বা পানে যাহার উদ্দেশ্য হয় (নাক্স-বম, পাল্‌স, বিবেট-আল্‌ব) ; ফল ও বরফ বা বরফের কুন্নি খাইয়া পেটের অস্থখ ; উদরস্থ অজীর্ণ আহার দ্রব্যাদি (একন্, ফস্, বিবেট-আল্‌ব) এবং কটা বর্ণের পদার্থ, শ্লেষ্মা ও রক্তবমন ; উদরোদ্ধ প্রদেশে (Epigastrium) অত্যন্ত উদ্বেগ বা কষ্টানুভব ; পাকস্থলীর মধ্যে অত্যন্ত জ্বালাবৃত্ত প্রবল বেদনা (আন্টি-ক্লড্, এপিস্, বেল্, কল্‌চ্, ক্যান্‌চ্, আইরিস্, ফস্, নিরেট-আল্‌ব) ; পাকস্থলীতে দিল দরা (একন্, আন্টি-ক্লড্) ; পেটে অত্যন্ত ভারি বোধ, যেন একখানি পাথর বসাইয়া রাখিয়াছে (বাই, নাক্স-বম, পাল্‌স) ; চাপ দিলে পেটে বেদনা (আন্টি-ক্লড্, বাই, লাইকোপ্) ; পাকস্থলী এবং হৃৎপ্রদেশে ঠাণ্ডা বোধ বা অসহ্য জ্বালা এবং গরম বোধ । উদর উদরের শোথের জ্বায় ক্ষীত ; উদর ক্ষীত এবং বেদনাবৃত্ত (আপোসিনাম্, ক্যান্‌ব, মার্ক্), এবং উজাতে জ্বালাবৃত্ত প্রবল অসহ্য বেদনা ও অত্যন্ত কষ্টানুভব (একন্, ক্যান্‌চ্) ; উদরে কণ্ডনবৎ বেদনা (একন্, কলোস্) ; আহার বা পানের পর, অথবা রাত্রিতে উদরে শূলবেদনার জ্বায় বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অনেক সময় বমন বা উদ্‌রামগ, শরীর শীতল, আত্যন্তিক গরম বোধ এবং ঘৰ্ম্ম ; শীত এবং উদরে অসহ্য জ্বালাবৃত্ত ; কচ্‌কির গ্রন্থির (Inguinal glands) ক্ষীতি ।

মল এবং মলদ্বার । গুহ এবং গুহদ্বারে জ্বালা এবং কষ্টদায়ক

কৌথপাড়া এবং বাহের বেগ (আলোজ্, ক্যাস্, সিনা, আইরিস্, মার্ক্); শুষ্কদার বাহির হইয়া পড়া (পডোফ্); অর্শরোগ এবং অর্শের বলিতে জালা-যুক্ত বেদনা; ক্ষতকাবক মলত্যাগ এবং শুষ্কদারে ছাল উঠিয়া যাওয়া (মার্ক্, সাল্ফ্); অসাড়ে বা অনিচ্ছাপূর্বক মল নির্গত হয় (আর্গিকা); অসাড়ে বা অনিচ্ছাপূর্বক মূত্রত্যাগ (হায়োস্); মল কাল (একন্) এবং উগ্র, জালা উৎপাদক বা ক্ষতকারক (মার্ক্-কর, কার্কো-বেজ্, লেপ্টেণ্ড্রা, সাল্ফ্), চট্চটিয়া আঠা এবং সবুজ শ্লেষ্মা (অরাম্-মিউর, আর্জেন্ট্-নাইট্রি, পাল্‌স্, সাল্ফ্); কাল্‌চে, রক্তমিশ্রিত, বেদনাহীন জলবৎ তরল ভেদ (আণ্টি-ক্লড্, চায়না, পডোফ্); রক্তমিশ্রিত, কাল্‌চে, দুর্গন্ধযুক্ত জলবৎ তরল ভেদ (ব্যাপ্ট্); উদরাময়, রাত্রি হই প্রহবেব পর, প্রাতঃকালে এবং ঘুম হইতে জাগিলে বাতীর বৃদ্ধি হয়; বরফাদি ঠাণ্ডা দ্রব্য পান করিয়া পেটে ঠাণ্ডা লাগার পর উদরাময়; দুর্গন্ধযুক্ত, কাল্‌চে রক্ত ভেদ; রাত্রিতে আহার বা পানের পর উদরাময় বা উদরাময় থাকিলে উহার বৃদ্ধি; প্রবল উদরাময় এবং উহাব সঙ্গে সঙ্গে বমন বা বমনোদ্বেষ, বারম্বার অল্প পরিমাণ মল ত্যাগ, অত্যন্ত বলক্ষয়, পেটে বেদনা বা খিল ধরা, আভ্যন্তরিক দাহ, মূত্রাবরোধ এবং নাড়ী লুপ্ত বা লুপ্তপ্রায়; কোষ্ঠবদ্ধ (ব্রাই, ক্যাক্ কার্ক, নাক্স-বম্, ওপিয়াম্, সাল্ফ্)।

মূত্র যন্ত্র । প্রস্রাব করার সময় মূত্রনালীতে জ্বালাভব (ক্যানা-বিস্ সটি, ক্যাস্); অসাড়ে বা অনিচ্ছাপূর্বক মূত্রত্যাগ (বেল্, হায়োস্); মূত্র পরিমাণে অল্প, অতি কষ্টে নির্গত হয় এবং মূত্র নির্গত হওয়ার সময় মূত্রনালীতে অত্যন্ত জ্বালা (একন্, ক্যাস্); মূত্রাবরোধ (একন্, হায়োস্, ষ্ট্রামন); মূত্রাধারের পক্ষাঘাত; রক্ত প্রস্রাব (ক্যাস্, কল্‌চ্, হামামেলিস্, ফস্); আলবুমিনিউরিয়া (Albuminuria) এবং মূত্রাবরোধ হেতু মূত্রের ইউরিয়া (Urea) রক্তে অবরুদ্ধ হওয়ার দ্বারা বিকাব (Uraemia)।

জননেন্দ্রিয় । পুরুষাঙ্গের ক্ষীণত, উগ্রাভে বেদনা ও উগ্র পচা-যুক্ত ঘা বা পচিয়া যাওয়া; পুরুষাঙ্গের মাথা নীল বর্ণ, লাল, ক্ষীণ এবং ফাটাগুক্ত; অণ্ডকোষাধারের (Scrotum) শোণের ন্যায় ক্ষীণতা বা শোথ এবং অণ্ডকোষাধার পচিয়া উঠা হইতে অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত লাল্‌চে গাঢ় বা তবল

পূঁথ, ছেক্‌ড়া ছেক্‌ড়া নষ্ট হুধের ন্যায় গাঢ় বা তরল পূঁথ নির্গমন; মলত্যাগের সময় ধাতু নিঃসরণ । স্ত্রী লোকের প্রচুব পরিমাণে হরিদ্রা বর্ণের গাঢ় স্বেত প্রদর নিঃসরণ (হাইড্রাট্রিস্, ক্যালী-বাই); ক্ষতকাবক স্বেত প্রদর নিঃসরণ (ক্যালী কার্ক্); রক্তঃ স্রাবের পরিবর্তে যোনি দ্বার দিয়া সাদাটিয়া, ত্রণক-যুক্ত তরল র্ত্তেদ নিঃসরণ; নিয়মিত সময়ের অনেক পূর্বে প্রচুর রক্তঃস্রাব (আম্ব্রা, আমন্-কার্ক্, ক্যাক্-কার্ক্, নাক্স বন্); অত্যন্ত অবসন্নতা বা বলক্ষণ (আলাম্, কার্কো আনিমেন্, ককিউলাম্); কালুচে রক্তঃস্রাব; রক্তঃস্রাব এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে জরাযু বা তলপেটে কর্ত্তনবৎ বা জ্বালাযুক্ত বেদনা; পুরুষ সহবাসে অত্যন্ত ইচ্ছা এবং তদকণ যোনিদ্বার দিয়া অনিচ্ছাপূর্বক বা অস্বাভে শ্লেষ্মাব ভ্রাগ র্ত্তেদ নিঃসরণ; উদরের মধ্য দিয়া যোনিদ্বার পর্যন্ত কর্ত্তনবৎ বেদনা; ডিম্বকোষে (Ovary) কসিয়া ধরার ভ্রাগ বা জ্বালাযুক্ত বেদনা; ডাইন ডিম্বকোষ প্রদেশে চাপিয়া ধরা বা সৃষ্টী বিধানের ভ্রাগ বেদনা,—এই বেদনা কখন কখন উরুদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় এবং তদ্রূপ উরুদেশ অবশ্য হইয়া যায় ।

শ্বাস বস্ত্র । স্বর চর্কণ, কম্পনান, অসম (অর্থাৎ একবার উচ্চ এবং একবার মৃত) অথবা স্বরভঙ্গ; গলকের ধুম গেলে বেকণ হয়, গলার মধ্যে সেরূপ অন্তর্ভূত হইয়া কাশির উদ্বেক হয় (চাঘনা, ইগ্‌নেস্, লাইকোপ্); অথবা বায়ুনলের মধ্যে অনবরত কট্ কট্ বা হুড্ হুড্ করিয়া কাশির উদ্বেক হয় (আমন্-কার্ক্, বেল্, ক্যাক্-কার্ক্, ডুসিবা, ইগ্‌নেস্, রাস্টেক্স, কয়েক্স, সাক্সুনেরিবা); আমবাত (Urticaria) ইত্যাদি বসিয়া যাওয়ায় দকণ সপদ্ধা সৃষ্টী কাশি (Membranous Croup); সন্ধাব পব শয়ন কবিতামাত্রই নিশ্বাস রুদ্ধ হওয়ার উপক্রম, বায়ু নলের মধ্যে সাঁই সাঁই শব্দ হওয়া এবং উচ্চাতে আঁটাবোধ বা উচ্চাব সন্দোচন; ঝড়, বৃষ্টি, আর্দ্রবায়ু, তাড়াতাড়ি চলা, নিম্ন স্থান তত্বে উচ্চ স্থানে উঠা, গরম আঁটা কাপড় পরা, হঠাৎ বায়ুর অবস্থার পরিবর্তন,—অর্থাৎ হঠাৎ উত্তাপের পব ঠাণ্ডা লাগিলে উক্ত অস্থির রক্তি; শ্বাস প্রস্থানে সাঁই সাঁই শব্দ হওয়া, কাশি এবং গলাদিয়া ভিন্নের ঘোঁটা লালের ভ্রাগ শ্লেষ্মা নির্গমন; কাশি এবং গলা দিয়া রক্তমিশ্রিত শ্লেষ্মা নির্গমন; রাত্রিতে শ্বাস রোধক কাশির দকণ রোগী মোজা

হইয়া বসিয়া থাকিতে বাধ্য হয় (একন্, সাইকোশ্, আর্টি-টার্ট্); শয়ন করিলে বা ঠাণ্ডা বাতাসে শ্বাসরোধক কাশির উদ্রেক ; অত্যন্ত শ্বাসকষ্ট এবং অত্যন্ত উদ্বিগ্ন, বৃকে আঁটা বোধ এবং নিশ্বাস রুদ্ধ হওয়ার উপক্রম হওয়া, নাহার দ্রবণ রাত্রি দুই প্রহরের সময় রোগী বিছানা হইতে উঠিয়া বসিতে বাধ্য হয় ; বায়ুল যেন সঙ্কুচিত হয় (টেয়েস্); তাড়াতাড়ি চলিলে বা উচ্চ স্থানে উঠিতে শ্বাস কষ্ট (একন্, আমন্-কার্ক, ক্যাক্-কার্ক, ক্যালী নাই-ট্রিক্, মার্ক্); বৃকে আঁটা বোধ এবং সন্ধ্যার সময় অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও অস্থিরতা ; অত্যন্ত শ্বাস কষ্ট ; মুখমণ্ডল নীলবর্ণ, শীতল ঘর্ম্ম দ্বারা আবৃত এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ; সন্ধ্যার সময় বৃকের মধ্যে ঠাণ্ডা বোধ ; বৃকের ডাইন পাখের উপরিভাগে স্ফূটাবিধানের ত্রায় বেদনা ; বৃকের মধ্যে অত্যন্ত চট্‌চটিয়া আঠা শ্লেষ্মার সঞ্চার (আর্টি-টার্ট্, ক্যালী বাই) ; বৃকেব মধ্যে জ্বালা ; রক্ত স্রাবের পর শক্তোৎকাশ ; সমুদয় শরীরেই অত্যন্ত জ্বালা-যুক্ত গবনশোণি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে দুই বৃকের মধ্যবর্তী স্থানে বেদনা ; মাতালদিগের, এবং স্ত্রীলোকের রজঃ রোধের পর শক্তোৎকাশ ; বৃকের মধ্যে শ্লেষ্মা সঞ্চিত হইয়া কাঁপড় হওয়ার উপক্রম হওয়া ; রোগী (শিশু হইলে) বস্ত্রণায় বিছানায় বাবদ্বার এপাশ ওপাশ করিয়া ছট্‌ফট্ করে ; কুক্ষুস পচিয়া গলা দিয়া সবজ বস্ত্রের ছেকড়া ছেকড়া পুঁথের ত্রায় শ্লেষ্মা নিগত হয় ; বক্ষাস্থিতে স্ফূটী বিধান বা চাপিয়া ধরার ত্রায় বেদনা ।

হৃৎপিণ্ড এবং নাড়ী । হৃৎস্পন্দন, প্রধানতঃ রাত্রিতে, চীৎ হইয়া শয়নে বাগাব স্পন্দন স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন (একন্, স্পাইজেল্, বিবেট্, আন্স্); নাড়ী দ্রুত-গামী, উত্তেজিত, দ্রুতগামী এবং ক্ষুদ্র ; দ্রুতগামী, তন্দ্রল এবং অনিয়মিত গতি বিশিষ্ট (একন্, আর্টি-টার্ট্) ; নাড়া তন্দ্রল এবং ল্পৃ প্রাণ (একন্); হৃৎবেদনা বা হৃৎস্রাব শূল (Angina Pectoris); হৃৎপিণ্ডের উপরিভাগে হঠাৎ আঁটা বোধ ; হৃৎ প্রদেশে অত্যন্ত কষ্টকর বেদনা ; অত্যন্ত উদ্বিগ্ন এবং শ্বাস কষ্ট ।

ঘাড় এবং পৃষ্ঠদেশ । থেঁৎগিয়া গেলে বা মোচড়াইয়া পড়িলে ঘেঁকপ হয়, ঘাড়ের সেরূপ বেদনা ; ঘাড় শক্ত হয় বা উঠা নোয়ান যায়

না; যেহেতু শক্ত হয় বা উহা নোয়ান যায় না এবং যাহা গুহা দ্বারের উপরিভাগ হইতে আরম্ভ হইয়া উর্দ্ধদিকে বিস্তৃত হয়; কোমরে মোচড়াইয়া পড়ার জ্বাৰ বেদনা (অর্পিকা; ব্রাই) ; কোমরে শক্তি থাকে না; পৃষ্ঠদেশ এবং দুই স্বন্ধের মধ্যবর্তী স্থানে কসিয়া ধরার জ্বাৰ প্রবল বেদনা ।

হাত, পা ইত্যাদি । হাতের আঙ্গুলের অগ্রভাগ হইতে স্বল্প পর্য্যন্ত কসিয়া ধরা, ছিঁড়িয়া ফেলা বা ঝাকনিব জ্বাৰ বেদনা বা যাতনা; হাত এবং হাতের পাতাব নিকটবর্তী স্থান পর্য্যন্ত কাল্চে বা নীলের আভাযুক্ত হয়; হাতের আঙ্গুলের মাথায় জ্বালাযুক্ত ক্ষত । নীচের ঘর হইতে উপরের ঘরে সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উঠিতে মনে হর যেন পা ভাঙ্গিয়া যাইতেছে; মারিলে যেরূপ হয় হাঁটুর সন্ধিতে সেরূপ বেদনা; নিম্নাঙ্গে অস্থখ বোধ; রাত্রিতে রোগী হির এবং নিতরূভাবে শবন করিয়া থাকিতে পারে না এবং উপশম পাওয়ার আশার সে ব্যর্থতার পায়ের পাতা না না ভাবে রাখিতে এবং চলিয়া বেড়াইতে বাধ্য হয় (রাস্‌টক্) ; নিম্নাঙ্গ ঠাণ্ডা হয়; ক্ষুধা হইতে পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলী পর্য্যন্ত সমুদয় অংশের হাড়ের আবরক পর্দায় ছিঁড়িয়া ফেলা বা বাটিয়া ধরার জ্বাৰ বেদনা; ডাইন পায়ের পাতায় কসিয়া ধরা বা ছিঁড়িয়া ফেলার জ্বাৰ প্রবল বেদনা বা যাতনা; বসিয়া থাকা কালীন পায়ের পাতা ঘরের মেজ্যাতে রাখিলে পায় কসিয়া ধরার জ্বাৰ প্রবল বেদনা; পায়ের ডিনে (গোড়ায়) খিলধরা (সাঙ্ক, ক্যাক্, ক্যাক্, ক্যাক্, নাক্, বম্, সাই-লিসি) ; পায়ের পাতায় শোণের জ্বাৰ ক্ষীতি (অসিটিক্ আস্, এপস্, কলচ্) ; ফাটিয়া গেলে যেরূপ হয় চলিবার সময় পায়ের আঙ্গুলের মাথায় সেরূপ বেদনা বা টাটানি; পায়ের পাতাব তলা এবং আঙ্গুলে ক্ষত হওয়া; হাত পায়ের অত্যন্ত দুর্বলতা এবং অবসন্নতা বাহ্যিক দরুণ রোগী শয়ন করিয়া থাকিতে বাধ্য হয়; হাত পায়ের ঝাকনি, ঝাপনি, স্পন্দন এবং অত্যন্ত দুর্বলতা ।

চর্ম্ম । শরীরের স্থানে স্থানে কষ্টকর এবং বেদনাযুক্ত কাল্চে কুস্তুরী; চর্ম্ম যেন পার্চমেন্ট (Parchment) চানড়ার জ্বাৰ শুষ্ক; গায় বেস্তুনি রঙ্গের কুস্তুরী (অর্পিকা, সিকেল্), গায় কৌশার জ্বাৰ কুস্তুরী; গায় কুস্তুরী বাহা চুকাইলে আরো চুকাই, জ্বালা করে এবং বেদনাযুক্ত

হয়; পায় ধূসর বর্ণের খোসা বা চুমটী বিশিষ্ট কুস্কুড়ী এবং উহা প্রমোহযুক্ত প্রান্ত দ্বারা পরিবেষ্টিত; জ্বালা এবং বেদনায়ুক্ত কুস্কুড়ী (কার্বো-বেজ্); গায় গোমের ভূষি বা মরা চর্মের ত্রায় কুস্কুড়ী (নাইট্রিক আস্); ঘায় যেন পচা লাগিয়াছে এরূপ অনুভূত হয় (কার্বো-বেজ্, ক্রিয়াজ্, ল্যাক্, সাইলিসি, সিকেল্); চর্ম হরিদ্রা বর্ণ; গায় ঘা এবং উহা হইতে নষ্ট হ্রদের ত্রায় 'ছেক্‌ডা ছেক্‌ডা গাঢ় বা তরল দুর্গন্ধযুক্ত পুঁথ নির্গমন; ঘা নীল বা সবুজের আভাযুক্ত এবং উহা হইতে সহজেই রক্ত পড়ে; শিরার ক্ষীতি ও বিবৃদ্ধি (Varices)।

নিদ্রা। রাত্রিতে নিদ্রাশূন্যতা এবং তদ্রূপ বিছানায় বারম্বার এপাশ ওপাশ করিয়া ছট্‌ফট্ করা ও মনের ভয়ানক আন্দোলন; ঘুমেরঘোরে বারম্বার চমকিয়া উঠা (আগারিকাশ্, আমন্-কার্ক্, বেল্, ব্রাই, হায়োস্, ব্রৈমিন্, সাল্ক্); ঘুম ভাল হয় না এবং ঘুমেরঘোরে কৌথানি বা কৌকানি (লাইকোপ্, পালস্); ঘুমেরঘোরে শোক, হুঃখ, বিদ্‌হাৎ, ঝড়, আগুন, অন্ধকার ইত্যাদি স্বপ্ন দেখা; ঘুম হওয়া হওয়া সময়ে হঠাৎ চমকিয়া উঠা বা হাত পায়ে হঠাৎ ধাক্কা লাগার ত্রায় অনুভূত হয়।

জ্বর। শীত কম্প বহির্বায়ুতে বৃদ্ধি হয়, কিন্তু উহার সঙ্গে পিপাসা থাকে না; শরীর শীতল, চর্ম শুষ্ক এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পর্যায়ক্রমে শীতল ঘর্ম; শীত ও গরম একত্রে অনুভূত হয়; অথবা আভ্যন্তরিক শীত বোধ এবং বাহ্যিক গরমবোধ বা গা গরম এবং গাল লালবর্ণ (আর্গিকা); শীত কম্পের সময় ওষ্ঠ এবং নথ নীলবর্ণ; আভ্যন্তরিক জ্বালা অনুভব এবং গায় শুষ্ক ও উষ্ণ বোধ (একন্, ব্রাই); শীতল চট্-চটিয়া ঘর্ম (ক্যাম্, ডিজিট্, ক্যালী নাইট্রিক্, মার্ক্, সিকেল্); অথবা টকগন্ধযুক্ত বা দুর্গন্ধ বিশিষ্ট ঘর্ম (আর্গিকা, মার্ক্); ঘর্মাবস্থায় বারম্বার অনিবার্য পিপাসা, কিন্তু রোগী একবারে অধিক পরিমাণে জল পান করে না বা করিতে পাবে না, ঘুমের অবস্থায় ঘর্ম; সমুদয় শরীরে শীত বোধ অথচ উহার সঙ্গে চর্ম পার্চমেন্ট্ (Parchment) চামড়ার ত্রায় শুষ্ক, অথবা উহার সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে শীতল চট্-চটিয়া ঘর্ম; শীত বোধ, বিশেষতঃ জলাদিপানের পর; বাহ্যিক উত্তাপ

প্রয়োগে শীতের উপশম ; গায় অত্যন্ত জ্বাল বাহার দরুণ মনে হয় যেন শিরা দিরা অত্যন্ত উষ্ণ জল বহিয়া যাইতেছে ; সন্ধ্যারাম জ্বর এবং প্রত্যেক দিন বৈকালে ৩ টার সময় শীত আরম্ভ হয় ; কেবল উষ্ণাবস্থায়ই পিপাসা এবং রোগী বারম্বার অল্প পরিমাণ জল পান করে ; জ্বরের সময় অত্যন্ত অস্থিরতা, অস্থিতে, কোমরে এবং কপালে বেদনা ; জ্বরের বিরাম আরম্ভ হইলেই অত্যন্ত দুর্বলতা এবং নিস্তেজতা ; নাড়ী দ্রুতগামী, ক্ষুদ্র এবং অসম ; দ্ব্যাহিক, ত্র্যাহিক এবং কখন কখন ঐক্যাহিক আকারের সন্ধ্যারাম জ্বর ; সন্ধ্যারাম বা স্বল্প বিরাম জ্বরের তিন অবস্থার (শীতলাবস্থা, উষ্ণাবস্থা এবং ঘর্ম্মাবস্থা) একটি অবস্থার প্রায়ই অভাব আদিনিহের এক বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত ।

ব্যবহার । গলিত মৃতদেহ এবং উদ্ভিদপদার্থ হইতে উৎপন্ন বাষ্প এবং বিষ ঘায় লাগিয়া, খাঁস দ্বারা টানিয়া অথবা উদবস্থ করিয়া বিবাক্ত হওয়ার দরুণ অসুখ ; উদর, বক্ষকোটর এবং সমুদয় শবীরের শোথ ; উষ্ণ সন্ধ্যারাম জ্বর ; অথবা জ্বরে কোইনাইনের (Quinine) অপব্যবহার দরুণ জ্বর আটকাইয়া থাকা বা পুরাতন সন্ধ্যারাম জ্বর ; মলৈয়িক ঝিল্লীর প্রদাহজনিত রোগ ; আত্মিক-জ্বর বা জ্বর বিকার ; পুঁথ ইত্যাদি রসক্ষয় হেতু জ্বর বা হেটিক্ ফিবার (Hectic Fever) ; চক্ষুর যোজক ঝিল্লীর প্রদাহ (Conjunctivitis) ; সর্দি ; মুখে এবং দাঁতের গোড়ায় ঘা ; উদরাময় ; আমাশয় ; ক্ষত বা ঘা ; অজীর্ণ রোগ ; চর্ম্মরোগ ; স্নায়বিক অসুখ ; স্নায়ুশূল ; অনিচ্ছাপূর্বক পেশী স্পন্দন (Chorea) ; মূর্গারোগ ; পক্ষাঘাত ; হৃদযেননা বা হৃৎস্নায়ুশূল (Angina Pectoris) ; ইপানি কাশি ; ফুফুস প্রদাহ ; হৃৎপিণ্ডের রোগ ; মূত্রকোষের ব্রাইটস্ ডিজিজ্ (Bright's Disease) ; কৰ্কটরোগ বা ক্যান্সার (Cancer) ; যে সকল ঘায়ে পচা ধরে এবং দাহা হইতে প্রচুর দুর্গন্ধযুক্ত ছানার জলের স্রাব ছেকড়া ছেকড়া তরল বা গাঢ় পুঁথ পড়ে ; সাপের কামড় ; তানাকু খাওয়ার দরুণ অসুখ ; মাতালদিগের মানসিক বিকার বা অবসন্নতা ; চক্ষু প্রদাহ ; চক্ষুর কর্ণিয়াতে ক্ষত এবং দাগ পড়া ; নাসিকা, মুখমণ্ডল এবং গর্ভের কৰ্কট রোগ বা ক্যান্সার (Cancer) ; জিহ্বার প্রদাহযুক্ত ক্ষতি ; জলপথে নৌকা, জাহাজাদিতে যাওয়ার দরুণ

বমন বা বমনোদ্বেগ (Sea-Sickness); সমুদ্রে স্নানাদি করা বদর্শন অস্থিরতা ; রক্তভেদ ; পাকস্থলীর তরুণ প্রদাহ (Acute Gastritis); প্রবল বা সাংঘাতিক ওলাউঠা (Asiatic Cholera); শূল বেদনা; উদরী (Ascites); অচূর রক্তস্রাব (Menorrhagia); কণ্ঠনালীর তরুণ এবং পুরাতন প্রদাহ; পুণ্ড্র বা কণ্ঠ; মুখে পচাযুক্ত ক্ষত (Cancerum oris) ইত্যাদি অস্থিরতা আর্সিনিক্ ব্যবহার্য্য। আর্সিনিকের উপকারিতা সম্বন্ধে ডাক্তার হিউজ্ (Dr. Hughes) বলেন যে “ফার্মাকোপিয়াতে যে সকল ঔষধের উল্লেখ আছে, তাহার সমুদয় বাদ দিয়া যদি রোগ চিকিৎসার জন্য কেহ আমাকে কেবল মাত্র দুইটা ঔষধ মনোনীত করিয়া ব্যবহারের অধিকার দেন, তবে আমি একোনাইট্ এবং আর্সিনিক্ মনোনীত করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে পারি”। (Manual of Pharmacodynamics, 4th edition, page 263, Article Arsenic, by Dr. Hughes). আমরাও ডাক্তার হিউজের এই মতের পোষকতা করিতে পারি।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । অতি শীঘ্র শীঘ্র বলক্ষয়; অত্যন্ত অস্থিরতা এবং মূর্ত্যভয়; অত্যন্ত পিপাসা; রোগী বারম্বার অল্প পরিমাণ জলাদি পান করে এবং উহা ছাবাই সে পরিভূক্ত হয়, কিন্তু জলাদি পান করার পরই গা বমি বমি করে বা বমন হয়, গায় জ্বালা বা জ্বালাযুক্ত যাতনা; সর্বদা উষ্ণ ঘরে থাকার ইচ্ছা; হঠাৎ বলক্ষয়; সামান্য যাতনা বা কারণে অত্যন্ত বলক্ষয় এবং নিশ্শেষতা; আত প্রত্যাঘে দুর্বলতা; মনের উদ্বেগ, মুচ্ছা বা অবসন্নতা; দ্বন্দ্বপ্রদেশ এবং উদরে খিল ধরার দ্বারা অত্যন্ত কষ্টানুভব; আভ্যন্তরিক জ্বালা। রাত্রিতে (রাত্রি দুই প্রহরের পর ১টা হইতে ৩টা পর্য্যন্ত), ঠাণ্ডা বা ঠাণ্ডা বাতাস, ঠাণ্ডা আহার দ্রব্য, বরফাদি ঠাণ্ডা দ্রব্য পান, ঠাণ্ডা জলে স্নান, আহার বা পানের পর, মাথা নিচু করিয়া শুইয়া থাকিলে অস্থিরতা বৃদ্ধি এবং উত্তাপে, মাথা উচু করিয়া শুইয়া থাকিলে, চুলিয়া বেড়াইলে বা নড়াচড়াতে অস্থিরতা উপশম ইত্যাদি আর্সিনিকের ক্রতিকণ্ঠলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ। দ্বিবিধ বা ত্রিবিধ বিরাম জরে শীতল, উষ্ণ এবং ঘর্ম্মাবস্থাব এক অবস্থার অভাব, স্নায়বিক অস্থিরতা বা ছটফট করা, গাত্রদাহ; ওলাউঠা ভেদ বর্ম্মীর পরিমাণ

অপেক্ষা বলক্ষয় অধিক হওয়া, অতি শীঘ্র, শীঘ্র বলক্ষয়, পেটে বেদনা বা খিল ধরা, বারংবার জলাদি পানের ইচ্ছা এবং জলাদি পান করিলেই বমনো-
দ্বগ বা বমন ইত্যাদি লক্ষণের উপর দৃষ্টি রাখিয়া এই ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা
করিয়া লেখক বিশেষ ফল পাইয়া থাকেন। আর্সিনিক একটি উৎকৃষ্ট
ঔষধ মধ্যে পবিগণিত, কিন্তু ইহার অপব্যবহারে যারপাঃ নাই অনিষ্ট
হইয়া থাকে ।

সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ । আর্সিনিকের কার্য এত বিস্তৃত যে
প্রকৃত পক্ষে বলিতে গেলে ভৈষজ্যতত্ত্বে এমন একটি ঔষধের উল্লেখ নাই
যাহাব কোন না কোন কার্যের সঙ্গে আর্সিনিকের কার্যের সাদৃশ্য নাই ।
তবে মার্কিউবিয়াস্ করোসাইবাস্, ক্যালী বাইক্লোফাম্ এবং আরোডিনের
কার্যের সঙ্গে আর্সিনিকের কার্যের অনেক সাদৃশ্য আছে । এতদ্ভিন্ন কোন
কোন বিষয়ে একোনাষ্টট, আর্পিকা, বেলাডোনা, ব্রাইওনিয়া, কার্কো বেজি-
টেবিলিস্, কার্কোলিক্ আসিত্, চায়না, গ্রাফাইটিস্, ল্যাকেসিস্, মার্কি-
উরিয়াস্, নাক্স বমিকা, ফক্ষবাস্, সাল্ফার, বিবেটাম্ আল্‌বাম্ ইত্যাদি
ঔষধেব কার্যের সঙ্গেও আর্সিনিকের কার্যের সাদৃশ্য আছে ।

প্রতিষেধক ঔষধ । ক্যাম্ফার, কার্কো বেজিটেবিলিস্, চায়না,
ডিপার সাল্ফিউরিস্, আরোডিন্, ল্যাকেসিস্, নাক্স বমিকা, বিবেটাম্
আল্‌বাম্ ইত্যাদি আর্সিনিকের কতকগুলি প্রতিষেধক ঔষধ মধ্যে পরিগণিত ।
অধিক মাত্রায় আর্সিনিক খাইয়া বিনাক্ত হইলে সেন্সুই অক্সাইড্ অব্
আয়রন্ (Sesquioxide of iron), হাইড্রেটেড্ পাব্ অক্সাইড্ অব্ আয়রন্
(Hydrated peroxide of iron) অথবা প্রিসিপিটেটেড্ কার্বোনেট্ অব্
আয়রন্ (Precipitated carbonate of iron), আত্মের রস বা মধু এবং জল
মিশ্রিত করিয়া পান কবান, প্রচুর পরিমাণে চুনের জলপান করান;
সাল্ফেট্ অব্ জিন্ক্ (Sulphate of zinc) ইত্যাদি বমনোৎপাদক ঔষধ
প্রয়োগ দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শে ।

• **ডাইলুশন বিচার ।** আর্সিনিকেব নিম্ন, মধ্যম এবং উচ্চ সমুদয়
প্রকারের ক্রমই ব্যবহৃত হইয়া থাকে । ডাক্তার হিউজ্ বলেন যে ওলাউঠা,
বিকারের অবস্থা, কর্কট বা ক্যান্সার, রোগ, পুরাতন আকারের প্রচুর রক্তশ্রাব

এবং চর্মরোগে আর্সিনিয়াস্ আর্সিডের ১ম ক্রমের গুঁড়া অথবা লাইকার পোটাশি আর্সিনাইটিস্ ($\frac{1}{2}$) ব্যবহারে বিশেষ উপকার দর্শে। ওলাউঠা রোগে এতদ্দেশে ৩, ৬, ১২ এবং ৩০ ক্রম ব্যবহারে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। এই রোগে এতদ্দেশে চিকিৎসকগণ ৬ এবং ১২ ডাহলুশনই সচরাচর ব্যবহার করিয়া থাকেন। রোগী অত্যন্ত নিস্তেজ হইয়া পড়িলে ৩০ ক্রম অধিক উপকারী। ডাক্তার হিউজের মতে উল্লিখিত অন্ত্যন্ত অসুখেও ৩, ৬, ১২ বা ৩০ ক্রম উপকারী। পুরাতন আকারের উদরাময়ে ৩ দশমিক ক্রমের গুঁড়া মন্দ নহে। আবাব ৬, ১২ এবং ৩০ ক্রম সচরাচর ব্যবহার করিয়াও বিশেষ ফল পাওয়া যায়। ডাক্তার বেজের (Dr. Bayes) মতে পুরাতন আকারের সবিরাম জ্বরে ৬ ক্রমের আরোক অধিক উপকারী। এই প্রকার জ্বরে লেখক স্বয়ং ১২ ক্রম ব্যবহার করিয়া ৬ বা ৩০ ক্রম অপেক্ষা অধিক ফল পাইয়া থাকেন। ওলাউঠা রোগে লেখক প্রায় সকল রোগীর চিকিৎসায়ই ১২ ক্রম ব্যবস্থা করিয়া বিশেষ ফল পাইয়া থাকেন। এই রোগে যদি রোগী অত্যন্ত নিস্তেজ হইয়া পড়ে, তবে ৩০ ডাঃ ১২ ডাঃ অপেক্ষা অধিক উপকারী। প্রদাহ জনিত যে সকল পুরাতন রোগে আর্সিনিক্ ব্যবহার্য্য তাহাতে ৩ ক্রমের গুঁড়া এবং ৬ ক্রমের আরোক মন্দ নহে। অনেক চিকিৎসক এই ঔষধের ১০০, ২০০, ৫০০, ১০০০ এবং ততোধিক ক্রমও ব্যবহার করিয়া ফল পাইয়া থাকেন একপা শুনিতে পাওয়া যায় এবং হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসা-বিসয়ক গ্রন্থেও দেখিতে পাওয়া যায়। লেখক স্বয়ং ১০০ এবং ২০০ ক্রম ব্যবহার করিয়া কোন কোন বোণীর পুরাতন আকারের উদরাময় এবং চর্মরোগে বিশেষ ফল পাইয়াছেন। তিনি ২০০ অপেক্ষা অধিক উচ্চ ক্রম কখনও ব্যবহার করিয়া দেখেন নাই। অতএব তিনি উহার উপকারীতা সম্বন্ধেও বিশেষ কিছু বলিতে পারেন না।

অরাম্,—তবক,—স্বর্ণ,—অরাম্ ।

(AURUM METALLICUM,—METALLIC-GOLD,—AUR.-MET.)

কোন এক বিশ্বস্ত হোমিওপ্যাথিক ঔষধ বিক্রেতাব ঔষধালয় হইতে, তবকের পাতা ক্রয় করিয়া যথা নিয়মে উহা সুগার অব্ মিল্কে মিশাইয়া ১ম, ২য় এবং ৩য় শতভাগিক বা ৬ষ্ঠ দশমিক ক্রমের গুঁড়া প্রস্তুত করিতে হয়। তৎপর যথা নিয়মে ইহা চতুর্থ শতভাগিক ক্রমের আরেক প্রস্তুত হইয়া থাকে। এম এবং ততোধিক শতভাগিক ক্রমের আরেক যথা নিয়মে বেক্‌টিকাইড্ স্পিরিটে প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহাকে অরাম্ মেটেলিকাম্ বা অরাম্ ফলিয়েটাম্ (Aurum metallicum or Aurum Foliatum) বলে। অল্প এক প্রকার অরাম্ প্রস্তুত হইয়া থাকে, উহাকে অরাম্ মিউরিয়াটিকাম্ অথবা ট্রাইক্লোরাইড্ অব্ গোল্ড্ (Aurum Muraticum or Trichloride of gold) বলে। ইহার ১ম দশমিক ক্রমের আরেক কোন এক বিশ্বস্ত হোমিওপ্যাথিক ঔষধ বিক্রেতার ঔষধালয় হইতে ক্রয় করিয়া হরিদ্রা বর্ণের ষপাড়্ পিণ্ডে রাখা উচিত। ইহার ১ম শতভাগিক ক্রমের আরেক যথা নিয়মে চুবান জলে (Distilled water), ২য় শতভাগিক ক্রমের আরেক ডাইলুট্ স্পিরিটে এবং ২য় শতভাগিক ক্রমের অধিক উচ্চ ক্রমের আরেক বেক্‌টিকাইড্ স্পিরিটে প্রস্তুত হইয়া থাকে। উক্ত উভয় প্রকারের অরাম্ই হোমিওপ্যাথিক মতে বোগ চিকিৎসায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সর্ব প্রথমে আবহ দশ এবং তৎপর গ্রীস দেশেই স্বর্ণ প্রথমে ঔষধার্থ ব্যবহৃত হয়। স্বর্ণে ঔষধেব কোন গুণ নাই বলিয়া আলোপ্যাথিক চিকিৎসকগণ উল্লেখ করিয়াছেন। এতদ্দেশে কতিপয় মহাশয়গণও অনেক কাল হইতেই ঔষধার্থ স্বর্ণ ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। হোমিওপ্যাথিক অবিকল্পিত মহাত্মা সানুয়েল হান্‌সমান স্বর্ণের গুঁড়া প্রস্তুত করিয়া পরীক্ষা দ্বারা উহা বোগ আধানে কার্যকার গুণ না ক্ষমতা দেখাইয়া দিয়াছেন।

সাধারণ ক্রিয়া। সাধারণতঃ অস্থি এবং গ্রন্থির উপর ইহার কার্য অধিক প্রবল। তদুপরে নাসিকার গ্রন্থি এবং তৎসম্বন্ধীয় শ্লেষ্মক

ঝিল্লীই ইহা দ্বারা অধিক আক্রান্ত হইয়া থাকে এবং তদ্রূপ উক্ত অংশের
গরমীর ব্যারাম, পাৰা অথবা গওমালা জনিত অস্থিরতার রোগ উৎপন্ন
হইয়া থাকে । ইহা শোক, দুঃখ জনিত মনের অস্থিরতা এবং তদ্রূপ স্তব্ধবায়ু
(Melancholia) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বিমর্ষভাব ও আত্মহত্যার ইচ্ছা
অত্যন্ত প্রবল করিয়া থাকে ।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

• মন । আপন জীবনে দুর্গা এবং আত্ম হত্যার ইচ্ছা (নেজা, নাক্স
বম্); ধর্মোন্মত্ততা (Religious Mania); রোগী (স্ত্রীলোক হইলে) মনে করে
যেন তাহার মুক্তি নাই; স্তব্ধ বায়ু (Melancholia) এবং তদ্রূপ বিমর্ষভাব;
রোগী মনে করে যেন সে এই পৃথিবীর কোন কার্যেই উপযুক্ত নহে
এবং সে কোন কার্যেই সফল হইতে পারিবে না (অর্জেস্ট-নাইট্রিক্);
হতাশ, অস্থিরতা, বিমর্ষ হওয়া এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে ক্রন্দন (লাইকোপ্, নেট্রাম্
মিউর, নাক্স বম্, পাল্‌স, বাস্টক্স); মনের অত্যন্ত উদ্বিগ্ন বাহ্য স্ব-
প্রেক্ষেশ দৃঢ় দৃঢ় বা ধড়কড়ি করিয়া আরম্ভ হয় এবং বাহ্য দরুণ বোগী
স্থানে স্থানে ছুটিয়া বেড়ায় (আস্); অস্পন্দন; সন্দেহই ভয়ের আশঙ্কা
বা ভয় (বেল্, একন্ চারনা, ইগ্নেনস্); দবজার সামান্য শব্দ শুনিলেই
বোগী অত্যন্ত ভয় খায় এবং চিত্তাকুল হয়; সন্দেহ বাগ কবা এবং উত্তেজিত
হওয়া; কথার সামান্য প্রতিবাদ করিলেই বোগী অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া
ক্রোধান্বিত হয় (ব্রাই, কান্, ফেবান্, নাগ্ বম্); সামান্য মানসিক
পারিশ্রমেই বোগী অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়ে, শোক, দুঃখ বা কাহারো
প্রেমে নৈবাস হইয়া অস্থির (হায়োস্, ইগ্নেনস্, ফন্-আন্); কাঁদিবার
অনিবার্য ইচ্ছা ।

মস্তক । মাথা হেট করিলে মাথা ঘোরা, মাথাব দরুণ বোগী মনে
করে যেন সে চক্রাকারে ঘুরিতেছে (ব্রাই, কোনারাম্, নাক্স বম্);
বোগী মনে করে যেন সে মদ্য পান করিয়াছে (ইগ্নেনস্); বহির্বাযুতে
চলিয়া বেড়াইলে মাথা ঘোরা (আগারিকাশ্, ক্যান্‌ক্-কান্, গ্লোনবেন্,
সিপিয়া, সাল্‌ফ্) বাহ্য দরুণ বোগী শয়ন করিয়া থাকিতে বাধ্য হয়; মাথা

রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে চক্ষুর সম্মুখে যেন আশ্র-
নের কণার ছায় ভাসে; মুখ মণ্ডল কাচের ছায় টল্‌টলে বা উজ্জল; মানসিক
পরিশ্রম বা চিন্তাতে মাথা ঘোরার বৃদ্ধি; ভাস্কিলে যেরূপ হয় শয়ন করিলে
মাথার হাড়ে সেরূপ বেদনা; মাথার পশ্চাত্তাগের ডাইন পার্শ্ব হইতে মস্তিষ্কের
মধ্য দিয়া কপাল পর্য্যন্ত বেদনা বাহ্য নড়া চড়াতে বৃদ্ধি হয়। "

চক্ষু । চক্ষে কাসিয়া ধরা; চক্ষে এক বস্তু ছইটীর ছায় দেখায় (বেল্,
সিকুটা, নাইটিক্-আস্, কাইটোল্); বস্তুগুলি যেন ছই ভাগ করিয়া
শোয়াইয়া রাখিয়াছে বাহার কেবল নীচের অর্দ্ধাংশ দেখিতে পাওয়া যায়
এবং মনে হয় যেন উহার উপরের অংশ কোন এক কাল বস্তু দ্বারা ঢাকা
রহিয়াছে; চক্ষুর খেতাংশ লালবর্ণ; চক্ষু দিয়া অনবরত চল পড়া (ইউফ্রেস্);
প্রাতঃকালে চক্ষু পাতায় পাতায় লাগিয়া থাকে, (এইলেভ্, ক্যান্‌ক্-কাক্,
লাইকোপ্, নাক্, মাল্‌ফ্); চক্ষুর হাড় খেঁৎনিয়া যাওয়ার ছায় টাটায়।

কর্ণ । কানের হাড় ক্ষয় হয় (ক্যাপ্) এবং কান দিয়া অন্ত্যন্ত দুর্বল-
যুক্ত পূর্ব পড়ে বাহ্য কোন মতেই যারে না (বোবোটা)।

নাসিকা । নাসারন্ধ্রে ক্ষত এবং নাকের পাতার পাতার লাগিয়া
থাকে, তদরূপ অত্যন্ত কষ্টাত্তর (নাইটিক্ আস্) এবং নাক দিয়া শ্বাস
প্রশ্বাসে অশক্তি (এরান্); নাকের মধ্যে খোশা বা চুম্‌টী পড়ে (অস্টি-ক্রুড্,
গ্রাক্, ক্যালো-বাই, পাল্‌স্); সন্ধিতে নাকে গাঢ় স্লেথ জমিলে বেরূপ
হয় নাসারন্ধ্র যেন সেরূপ এক ছইয়া থাকার ছায় অতীত হয় অথচ নাসারন্ধ্র
দিয়া অনারোগ্যে বাহ্যে কতকাত্ত করে; নাকের মধ্যে আলা, চুলকান,
সুচীবিদ্যমানের ছায় বাতনা বা আলাবৃত্তা চাহিক মারা; স্পর্শ করিলে নাকে
টাটানি (নাক্); নাকের হাড়ের মধ্যে ছত্র কণার গার বেদনা, (এইলেভ্,
প্রকার গন্ধই যেন উগ্র বোধ হয়, অতএব কোন প্রকার গন্ধই নাকে সহ হয়
না (এক্‌ক্, অগারিকাশ্, কফিয়া, বেল্, ফল্‌চ্, হিপ্-মাল্‌ফ্, লাইকোপ্);
নাক ঝাড়িবার সময় দুর্বল বাহির হওয়া; নাকের হাড়ের ক্ষয় (ক্যাক্-
কাক্, নাক্)।

মুখ মণ্ডল । মুখ মণ্ডলের বাম পার্শ্বে কনিষ্ঠা ধরা বা ছিড়িয়া
দেখাই ছায় বেদনা; গালের শাশ্রু আলা এবং ছিদ্ৰ করার ছায় বেদনা;

মুখ মণ্ডলের অস্থির প্রদাহ ; গালের অস্থির ক্ষয় ; ইন্নাস্থির নিম্নস্থিত প্রস্থির ক্ষতি এবং উহাতে বেদনা (এরাম্, ক্যাক্স-কার্ক, আরোড্, রাস্টক্স) ; ওঠ, মুখ মণ্ডল এবং কপালে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুসুড়ী ।

মুখ গহ্বর এবং গলার মধ্য । মুখের মধ্যে বাতাস লাগিলেই জ্বাতে বেদনা; মুখে দুর্গন্ধ (আর্গিকা, হিপ-সাল্ফ, আরোড্, ড্রিয়ার্জ, মার্ক, নাইট্রিক-আস, পাল্‌স) ; মুখে তিক্ত বা পচা স্বাদ (আর্গিকা, মার্ক, হিপ-সাল্ফ, পাল্‌স) ; তালুকার অস্থির । চাপিলে বা থেঁৎলিয়া গেলে যেক্রপ হয় ক্লম্বুলস্থ গ্রন্থিতে সেক্রপ বেদনাশুভব ; কেবল গিলিবার সময়ই গলার মধ্যে টাটানি এবং হলকুটানের জ্বায় বাতনা অনুভূত হয় ; গিলিবার সময় এবং অজ্ঞাত সময়েও নিম্নমার্গের কোণে কোন একটা গ্রন্থিতে চাপিয়া ধরার জ্বায় ঘৃণ্যবেদনা ।

পাকস্থলী এবং উদর । অতিরিক্ত ক্ষুধা ও তৃষ্ণা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পেটে গড়্ গড়্ কল কল শব্দ হওয়া ; পাকস্থলীর মধ্যে বাম পার্শ্বে চাপা বোধ । উদরে জ্বালাযুক্ত উষ্ণানুভব এবং ডাইন হাইপোকণ্ড্রিয়ামে কঠিনবৎ বেদনা ; উদরে দূষিত বায়ু বন্ধ হইয়া থাকে (কার্কোবেজ, চারনা, লাইকোপ) ; উদরে অত্যন্ত ভারি বোধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে হাত পায়ের পাতা ঠাণ্ডা হয় ।

মূত্র । মূত্র ঘোলাটিয়া, ঘোলের জ্বায় এবং উহাতে অধিক পরিমাণে শ্লেষ্মা তলানি পড়ে ।

জননেন্দ্রিয় । ডাইন অণ্ডকোষ ক্ষীত হয় এবং স্পর্শ কবিলে বা রগড়াইলে উহাতে থেঁৎলিয়া বাওয়ার জ্বায় চাপাযুক্ত বেদনা বোধ ; অণ্ডকোষ কঠিন হয় (একন্, কোনারাম) ; রাত্রিতে পুরুষাঙ্গ খাড়া হয় এবং তদ্রূপ অনিচ্ছাপূর্বক ধাতু নির্গত হয় (ফস্-আস) । স্ত্রীলোকের জরায়ু কঠিন এবং স্থান ভ্রষ্ট হইয়া সরিয়া পড়ে (Prolapsus Uteri) ।

শ্বাস যন্ত্র । শ্বাস কষ্ট রোগী বারম্বার দীর্ঘ নিশ্বাস টানিতে বাধ্য হয় এবং বুকের মধ্যে যেন প্রচুর বাতাস ঘাইতেছে না এরূপ অনুভূত হয় (আস্, আন্টি-টার্ট, ফস) ; শ্বাস কষ্ট এবং নিশ্বাস টানিবার সময় বুকের মধ্যে হঠাৎ বিধানের জ্বায় ঘৃণ্যবেদনা ; মধ্যে মধ্যে রোগী কাঁপড় হওয়ার উপক্রম

হয় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বুকের আক্ষেপিক সঙ্কোচন ; বুকে রক্তাবরোধ হেতু হাঁপানি কাশি ; রাত্রিতে এবং বর্ষির্বাযুতে চলিবার সময় বুকের মধ্যে অত্যন্ত কষ্টানুভব, মুখ মণ্ডল নীলের আভাগুক্ত লাল বর্ণ ; হৃৎস্পন্দন ; অচেতন হইয়া পড়িয়া যাওয়া ।

হৃৎপিণ্ড এবং নাড়ী । প্রবল হৃৎস্পন্দন এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত উদ্বেগ, ভয় এবং তদ্রূপ গা কাঁপে (একন) ; নাড়ী ক্ষুদ্র, কিন্তু দ্রুতগামী ; নাড়ী দুর্বল ; হৃৎপিণ্ডের অস্বাভাবিক জনিত হাঁপানি (Cardiac Asthma) ; মানসিক অবদমনতা ; অত্যন্ত দুর্বলতা ।

পা ইত্যাদি নিম্ন শাখা । শরীরের উর্দ্ধভাগের রক্ত যেন (স্ত্রী-লোক) রোগীর মাথা হইতে পা ইত্যাদি নিম্নাঙ্গে চলিয়া গিয়াছে এবং তদ্রূপ উক্ত অঙ্গের পক্ষাঘাত হওয়ায় হার অল্পভূত হয় ; রোগী বসিয়া থাকিতে বাধা হয় ; বসিয়া থাকা কামীন ব্যাণ্ডেইজ্ (Bandage) বাধিয়া রাখিলে যে রূপ হয় হাঁটুর ক্ষতিতে সেকপ বেদনা বা যাতনা অল্পভূত হয় ।

নিদ্রা । বোলী সমুদয় ব্যক্তিই জাগিয়া থাকা অথচ তদ্রূপ প্রাতিঃ কালে গা মাটি মাটি কবা, অলসবোধ বা নিদ্রাবতাব অল্পভূত হয় না ; ঘুমেরবোধে চোবের ভবানক স্পষ্ট স্বপ্ন দেখা (আগিকা, বেল, পালস, সালফ) ; ঘুমের অবস্থার দীর্ঘ নিদ্রাস ; রাত্রিতে অস্থিতে বেদনার দ্রুপ ঘুম ভাঙ্গিয়া যায় ; বহুলা অত্যন্ত অধিক ভয় এবং তদ্রূপ রোগী একবারে হতাশ হইয়া পড়ে ও তাহার বাঁচিয়া থাকিবাব ইচ্ছা থাকে না ।

চক্ষু । গভীর কৃত মায়া অস্তি পর্য্যন্ত ও বিস্তৃত হয় ; পারার অপব্যবহার জনিত কৃত কালী-আবোভ, নটিটিক্-অস) ।

ব্যবহার । গরমীর ব্যারাম বা পারার অপব্যবহার জনিত রোগ ; গণ্ডমালা জনিত রোগ ; নাসিকা, তলুকা, গাল এবং কানের অস্তি ক্ষয় ; মাথা এবং অস্ত্রাঙ্গ অংশের অস্তি বিবৃদ্ধি ; নাসারন্ধ্রে পচাচর্ম্মক্লু কৃত, বিশেষ-বতঃ যদি গরমীর ব্যারাম বা পারার অপব্যবহার জনিত হয় ; কান দিনা পূঁথ পঁড়া ; পুতান দর্দি এবং নাকে গাঁড় প্রেরা জন্মিয়া থাকা ; অণ্ডকোষ প্রদাহ বা একশিরার ব্যারাম ; হিষ্টেরিয়া (Hysteria) বাহাতে রোগীর আত্ম হার ইচ্ছা অত্যন্ত প্রবল হয় ; মনোমত্ততা (Hypochondriasis) ; শুক্ক বায়ু

(Melancholia) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বিমর্ষভাব; গ্রন্থির অসুখ; স্ত্রীলোকের জরায়ু এবং ডিম্বকোষের পুরাতন অসুখ ইত্যাদি রোগে অরাম্ বিশেষ উপকারী এবং ব্যবহার্য্য ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । হাত পায়েব হাড়ে ছিঁড়িয়া ফেলা, ছিদ্র করা বা মোচড়াইরা পড়ার ছাষ বেদনা ; সমুদয় প্রকারের বেদনা বা যন্ত্রণাই অসহ্য হইয়া পড়ে এবং ঠাণ্ডা বাতাস সহ হয় না; হিষ্টিরিয়ার আক্রমণের সময় রোগী একবার হাसे আবার কাদে; অত্যন্ত দ্বাবিক হর্ষলতা এবং মনের আন্দোলন ও উহার সঙ্গে সঙ্গে গা কাঁপা; হাড়ে ছিদ্র করার ছাষ বেদন ; অস্থির, বিশেষতঃ গরমীর ব্যারাম বা পাবার অপব্যবহারের পর ; ঠাণ্ডা বাতাস গায় একবারেই সহ হয় না ; শিরার মধ্য দিয়া উষ্ণ জল বাহিয়া গেলে ঘেঁরুপ হয়, গায় সেরুপ উষ্ণ এবং জ্বালা বোধ । প্রাতঃকালে, ঠাণ্ডা লাগিলে, নিদ্রার সময় অসুখের বুদ্ধি এবং নড়াচড়া, চলিয়া বেড়ান অথবা গরম লাগিলে জ্বরের উপশম ।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ । আর্সিনিক্, প্লাটিনা, মার্কিউরিয়াস্, ফক্সাস্, নাইট্রিক্ আসিড্, পাল্‌সেটিলা, সাইলিসিয়া, মেজিরিয়ান্ ইত্যাদি ঔষধগুলি অনেকটা অব্যাহার সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে ।

প্রতিষেধক ঔষধ । বেলাডোনা, ক্যাম্ফার, চায়না, ককিউলাস্, কফিয়া, কুপ্রাম্, মার্কিউরিয়াস্, পাল্‌সেটিলা, স্পাইজেলিয়া ইত্যাদি অরামের প্রতিষেধক ঔষধ মধ্যে পরিগণিত ।

ডাইলুশন বিচার । প্রথমতঃ হানিমান (Hanemann) ১ম এবং ২য় ক্রমের গুঁড়া ব্যবহার করিতেন এবং তৎপর ১২ এবং ৩০ ক্রমের আরো কণ্ড ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন । নাকে পচাযুক্ত হর্গন্ধ বিশিষ্ট ক্ষতের পক্ষে (পাবার অপব্যবহার বা গরমীর ব্যারাম জনিত হইলে) ১ম, ২য় এবং ৩য় দশমিক ক্রমের গুঁড়া ২ বা ১ গ্রেণ মাত্রার, প্রতি দিন তিন মাত্রা ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল পাওয়া যায় । এই ঔষধের ৬, ১২ এবং ৩০ ডাইলুশনও অনেক চিকিৎসক ব্যবস্থা করিয়া বিশেষ ফল পাইয়া থাকেন । লেখক স্বয়ং ৬ক্রম অপেক্ষা উচ্চ ক্রম কদাচিত্ ব্যবহার করিয়া থাকেন ।

বেলাডোনা,—বেল্ ।

(BELLADONNA,—BELL.)

দক্ষিণ ইউরোপ এবং মধ্য আসিয়ার পশ্চিমাংশের প্রস্তরময় ছায়াবিশিষ্ট পতিত জমি এবং ইংলণ্ডের দক্ষিণাংশে পুরাতন দুর্গ এবং পুরাতন ভাঙ্গা ছাড়া বাড়ীতে এই গাছ জন্মে । সমুদয় গাছ দিয়া যথা নিয়মে ডাইলুট্ স্পিরিটে ইহার মূল আবোক প্রস্তুত হইয়া থাকে । ১৬ ভাগ মূল আরোক ৮৬ ভাগ ডাইলুট্ স্পিরিটে মিশাইয়া ইহাব ১ম দশমিক ক্রমের আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে । ইহার ২য় দশমিক ডাইলুশন ২০° ডিগ্রী ওবার প্রফ স্পিরিটে এবং তৎপৰ অগ্রাণ্ড ডাইলুশন রেক্টিফাইড্ স্পিরিটে প্রস্তুত হইয়া থাকে ।

সাধারণ ক্রিয়া । বৃহৎ মস্তিষ্ক (Cerebrum) উপবই বেলাডোনার কার্য্য সৰ্ব্বপ্রধান এবং বৃহৎ মস্তিষ্ক দিয়াই ইহার কার্য্য মস্তিষ্কের সমুদয় অংশে বিস্তৃত হইয়া থাকে । মস্তিষ্ক এবং ইহার আবরক পর্দা আক্রান্ত হওয়ার দরুন উহাতে রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ হইয়া প্রদাহ উৎপাদন করে । মস্তিষ্কের যে অংশে জ্ঞান উৎপন্ন হয় সেই অংশই ইহা দ্বারা অধিক আক্রান্ত হইয়া থাকে, যাহার দরুন প্রলাপ, ভ্রম দেখা, কাল্পনিক দ্রব্যাদি বা জন্তু দেখা, উন্নততা, অর্দ্ধজ্ঞান বহিততা, (Stupor), নিদ্রা-শূন্যতা ইত্যাদি অঙ্কুর হইয়া থাকে । মস্তিষ্কের এই কেন্দ্রাংশ হইতে বেলাডোনা সমুদয় স্নায়বিকমণ্ডলীকে উত্তেজিত করিয়া মেডালা অব্ লংগুটা (Medulla oblongata) এবং কসেরকা মর্জ্জায় রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ করে এবং তদরুন গতি এবং জ্ঞান উৎপাদক স্নায়ু (Motor and Sensory nerves) উভয়ই অতিরিক্ত পরিমাণে উত্তেজিত হইয়া থাকে । বিশেষ বিশেষ ইন্ধিয়ের শক্তি বা চেতনা অত্যন্ত প্রবল বা তীক্ষ্ণ হয় এবং উহাব কার্য্যও বিকৃত হইয়া থাকে । স্বেচ্ছাপূর্ব্বক সঞ্চালিত হওয়ার শক্তি বিশিষ্ট পেশী (Voluntary muscles) গুণি ধনুষ্ঠকারের দ্বার আক্ষেপ দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং স্বেচ্ছাপূর্ব্বক সঞ্চালন শক্তি শূন্য পেশী গুলির সম্পূর্ণ পক্ষাঘাত হইয়া, স্নায়ুধার এবং গুহাবাবের সঙ্কোচক যন্ত্র (Sphincters)

শিথিল হয় এবং চক্ষুর তারা বিস্তৃত হয়। চর্মের উপর বেলাডোনার স্থানিক কার্য্য অত্যন্ত প্রবল। আরক্ত জ্বর, এবং ফোঁস্কার হ্রাস ফুসুড়ী ব্যতীত ঈরিসিপেলাস্ (Erysipelas) রোগে যেরূপ হয়, চর্ম সেক্রপ অত্যন্ত লালবর্ণ, উষ্ণ, নির্মল এবং উজ্জ্বল হইয়া থাকে। চক্ষু, মুখগহ্বর, মূত্র যন্ত্র এবং জন-নেত্রিয়েব স্ফৈয়িক ঝিল্লীই ইহা দ্বারা বিশেষরূপে আক্রান্ত হয়। অত্যাশ্রয় স্থানের স্ফৈয়িক ঝিল্লীর নীচে যে চর্মবিবিশিষ্ট অংশ আছে, তাহাও ইহা দ্বারা আক্রান্ত হইয়া উঠাতে রক্তাববোধ এবং তদ্রূপ প্রবল প্রদাহ হইয়া থাকে।

• পরিপাক কার্য্য সহকারী যন্ত্র, মাস্তক ঝিল্লী (Serous membranes), অস্থি ইত্যাদি বেলাডোনা দ্বারা সোজাসোজি আক্রান্ত হয় না। কিন্তু গ্রন্থি, জরায়ু এবং তৎসহকারী যন্ত্র গুলিও অনেক সময় ইহা দ্বারা আক্রান্ত হইয়া উঠাতে রক্তাধিক্য বা রক্তাববোধ এবং প্রদাহ হইয়া থাকে। মুখমণ্ডল আরক্ত, গ্রীবাদেশস্থ বৃহৎ ধমনির দপদপানি, নাড়ী কঠিন, পূর্ণ, দ্রুতগামী, ক্ষুদ্র ও গোলাকার এবং উগ্র প্রলাপ; লক্ষণাদি হঠাৎ প্রকাশ পাওয়া এবং হঠাৎ দূরীভূত হওয়া বেলাডোনার কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক চিহ্ন মধ্যে পরিগণিত।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মন। অত্যন্ত ক্রোধ ও তদ্রূপ চতুষ্পার্শ্ববর্তী লোকদিগকে কামড়াইবার বা মাঝিবার চেষ্টা এবং তাহাদিগের গায় থুথু দেওয়ার চেষ্টা (হারোস্, ট্রায়ন্); দ্রবাদি ছিড়িয়া খণ্ড খণ্ড করা ইচ্ছা (বিরেট্-আল্‌ব্); উগ্র বা প্রবল প্রলাপ; উচ্চৈঃস্বরে হাসি এবং দাঁত কামড়ান; কাল্পনিক বিষয়ে ভয়; ভূত, প্রেত দেখা (ওপিয়াম্, ট্রায়ন্); উল্লাস হঠাৎ ক্রোধে পরিবর্তিত হওয়া; সম্পূর্ণ অচেতনাবস্থায় বিছানা হঠাৎ উঠিয়া বাওবার চেষ্টা (আগারিকাস্, এপিস্, হায়োস্, ট্রায়ন্); কাল্পনিক বস্তু ধরিতে প্রয়াস পাওয়া বা বিছানার কাপড়াদি খোঁটা ত্রেকান; মনের অত্যন্ত উদ্বেগ, ভীকতা এবং অস্থিরতা (একন্, আন্, চায়না, ফন্); পানীয় করা বা লুকাইয়া থাকার ইচ্ছা; কথা বলিতে অনিচ্ছা বা তাড়াতাড়ি কথা বলা; নেসা হইলে যেরূপ হয় সেক্রপ হইয়া থাকা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য বা রক্তা-

বরোধ এবং চক্ষুর তারা বিস্তৃত (হায়োস্, ওপিয়াম্) ; অত্যন্ত চটা স্বভাব বা সহজে চটিয়া যাওয়া ; উন্নততা এবং তদ্রূপ জ্ঞান বুদ্ধি সমুদয় লুপ্ত হওয়া (Dementia.) ।

মস্তক । মাথা হেট করিয়া উপুড় হইলে মাথাঘোরা (একন্), অথবা মাথা হেট করিয়া পুনবার সোজা হইলে মাথাঘোরা (ডুই, পিটোল্, পাল্‌স্) ; বাম বা পশ্চাৎদিকে টলিয়া পড়া (নাক্স্ বম্) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে চক্ষে অন্ধকার দেখা এবং চক্ষুর সম্মুখে পাখীর ডানা বাড়াইয়া ভায় ধড়-কড় করা (নেটাম্-মিউর) ; মাথা ঘোরা, বাহ্যিক দরুণ মনে হয়, যেন চতুর্দিকস্থ বস্তুগুলি চক্ষুর দ্বারা দৃষ্ট হইতেছে (জাহ, কোনারাম্) অথবা একবার এদিক আবার ওদিক ঘাতাঘাত করিতেছে ; নড়াচড়া অথবা দিছানাঘ পাশ ফিরিতে মাথা ঘোরা (কোনারাম্) ; মাথা কিম্বা কিম্বা করা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় যেন কপাল একখানি তক্তা দিয়া চাপিয়া রাখিয়াছে (একন্, জেল্‌স্, মার্ক্, নাটটিক্ আস্, সাল্‌ফ্) ; মস্তিকে রক্তাধিক্য (ফেবাম্, কোকাস্) ; মস্তিষ্কের ধমনীর দপদপানি, মস্তিষ্কে দপদপানি (একন্, গ্লোনফেন্, ওপিয়াম্, ম্যাগ্নেসিয়াম্) ; প্রথমে শিরঃস্রাব, গোলমাল, নড়াচড়া, চক্ষু সঞ্চালন, আঘাত লাগিলে এবং কাশিবার সময় যাহা পূর্বে হইত (জাহ, নিমিসিফ্) ; মাথায় চাপা বোধ যাহা এখন এক স্থানে এবং উহার গবর্ণরটাই অন্য স্থানে অনুভূত হয় ; মস্তিষ্কে প্রবল দপদপানি বাহ্য পশ্চাৎদিক হইতে সম্মুখে এবং চাই পার্শ্বের চক্ষু পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া খোঁচা বিদার কার যাতনা অনুভূত হইয়া শেষ হয় ; চিড়িক মারাত্মক শিরঃস্রাব, তাড়াতাড়ি চলিলে, নীচের ঘর হইতে দাঁড়ি ভাঙ্গিয়া উপরের ঘরে তাড়াতাড়ি উঠিতে বাহ্য অধিক প্রবল হয় ; একখানি ভারি বস্তু থাকিলে সেরূপ হয়, প্রত্যেক বার ঝাকি লাগিলে মাথায় পশ্চাৎভাগে সেরূপ অনুভূত হয় ; কপালে প্রবল বেদনার দরুণ চলিবার সময় বোজা বাবস্তার বিন ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে বাধ্য হয় ; কপালস্থ বস্তু মস্তিষ্ক যেন একবার উত্তিষ্ঠেছে এবং একবার নানিষ্ঠেছে, প্রত্যেকবার পদনকেপের সময় সেরূপ অনুভূত হয় ; কপাল প্রবল বেগে চাপিলে বেদনার উপশম (চায়না) ; মাথা এবং চক্ষুর গোময়কর মধ্যে বেদনা বাহ্যিক দরুণ মনে হয় যেন চক্ষু

উহার কোটর হইতে বাহির হইয়া পড়িবে ; কপালে চাপিয়া ধবার জ্বাশ্রয় বেদনা যাহা চলিবার সময় এত বৃদ্ধি পায় যে উহার দরুণ রোগী চক্ষু বুজিয়া থাকিতে বাধ্য হয় ; কপালের এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্ব পর্য্যন্ত ছুরী বঁধানের জ্বাশ্রয় বেদনা অনুভূত হয় ; সম্মুখদিকে হেলিয়া পড়িলে মাথা ধরার বৃদ্ধি এবং পশ্চাদ্ধিক দিকে বাকিয়া পড়িলে মাথা ধরার উপশম হয় ; হঠাৎ প্রবল বাতাস লাগিলে মাথা ধরা (চায়না) ; মাথার চুল ছোট করিয়া কাটিলে বা রোদ্র লাগিলে মাথা ধরা ; মাথার বহির্দেশ এত বেদনায়ুক্ত হয় যে উহাতে সামান্য আঘাত লাগিলে, এমন কি চুলের ভাবেও, মাথার বেদনার বৃদ্ধি হয় (একন্, চায়না, মার্ক) ; নেসা করিলে যেকণ হয় মাথায় সেরূপ অনুভূত হয় এবং যাহা আহার বা পানের পর অথবা প্রাতঃকালেই প্রধানতঃ অনুভূত হয় ; মাথায় পূর্ব, ভারি এবং চাপা বোধ, প্রধানতঃ কপালে, চক্ষু উপরি-ভাগে ; মস্তিষ্ক যেন বিস্তৃত হইতেছে এরূপ অনুভূত হয় ; জল থাকিলে যেরূপ হয়, স্নান করিলে সেরূপ আলোড়ন ; মাথা কাঁপনি এবং মাথা পশ্চাদ্ধিক দিকে বাকিয়া পড়া ; ঘুমেরবোরে বালিসের নীচে মাথা খুসিয়া দেওয়া । কোন নির্দিষ্ট সময়ে স্বাভাবিক শিরঃপীড়া, অপরাহ্ন ওটার সময় অথবা উত্তাপে এবং শয়ন করিয়া থাকিলে বাহ্যিক বৃদ্ধি হয় ; মাথার ডাইন পার্শ্ব ছিদ্র করার জ্বাশ্রয় বেদনা (স্নানশূল), নড়াচড়াতে যাহাব বৃদ্ধি হয় ; এমন সম্মিলিত শিরঃপীড়া বাহ্যিক দরুণ মনে হয় যেন মাথা কাটিয়া যাইবে, এবং নড়াচড়া, উজ্জ্বল আলোক, গোলমাল অথবা হঠাৎ বাতাস লাগিলে বাহ্যিক বৃদ্ধি হয় ; হিষ্টি-রিয়া জনিত শিরঃপীড়া ।

চক্ষু । চক্ষু উজ্জ্বল এবং যেন উহার কোটরের বাহির হইয়া পড়ে এবং চক্ষুর তারা বিস্তৃত ; চক্ষু স্থির ভাবাবশিষ্ট (এথুজা, আমিল, এইলেঙ্, হায়োস্, নেজা) ; চক্ষু লালবর্ণ, ক্ষীত এবং বিকৃত (ট্রামন্), চক্ষু শুষ্ক, কঠিন এবং উত্তাপে গদ্য ও জ্বালা বোধ (একন্, আর্স) ; চক্ষে জ্বালা একবারেই সহ হয় না এবং চক্ষু দিয়া জল পড়ে (একন্, ইউফ্রেস্, গ্রাকাই-টিস্, মার্ক, সালফ) ; চক্ষুর তারা বিস্তৃত এবং স্থিরভাব বিশিষ্ট বা অচল (হায়োস্, ওপিয়াম্, ট্রামন্,) ; একটা বস্তু দুইটির জ্বাশ্রয় দেখায় (অরাম্, সিকুটা, ট্রামন্, ফাইটোল্) ; বস্তু সকল উন্টা দেখায় অর্থাৎ উহার অগ্র-

ভাগ গোড়া বলিয়া বোধ হয় এবং গোড়া অগ্রভাগ বলিয়া অনুভূত হয় ; চক্ষুর সম্মুখে যেন আঙনের শিখা বা কণা ভাসিতেছে এরূপ দেখায় (নাই-ক্রোমেন্, মৌনয়েন্, ক্যালী-কার্ক, সাল্ফ্) ; সমুদয় বস্তুই লাল দেখায় ; প্রদীপের আলোকের চতুর্দিকে যেন ঝাড়ের ছায় দেখায়, এবং উহা রঞ্জিত বলিয়া অনুভূত হয়,—লালরঙ্গই অধিক ; কখন কখন আলোফ যেন সূর্য্য বা চন্দ্ৰের ছায় মণ্ডল দ্বারা পরিবেষ্টিত, এরূপ দেখায় (ফস্) ; চক্ষুর আক্কেপিক স্পন্দন ; চক্ষু প্রদাহ এবং চক্ষুর যোজক ঝিল্লী ও স্বেতাংশ লালবর্ণ ; চক্ষুব স্বেতাংশ হরিদ্রা বর্ণ ; রাক্রিতে চক্ষুব পাতায় পাতায় লাগিয়া থাকে ; দূরদৃষ্টি (Longsightedness) ; চক্ষে গোলমলে দেখা বা একবারে না দেখা ।

কর্ণ । কানে গোলমাল সহ্য হয় না, এমন-কি সামান্য শব্দও যেন কানে লাগে (একন্) ; কানের মধ্যে দৌ দৌ টন্ টন্ এবং অজ্ঞাত রক-মের শব্দ হয় (একন্, আস্, চাঘনা, লাইকোপ্, নাগ্-বম্, সাল্ফ্) ; কানের মধ্য এবং উহার বহির্দিকে ছিড়িয়া ফেলার ছায় বাতন অনুভূত হয় (ক্যাম্, পাল্ফ, মার্ক্) ; কানের প্রদাহপূর্ণ ক্ষাতি (একন্, এপিস্, পাল্ফ) ; কর্ণমূলস্থিত গ্রন্থির প্রদাহ ও ক্ষাতি এবং উহাতে পোচা বিধার ছায় বেদনা এবং কুটকুটানি বা ফুড়ফুড়ী ।

নাসিকা । নাকে কোন প্রকারের গন্ধ সহ্য হয় না (অরাম্, একন্, আগারিকাশ্, কফিয়া, কল্চ্, তিপ্-সাল্ফ, লাইকোপ্) ; তামাকের সামান্য গন্ধও নাকে সহ্য হয় না ; নাসিকার অগ্রভাগ ক্ষীত, উজ্জল লালবর্ণ এবং জ্বালাযুক্ত (বোনাগ্, নাইট্রিক্-আস্, অকজালিক্-আস্, রাস্টগ্) ; নাসারন্ধ্রের অভ্যন্তর শুষ্কতা (গ্রাফাইটিস্, ক্যালী-বাই) ; বারম্বার ঈটি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে নাকের মধ্যে ফুড়ফুড়ী বা কুটকুটানি ; নাক দিয়া রক্ত মিশ্রিত শ্লেষ্মা নির্গমন ; নাক দিয়া রক্তপড়া (একন্, ব্রাই) এবং উহার সঙ্গে মাথার রক্তাধিক বা রক্তাবরোধ, মৃদমণ্ডল লালবর্ণ, প্রদানতঃ বাহি এবং প্রাতঃকালে ; হৃদয়ব্রণ শক্তির প্রথরতা বা আতিশয্য নতুবা গ্রাণশক্তি একবারেই থাকে না ।

মুখ মণ্ডল । মুখমণ্ডল উজ্জল লালবর্ণ এবং উষ্ণ (এটিলেহ্) ; মুখ মণ্ডল ক্ষীত এবং উষ্ণ (একন্, ওপিয়াম্, ট্রামন্) ; মুখ এবং মুখমণ্ডলের

পেশীর আক্ষেপিক নড়া চড়া বা স্পন্দন (আগারিকাশ্, আন্টি-টার্ট, সিকু-টা, ইগ্নেস্, নাক্স বম্); উপরের ওষ্ঠে কসিয়া ধরা এবং উহার অভ্যন্তরীণ ক্ষতি (এপিস্, ব্রাই, ক্যাক্স-কাল্, শেরিনাম্); হন্নাস্থি হইতে কর্ণ পর্যন্ত খোঁচাবিধার জ্বায় বেদনা (ক্যাক্স-কার্, হিপ্-সাল্ফ্, ক্যালী-বাই); মুখমণ্ডলের দ্ব্যুশূল এবং তদ্রূপ আক্রান্ত স্থানে ছিড়িয়া ফেলার জ্বায় বা কঠিন বেদনা (পাল্); মুখমণ্ডলস্থ বিসর্প বা ইরিসিপেলাস্ (Facial Erysipelas) এবং আক্রান্ত স্থানের চর্ম্য নির্মূল, নির্মূল এবং উজ্জল; হন্নাস্থির নিম্নস্থিত গ্রন্থির প্রদাহ, ক্ষতি এবং উহাতে প্রবল বেদনা; দাঁত লাগা (Lock-jaw) বাহার দরুণ হা করা বা গিলিবার শক্তি থাকে না; শ্রীবার গ্রন্থির ক্ষতি ।

মুখ গহ্বর এবং গলার মধ্য । উপরের মাড়ির দাঁতে কসিয়া ধরার জ্বায় শূল্ শূশে বেদনা বা কনকনানি, রাত্রিতে এবং ঠাণ্ডা বাতাসে বাহার বৃদ্ধি হয় (আন্টি-ফ্রুড্); মাড়ী ক্ষত এবং দেনাযুক্ত (গ্রাফাইটিস্, মার্ক্); জিহ্বা এবং তালুকা কাল্চে লালবর্ণ, শুষ্ক (ব্যাপ্ট্); মুখগহ্বর, জিহ্বা এবং গলাব মধোর শুষ্কতার দরুণ কথা বলিবার এবং গিলিবার ব্যাঘাত জন্মে; জিহ্বা উষ্ণ, শুষ্ক, লালবর্ণ এবং ফাটাবুক্ত (এইলেস্, রাস্টেক্স্); জিহ্বার মধ্যভাগ সাদা এবং উহার প্রান্ত লালবর্ণ; গ্রন্থি জালিলেই মুখে চট্‌চটিয়া আঠা বোধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মাথায় চাপিয়া ধরার জ্বায় বেদনা; মুখ এবং গলার মধ্যে সাদাটিয়া গ্লেয়ার দরুণ এবং তদ্রূপ বারম্বার গলায় থেকুর দেওয়া এবং চোক গিলিবার ইচ্ছা । গলার মধ্যে বেদনা বা টাটানি; মুখ গহ্বরের পশ্চাভাগ এবং আগাব বহা গলনালীর উপরি-ভাগ গাঢ় লালবর্ণ; কোমল তালুকা (Soft-Palate) এবং তালুকার দুই পার্শ্বস্থিত গ্রন্থিদের (Tonsils) ক্ষতি, বাহাব দরুণ গিলিতে (প্রধানতঃ তরল পদার্থ) অসম্মত কষ্টানুভূত হয় (ল্যাক্); কথা বলিতে আটকাইয়া আইসে; গলার মধ্যে ঢেলাব জ্বায় কোন পদার্থ লাগিয়া রহিয়াছে এরূপ অনুভূত হয় বাহার দরুণ বোঁগী বারম্বার থক্ থক্ করিতে অথবা গলা থেকুর দিতে বাধা হয়; গলার মধোর বহির্দেশ ক্ষত বাহার দরুণ গলা সামান্য স্পর্শ করিলেই কঠোর উদ্বেগ হয় বা টাটায় (ল্যাক্); মুখ

গহ্বরের পশ্চাৎভাগ এবং গলার মধ্য অত্যন্ত শুষ্ক (এপিস্, নাক্স্ মফ্, পাল্‌স্); গলা যেন স্বাভাবিক অপেক্ষা কম প্রশস্ত হইয়াছে এরূপ অনুভূত হয়, বাহার দরুণ গিলিবার সময় মনে হয় গলার মধ্য দিয়া যেন কোন দ্রব্য ভালকপে উদরস্থ হইতে পারিবে না (হায়োস্, ট্রাম্‌ন্‌); গলাব মধ্যে অত্যন্ত জ্বালা; টন্‌সিল্‌ প্রদাহ (Tonsillitis); টন্‌সিল পাকিয়া উঠাতে পুঁথ হওয়া; গিলিবার সময় জল বা জলীয় পদার্থ নাক দিয়া বাহির হইয়া পড়ে।

পাকস্থলী এবং উদর। অত্যন্ত পিপাসা এবং ঠাণ্ডা জল খাওয়ার অত্যন্ত ইচ্ছা (একন্‌, ব্রাই); অথবা জল বা জলীয় পদার্থ খাওয়ার অত্যন্ত অনিচ্ছা (হায়োস); পেট গুলিয়া (মোট্‌ডাইয়া) উঠা; পাকস্থলীতে চৰ্‌বণবৎ, চাপিয়া ধরার স্থায়, কটনবৎ বা কসিষা ধরার স্থায় বেদনা, বাহার দরুণ রোগী পশ্চাৎ দিকে বাকা হইয়া নিশ্বাস বন্ধ করিতে বাধ্য হয়; আহারের পর পাকস্থলীতে অত্যন্ত চাপা বোধ (আস্‌, ব্রাই, নাক্স্, বম্‌, পাল্‌স্); পাকস্থলীতে জ্বালা বোধ (আস্‌, আন্টি-ক্লড্‌, এপিস্‌, কন্‌, বিরেট্‌-আল্‌ব্‌); পাকস্থলীতে একবালেই চাপ সহ্য হয় না (আস্‌, লাই, লাইকোপ্‌, কল্‌ড্‌); উদরস্থ অজীর্ণ আহার দ্রব্য, স্লেয়া এবং পিত্ত বমন (ইপিকাক্‌); পাকস্থলীতে খিল ধরাব স্থায় বেদনা, প্রবল কাঠবিষি এবং বমন; আক্‌সেপিক হিকা। উদর অত্যন্ত কঁাপে এবং স্পর্শনে অত্যন্ত বেদনাক্রম হয় (একন্‌, কলোস্‌, কুপ্রাম্‌, মার্ক্‌); উদরে উত্তর এবং জ্বালা বোধ (একন্‌, আস্‌, ক্যাস্‌); উদরে চাপিয়া ধরা, মোট্‌ডাইয়া ধরা বা কাটা দিয়া চাপিয়া ধরাব ন্যায় বেদনা বা যাতনা (ইপিকাক্‌); এখন এখানে, তখন ওখানে, এই প্রকারে উদরের নানা স্থানে কটনবৎ চাপিয়া ধরার স্থায় প্রবল বেদনা বা যাতনা; বিড়ানা সামান্য নড়িলে বা ঝাঁকি লাগিলেই রোগীর (স্ক্রোলোকের) উদরে বেদনা বা টাটানিব রুজি হয়; ঝাঁকি লাগিয়া বেদনাব রুজি হওয়ার ভয়ে রোগী অত্যন্ত আশ্রিত ভাবে চলে; উদরে বেদনার সময় উদর যেন ডেলাব স্থায় কুঁসিয়া উঠে।

মল এবং মলদ্বার। শুষ্ক যেন শুষ্কদ্বার দিয়া বাহির হইয়া পড়েছে এরূপ অনুভূত হয়; শুষ্কদ্বারের অত্যন্ত কষ্টদায়ক সংকোচন;

ঘাছের বেগ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কষ্টদায়ক কৌপপাড়া ও অতি অল্প পরিমাণে মলত্যাগ; চাখড়ীর তায় পদার্থযুক্ত, ডেলার তায় মলত্যাগ (হিপ-সাল্ফ, পডোফ্); সবুজ রঙ্গের শ্লেষ্মা ভেদ (এপিস্, আর্জেস্ট-মাইটি, আর্স্, মার্ক্, পাল্‌স্, সাল্‌ফ্); রক্ত মিশ্রিত চট্‌চটিয়া আঠা প্লদার্থ ভেদ (মার্ক্, নাক্স বম্); গুহঘারের সঙ্কোচক বস্ত্রের পক্ষাঘাত হেতু অসাড় বা অনিচ্ছাপূর্বক মলত্যাগ (আর্স্, হায়োস্); সবুজ বর্ণের তরল শ্লেষ্মা ভেদ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পেট কামড়ানী; রক্তাশায় এবং রক্তমিশ্রিত শ্লেষ্মাভেদ; দাণ্ডের সময় এবং উহার পর পেটকামড়ানী এবং কষ্টদায়ক কৌপপাড়া ।

মূত্রযন্ত্র । মূত্রববোধ অথবা ফোঁটায় ফোঁটায় মূত্রত্যাগ (একন্, ক্যান্, নাক্স বম্); মূত্র ঘোলাটিয়া (চের্লডন্) এবং উহাতে লাল্‌চে তলানি পড়ে (ক্রিরাজ্, সিপিয়া); অসাড় বা অনিচ্ছাপূর্বক মূত্রত্যাগ (আর্স্, হায়োস্) । মূত্রাধারের সঙ্কোচক বস্ত্রের পক্ষাঘাত এবং তদ্রূপ অনবরত অসাড় বা অনিচ্ছাপূর্বক মূত্র নিঃসরণ বা মূত্র ফোঁটায় ফোঁটায় পড়া; মূত্র পরিমাণে অল্প এবং অতি কঠিন নির্গত হয় (একন্, ক্যান্); রাস্তিতে মূত্রনাড়ীর গোড়ায় চাপিয়া ধরিলে যাবৎ বেদনা বা টাটানি; মূত্রাধারের মধ্যে ক্রমি বা পোকা রহিয়াছে এরূপ অনুভূত হয় ।

জননেন্দ্রিয় । অণ্ডকোষ প্রদাহ বা একশিরার ব্যারাম এবং অণ্ডকোষের কঠিনতা; স্ত্রীলোকের জননেন্দ্রিযে নাচের দিকে ঠেলিয়া নামিয়ার তায় বেদনা বাহার দরুণ মনে হয় যেন তলপেটের সমুদয় যন্ত্র যোনি দ্বাৰা দিয়া ঠেলিয়া বাহির হইয়া পড়িবে (লিলিয়াম, নেটাম্-মিউর্, প্রাটিনা, সিপিয়া); জরায়ু প্রদেশে জ্বালা, চাপা, যাতনা এবং ভাবিবোধ; ডিম্বকোষের প্রদাহ; ডাইন ডিম্বকোষের অত্যন্ত বিবাক (এপিস্) এবং উহাতে জ্বালাযুক্ত বা ছুরী দিয়া কাটার তায় বেদনাসুত্তর (কোনাযান্); নিয়মিত সময়ের অনেক পূর্বে, প্রচুর পরিমাণে রক্তস্রাব (আগন্-ক্যান্, ক্যান্-কার্ক্, নাক্স বম্); উজ্জ্বল লাল রক্তস্রাব (হামোরাইস্, ইপিগাক্) অথবা গাঢ় পচা কাল্‌চে লালবর্ণ রক্তস্রাব; সন্তান প্রসবের পর্বতগন্ধযুক্ত রক্ত (Lochia) নিঃসরণ এবং উহার নিঃসরণের সময় জরায়ু এবং যোনি দ্বাৰে গরমবোধ

(একন) : প্রসব বেদনা অতি মৃদু অথবা বেদনা একবারে চলিয়া যাওয়ার উপক্রম হয় (কলোফিলাম্, জেল্‌স্) ; সন্তান প্রসবে পৰ পেটে বেদনা (জেল্‌স্) ; প্রসবের পর ফুল (Placenta) জরায়ুর মধ্যে লাগিয়া থাকা বা নির্গত না হওয়া ; শুনে অতিরিক্ত শ্বস হইয়া পড়িয়া যাওয়া ।

স্থানযন্ত্র । শ্রবভঙ্গ বা অতি মৃদুশব এবং কণ্ঠনালীর ঔক্ষতার দরুণ শুষ্ক কাশি ; কণ্ঠনালী প্রদাহযুক্ত, ক্ষীত এবং সঙ্কুচিত হইয়াছে বলিয়া অনুভূত হয় ; কণ্ঠনালীতে স্ফুটন বা কুটু কুটানির দরুণ শুষ্ক কাশি (ফস্) ; গভীর, শ্রবভঙ্গবিশিষ্ট শুষ্ককাশি বাত্বিতে বাত্বার বৃদ্ধি হয় (ড্রুস্, হায়োস্) ; থেউ থেউ শব্দবিশিষ্ট কাশি (ড্রুস্, স্পঞ্জ, বার্কেস্কাম্) যাহার দরুণ রোগী কণ্ঠনালীতে বেদনা অনুভব করে এবং তাহার স্থানরুদ্ধ হওয়ার উপক্রম হইয়া রাত্রি দুই প্রহরের পর ঘুম ভাঙ্গিয়া যায় ; খাসপ্রশ্বাস ঘন ঘন এবং অত্যন্ত কষ্টকর (একন) ; বুকে আঁটা এবং কষ্টবোধ (ফস্) ; ঢুট শব্দের মধ্যবর্তী স্থান ও বুকে বেদনা (ব্রাই, নিমিনিক্, মার্ক্, ফস্) ; বুকে জ্বালাহীনতা ; বায়ুনলে কেশঘর্ষণশব্দ (Crepitation) এবং শ্লেষ্মার ঘড়্‌ঘড়ী ।

হৃৎপিণ্ড এবং নাড়ী । প্রবল সংস্পন্দন (একন, আর্স্, পাই-জেল্, সালুক্, বিবেট্-আল্‌ব্) যাহার আন্দোলন বা আলোড়ন গ্রীবা এবং মাথা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় ; নাড়ী অত্যন্ত প্রবল বা ক্ষুদ্র এবং অত্যন্ত ক্রতগামী (একন) ; কপালের দুই পার্শ্বস্থিত এবং গ্রীবার ধমনীর প্রবল দণ্ডপানি (গ্লোমক্সেন্, কাষ্টপেট্) ।

ঘাড় এবং পৃষ্ঠদেশ । গ্রীবা এবং ঘাড়ের গতি ক্ষীতি : কসে-কসাস যোতা বিশ্রামের ছাপ চলনবৎ বেদনা ; কোমরের পশ্চাত্তাগে ভাঙ্গিয়া ফেলার ছাপ বেদনা (ম্যাসোজ্, সিনিসম্, ব্যালা-ফোর্স্, নেট্‌'স-মিউব্, নাক্স-বন. প্লাটিনা) ।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, হাত, পা ইত্যাদি । অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আক্ষেপিক সঞ্চালন (হায়োস্, ট্রান্‌স্) ; হাত এবং পায়ের পাতায় ভারিবোধ ; হাত-পায়েরপেশিতে বমভাবে সঞ্চালন করার শক্তির বিনাশ এবং তদরূপ হাতপায় ভারিবোধ ও চলিতে অশক্তি । বানস্কেলটিক উপরিভাগে খোঁচাঘিষার ছাপ চাপাবোধ ; বাহুব উদ্ধাশে বুকের দিকের অংশে কসিয়া ধরার

শ্রায় বেদনা; বায়বাহার সমুদয় অংশেরই দুর্বলতা; পক্ষাঘাতে যেরূপ হয়, হাতি ইত্যাদি সমুদয় উর্দ্ধাঙ্গে সেরূপ কসিয়া ধরার ন্যায় চাপাবোধ; পক্ষাঘাতে যেরূপ হয় ডাইন হাতের তর্জ্জনী নামক অঙ্গুলী মধ্যম সন্ধিতে সেরূপ ছিড়িয়া ফেলার শ্রায় বেদনা বা বাতনা; বায় হাতের মধ্যমাঙ্গুলীর পৃষ্ঠাঙ্গিকের সন্ধিতে কসিয়া ধরার শ্রায় বেদনা; এই বেদনা যেন অস্থির আবরক পর্দা অন্তর্ভূত হয়। ডাইন উকর বহির্দেশ স্থিত (হাঁটুর সন্ধির ঠিক উপরিভাগে) পেশীতে কর্তনবৎ বা স্থলবিধানের শ্রায় বেদনা; এই বেদনা বসিয়া থাকিলেই কেবল অন্তর্ভূত হয়; অস্থির; মারিলে যেরূপ হয় উরু এবং পায় সেরূপ বেদনা; হাড়ের গায় গায় আগাগোড়া খোঁচানি এবং সন্ধিতে ছিড়িয়া ফেলার শ্রায় প্রবল বেদনা; বেদনা পায়ের পাতার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্ধি হইতে আরম্ভ হইয়া ক্রমে কুচ্ছিকর সন্ধি পর্যন্ত বিস্তৃত হয়, বাহ্যার দকণ রোগী পায়ের পাতা নানা ভাবে রাখিতে বা সঞ্চালন করিতে বাধ্য হয়; এই বেদনা চলিবার সময় অনেক কম অন্তর্ভূত হয়; পায়ের ডিমের পশ্চাভাগে চাপাযুক্ত বা ছিড়িয়া ফেলার শ্রায় বেদনা, চলিলে বা স্পর্শ করিলে বা সামান্য আঘাত লাগিলে বাহ্যার হ্রাস বা বৃদ্ধি হয় না; জ্বীলোস্কেব পায়ের প্রদাহযুক্ত শ্বেত-ক্ষীতি (Phlegmasia alba dolens) এবং তদ্রূপ পায়ের অত্যন্ত বেদনা, বাহ্যার দকণ রোগী তাহার পা কাহাকেও স্পর্শ করিতে দেয় না।

চর্ম্ম । স্পর্শনে বা সামান্য আঘাতে চর্ম্মে অত্যন্ত লাগে বা উহা বেদনায়ুক্ত হয়; সমুদয় শরীর লালবর্ণ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে নাড়ী দ্রুতগামী (আনন্-কার্ক); আবরু জরের শ্রায় সমুদয় শরীর নির্মল এবং লালবর্ণ (একন্); গায় আরম্ভ জরের শ্রায় ফুগুড়া (এপিস্, এরাম্, ষ্ট্রামন্); বিসর্প বা ইরিসিপেলাসের শ্রায় প্রদাহ (একন্, এপিস্, রাস্টক্); গাল এবং নাকে ফোঙ্কার শ্রায় ফুগুড়া বাহাতে শীঘ্র শীঘ্র পূর্ণ হইয়া থোদা (চুনটী) পড়ে।

নিদ্রা । ঘ্র্নের অত্যন্ত ইচ্ছা (নাক্স-বন্); রোগী ঘুমাইতে চাহে, কিন্তু ঘুমাইতে পারে না (ক্যাম্, ল্যাক্, ওপিয়াম্); ঘুমেরঘোরে বা ঘুম হওয়া হওয়া সময়ে শরীরে খাইলে যেরূপ হয়, সেরূপ চমকিয়া উঠা (আগারিকাশ্, আমন্-কার্ক, আস্, লাই, হারোস্, ষ্ট্রামন্, সাল্ক্); ঘুমেরঘোরে

অনবরত কৌষ্ঠানি বা কৌষ্ঠানি ; অচেতনতা বাহার কখন কখন ব্যাঘাত জন্মিয়া রোগীর আকৃতি ভয়ানক দৃষ্ট হয়; ঘুম ভাঙ্গিলেই শিরঃপীড়া বা অস্থতের বৃদ্ধি।

জ্বর। সন্ধ্যার সময় শীত বোধ, প্রধানতঃ বাহ্যতে, এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মাথার উষ্ণতাহ্রভব; হাত, পা ঠাণ্ডা; পায়ের পাতা বকের ছায় ঠাণ্ডা; মাথা গরম; শরীরের সন্ধ্যাপের অত্যন্ত বৃদ্ধি; মুখমণ্ডল লাল বর্ণ; নাড়ী দ্রুতগামী এবং ক্ষুদ্র; প্রলাপ; চক্ষু লালবর্ণ; বাহ্যিক এবং আভ্য-বিক আলাবৃত্ত উষ্ণতা এবং অস্থি-বতা, কেবল মাথায় ঘর্ষ; শরীরের আচ্ছা-দিত অংশে ঘর্ষ (ক্যামু); শরীরের উত্তাপের সঙ্গে সঙ্গে অথবা উহার পরই ঘর্ম, প্রধানতঃ বৃক্ষমণ্ডলে। শীতবোধ বাহ্য আচ্ছাদন উত্তাপেও দ্রবীভূত হয় না; গাণ কাপড় থাকে নহেও নড়া চড়াতে শীতের বৃদ্ধি হয়; আল্লিক-জ্বর বা অব-বিকার এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য বা রক্তা-বরোধের প্রবল লক্ষণ; আরক্ত-জ্বর এবং তন্দ্রকণ চর্ম নিখুঁত এবং উজ্জল লালবর্ণ হয়; শরীরের শুষ্ক উষ্ণতা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে শিবার ক্ষতি, গ্রীবার পক্ষনির দপ্পদপানি, উষ্ণতাহ্রভব, মুখ মণ্ডল লালবর্ণ এবং টল্টলে বা ক্ষতি, অসহ্য পিপাসা এবং তন্দ্রকণ সর্বদা গলা শুকাইয়া যাওয়া, মনের অত্যন্ত আন্দোলন, উগ্রপ্রলাপ এবং গায়ের কাপড় ফেলিলেই শীতকম্প; নাড়ী প্রবল এবং দ্রুতগামী, অথবা পূর্ণ এবং বৃদ্ধগতিবিশিষ্ট; অথবা ক্ষুদ্র এবং দ্রুতগামী, কঠিন এবং তারের ছায় পোদ।

ব্যবহার। ঠাণ্ডা লাগিয়া অস্থি; মস্তিষ্ক এবং উহার আবরক পর্দায় রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ এবং তন্দ্রকণ উহার প্রবল প্রদাহ এবং অস্থি অংশ বা বহু অস্থি বাহ্যতে মুখমণ্ডল লালবর্ণ এবং টল্টলে হয়, গ্রীবার পক্ষনির দপ্পদপ করে এবং নাড়ী গোলাকার হয়; নোহক-জ্বর (Typhus-Fever); সংন্যাসরোগ, উন্মত্ততা (Insanity), মদোন্মত্ততা (Delirium Tremens); মস্তিষ্কের শোথ (Hydrocephalus); স্নায়ুশূল; শ্বাতরোগ; ধূতুধিকার (Tetanus); দ্বিষ্টবিদ্যা; মূত্ররোগ এবং পিত্তাধিক্য বা সন্তানপ্রসব জনিত ধাক্কা (Puerperal Convulsions), জলাতঙ্ক (Hydrophobia); পক্ষাঘাত; তন্দ্রিকার দুই পক্ষাঘাত প্রতিপ্রদাহ

(Tonsillitis); আহারবহা গলনাশী এবং উহার উপরিভাগের প্রদাহ; চক্ষুর
যোজক ঝিল্লী, রেটিনা এবং আইরিসের প্রদাহ (Conjunctivitis,
Retinitis and Iritis); অন্ধতা; কর্ণপ্রদাহ (Otitis); মুখগহ্বর প্রদাহ,
জিহ্বাপ্রদাহ, মুখে পচায়ুক্ত ক্ষত, পাকস্থলীতে বেদনা, আমাশয়; উদরাময় ।
অণ্ডকোষপ্রদাহ বা একশিরা; স্ত্রীলোকের ডিম্বকোষ প্রদাহ (Ovaritis);
অস্থাবরক ঝিল্লীপ্রদাহ (Peritonitis); জরায়ু প্রদাহ (Metritis);
স্তনের প্রদাহ; কষ্টকর রক্তস্রাব এবং বাধকেব বেদনা; প্রচুর বা
অতিরিক্ত রক্তস্রাব (Menorrhagia); জরায়ু হইতে অতিরিক্ত
রক্তস্রাব (Metrorrhagia); প্রসবের পূর্বে তলপেটে বেদনা; সন্তান
প্রসবের পর কুল নির্গত না হওয়া এবং ক্লেদ (Lochia) নিঃসরণ বন্ধ হওয়া,
অথবা পারের সাদা স্ফীতি (Milk-leg); সন্ধি; কণ্ঠনাশী প্রদাহ; হাঁপানি
কাশি; হৃপিং কফ বা কাশি; আরক্ত-জ্বর; হান-জ্বর; বিসর্প বা ইরিসি-
পেলাস; ব্রণ; ক্ষত; প্রদাহ এবং গ্রন্থির কঠিনতা; চক্ষুপ্রদাহ; হিকা
(আক্ষেপিক); নাক দিয়া রক্ত পড়া; দূষিত বায়ুজনিত এবং আক্ষেপিক
শূলবেদনা; তনে অতিবিভক্ত ঢক হওয়া হেতু উহার বিন্যাসেরন্যায় (Erysip-
elatus) প্রদাহ এবং স্ফীতি; নবপ্রসূত শিশুর চক্ষুপ্রদাহ, (Ophthalmia
Neonatorum) এবং আক্ষেপ; দুগ্ধস্রাব প্রদাহ; রক্তাধিক্য হেতু শিরঃপীড়া;
হিষ্টিরিয়া রোগ জনিত হাঁপানি; রক্তোৎকাশ; কর্ণমূল গ্রন্থি প্রদাহ এবং
ঠাণ্ডা লাগিয়া কানে কন শুনা ইত্যাদি অসুখে বেলাডোনা ব্যবহার্য্য ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । বেদনা যন্ত্রণাদি হঠাৎ হয় এবং
হঠাৎ যায়; সমুদয় যন্ত্রণা অতিরিক্ত চেতনা; সাক্ষাতে বেদনা বাহ্য এক সন্ধি
হইতে অল্প সন্ধিতে হঠাৎ সরিয়া পড়ে; সামান্য স্পর্শনে বা আলোক
দেখিলে আক্ষেপের উত্তেক বা পুনরাক্রমণ; সমুদয় শরীর শক্ত হয় বা উহা
নোয়ান যায় না; রাত্রিতে বা অপরাক্তে যন্ত্রণাদির উদ্ভি; কখন কখন
সামান্ত আঘাত বা ধাক্কা লাগিলে, গোলমাল বা আলোকে যন্ত্রণাদির বৃদ্ধি;
উষ্ণ ঘরে এবং গায় কাপড়াদি থাকিলে যন্ত্রণাদির উপশম; ঘুমেরবোধে
হঠাৎ চমকিয়া উঠা; রক্তাধিক্য ধাতু; স্বেদবস্ত্রের সর্জদা হাসিখুসি, কিন্তু
অসুখ হইলেই অত্যন্ত উগ্র মূর্তি ধারণ করা; মুখগহ্বর এবং গলার মধ্যে

যেন সর্বদা শুকাইয়া যায়, অপরাহ্ন ৩ টার পর এবং পুনরায় রাত্রি দুই প্রহরের পর, নড়াচড়াতে, স্পর্শনে, হঠাৎ ঠাণ্ডা প্রবল বাতাস লাগিলে, বহির্বায়ুর উষ্ণাবস্থা হঠাৎ ঠাণ্ডা হইলে, গরমে, স্থায়ের উত্তাপে, জলাদি পান করাকালীন অস্থখের বৃদ্ধি, এবং উষ্ণত্বের, কাপড়াদি দিয়া শরীর ঢাকিল্প রাখিলে অস্থখের উপশম ইত্যাদি বেলাডোনার কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ। যে প্রকারের অস্থখে মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য শুকাইয়া যায় রোগী একরূপ অস্থভব করে, সে প্রকার অস্থখেই বেলাডোনা সেবনে উপকার দর্শে লেখক রোগ চিকিৎসায় একরূপ পৰীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। অতএব বেলাডোনা সেবনের ব্যবস্থা কালীন যেন পার্থক্য এই লক্ষণটীর উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখেন। মুখগহ্বর এবং গলার মধ্যে শুষ্কত্বের সঙ্গে সঙ্গে যদি প্রবল পিপাসা কিম্বা গলার মধ্যে বেদনা বা টাটানি বর্তমান থাকে তবে বেলাডোনা আরো উপকারী।

সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ। নতিদের উপর কার্য দ্বিতে গেলে বেলাডোনার কার্যের সঙ্গে হায়োসায়েরমাস্ এবং ট্র্যানেনিয়ামের কার্যের অনেক সাদৃশ্য আছে। এতদ্বিন্ন একোনাট্ট, চায়না, ওপিয়াম, আনি-নিক্, মাকিউরিনাস্, কোলোয়াম, সিাপদা ইত্যাদি ঔষধের কার্যের সঙ্গেও কোন কোন বিষয়ে বেলাডোনার সাদৃশ্য আছে।

প্রতিষেধক ঔষধ। ক্যাম্ফার, কাকিয়া, হায়োসায়েরমাস্, ওপিয়াম্ ইত্যাদি বেলাডোনার প্রতিষেধক ঔষধ মধ্যে পরিগণিত। আদিক নাত্রায় বেলাডোনা দ্বারা বিষাক্ত হইলে বমন উৎপাদক জ্বা বা ঔষধ, কাকির গাঢ় কাত, ওপিয়াম, হায়োসায়েরমাস্ ব্যবস্থা।

ডাইলুশন্ বিচার। ১, ৩, ৫, ১০, ৩০ ডাইলুশন্ই সচরাচর ব্যব-
হৃত হইয়া থাকে। রক্তাদিক্য হেতু শিরঃপীড়াতে ১, ৩, ৬ দশমিক্ ডাইলুশন্
বিশেষ উপকারী। সামান্য একজ্বরের নাস্তকে রক্তাদিক্য বা রক্তাবরোধ
হইয়া উগ্রপ্রলাপাদি হইলেও উক্তাতন ডাইলুশন্ই উপকারী। সখিরাম-
জ্বর, স্বল্প বিসাম-জ্বর বা অসংবিকারে নাড়ী ক্ষুদ্র, দ্রুতগামী এবং অচেতনতা
বা প্রলাপ থাকিলে ১২ এবং ৩০ ডাইলুশন্ বিশেষ উপকারী। জরায়ু প্রদাহ
অস্থবেষ্টিকরী প্রদাহ (Peritoniti-) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মূত্রাধার প্রদাহ,

(Nystitis) ইরিসিপেলাস, হাম জ্বর ইত্যাদিতে ১, ৩ এবং ৬ দশমিক ডাইলুশন্ বিশেষ উপকারী। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য অস্থলে ৩, ৬, ১২, ৩০ ডাইলুশন সচরাচর ব্যবহার্য। রক্তাধিক্য হেতু পুরাতন আকারের শিরঃপীড়ায় এককটি রোগীর চিকিৎসায় ১০০ এবং ২০০ ডাইলুশন ব্যবস্থা করিয়া বিশেষ ফল পাওয়া গিয়াছে। এই ঔষধের উল্লিখিত সকল ডাইলুশনই উপকারী চিকিৎসায় ফল দেখিয়া লেখক একরূপ বিশ্বাস করেন। শরীরের কোন কোন অংশ প্রদাহযুক্ত হইয়া আক্রান্ত স্থান যদি স্ফীত এবং লাল বর্ণ হয় ও টাটায়, তবে বেলাডোনার আভ্যন্তরিক প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে ইহার মূল আরোকের পাঁচ ফোঁটা দুই কাঁচা জলে মিশাইয়া উহাতে একখানি সূতার কাপড়ের নেকড় ভিজাইয়া আক্রান্ত স্থানে লাগাইয়া রাখিলে বেদনা এবং টাটানির অনেক হ্রাস হইতে দেখা যায়। রোগী যদি অত্যন্ত দুর্বল হয় এবং তাহার শরীরে রক্ত কম থাকে, তবে বেলাডোনার বাহ্য প্রয়োগ করা উচিত নহে; কারণ, দুর্বলাবস্থায় বেলাডোনা শরীরে প্রবেশ করিয়া রক্তের সঙ্গে মিশিয়া শরীরে শোষিলে বেলাডোনা দ্বারা বিষাক্ত হওয়ার দরুণ মস্তিষ্কের বিকৃতির লক্ষণাদি প্রকাশ পাওয়া অসম্ভব নহে। একরূপ ঘটনা লেখক স্বয়ং ৩৮টি দেখিয়াছেন।

ব্রাইওনিয়া আল্‌বা, - ব্রাই-আল্‌ব্

(BRYONIA ALBA, —BRY.-ALB.)

ব্রাইওনিয়া দুই প্রকার, — ব্রাইওনিয়া আল্‌বা বা স্বেত ব্রাইওনিয়া এবং ব্রাইওনিয়া ডায়োইকা। হোমিওপ্যাথিক মতে বোগ চিকিৎসায় ব্রাইওনিয়া আল্‌বাই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অতএব উহার বিবরণই এস্থলে লিখিত হইল। জার্মেনি এবং ফ্রান্স্ দেশে এই গাছ জন্মে। কাঁচা মূল শিকড় দিয়া যথা নিয়মে প্রক্‌স্পিরিটে ইহার মূল অরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া। মাস্তক ঝিল্লী (Serous membranes) এবং উহা যে সকল আভ্যন্তরিক বস্ত্র আবরণ করিয়া থাকে, — যথা কৃষ্ণ সাবরক ঝিল্লী

(Pleura) এবং ফুফুস, তৎপর মস্তিষ্ক এবং অবশেষে নকুং ইত্যাদির উপরই ব্রাইওনিয়ার কার্য অতি প্রবল। সাইনোবিয়াল্ ফিল্মী (Synovial membranes) (অর্থাৎ যে সকল খলিয়ার ভ্রায় ফিল্মী সন্ধি গুলি পরিবেষ্টন করিয়া থাকে) এবং শ্বাস যন্ত্র এবং আহার বহা নালীর স্নায়িক ফিল্মীর উপরও ব্রাইওনিয়ার কার্য অত্যন্ত প্রবল। ইহাতে উক্ত যন্ত্রাদির তরুণ প্রদাহ উৎপন্ন হয় না বটে, কিন্তু উক্ত যন্ত্রের এমনতর অবস্থা উৎপন্ন হয় যে প্রকার অবস্থায় প্রদাহ কতক পরিমাণে পুরাতন (Sub-acute) হইয়া আক্রান্ত স্থানে দ্বিতীয় জনীয় পদার্থের সঞ্চার হওয়ার উপক্রম হয়। এই প্রকার অবস্থায় প্রদাহ এবং স্নায়বিক উত্তেজনার মধ্যবর্তী আকারের লক্ষণগুলি প্রকাশ পাইয়া থাকে। সাইনোবিয়াল্ ফিল্মী এবং পেশীর আংশিক অংশ আক্রান্ত হইলে প্রদাহ অপেক্ষাকৃত অধিক পুরাতন আকার ধারণ কবিয়া পেশী বা সন্ধিবাতের আকার ধারণ করে। শবীরের যে প্রকার অংশই আক্রমণ ককক না কেন, উক্ত প্রকার প্রদাহই ব্রাইওনিয়ার দ্বারা উৎপন্ন হইয়া থাকে। স্ত্রীবিধানের ভ্রায় বেদনা এবং নড়াচড়াতে অস্থিরতা বৃদ্ধি, ব্রাইওনিয়া ব্যবহারের একটি বিশেষ প্রাকৃতিক চিহ্ন মধ্যে পরিগণিত।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মন। সর্দীনা বিমর্ষ ভাব এবং খিটখিট করা (আগারিকাশ, এইলেছ, বোরাক্স, ক্যাম, নাক্স বন্); অনর্থক চিন্তা, ভয়, ভয় থাওয়া এবং বৈরক্রির স্বভাব (একন্); অত্যন্ত চটা স্বভাব এবং সহজে রাগ করা (অরাম, চাবনা, ক্যাম, হিপ্-মাল্ফ, ক্যালী-কার্প, নাক্স বন্, ইয়েন্স); অত্যন্ত উদ্বেগ; মানসিক অবসন্নতা এবং ভয় (অরাম, আস, নেট্রাম্ মিউন, নাক্স মন্, পাল্ন্); আপন কার্য বিষয়ে প্রলাপ, রাগিতে বাহার বৃদ্ধি হয়; বিছানায় শয়ন করিয়া থাকিলে ওরাগী (স্ট্রীলোক হইলে) মনে করে যেন সে বিছানা সমেত নিম্নদিকে গভীর গর্তের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে; ভয় এবং তন্দ্রার দোঁড়িয়া পলায়ন করার চেষ্টা; সর্দীনা ক্রন্দন; রোগী যদি কোন দ্রব্য চাহে তাহাকে উহা দিলে সে লয় না।

মন্তক । মাথায় গোলমেলে বোধ ; রাত্রিতে মদ্যাদি পানের দরুণ মাথায় গোলমেলে বোধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে শিরঃপীড়া, বাহার দরুণ রোগী বিছানা হইতে উঠিতে চাহে না (নাক্স-বম্) ; প্রাতঃকালে জাগিলেই মাথা ধরে ; ঘুমের পূর্বে মাথায় গোলমেলে বোধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মাথার পশ্চাভাগে কদিয়া ধরার ভায়া বেদনা যাহা গ্রীবা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় ; মাথাঘোরা বাহার দরুণ মনে হয় যেন নিকটবর্তী বস্তুগুলি টলিতেছে, মস্তিষ্ক যেন চারিদিকে ঘুরিতেছে অথবা মাথা যেন চক্রাকারে চতুর্দিকে ঘুরিতেছে (বেল্, কোনারাম্, নাক্স-বম্) বাহার দরুণ রোগী পশ্চাদ্ধিকে টলিয়া পড়ে ; বসি অবস্থা হইতে দাঁড়াইলে মাথাঘোরা, (সাল্ফ্) ; বিছানা হইতে উঠিলে মাথাঘোরা (কন্, রাস্টক্) ; বিছানায় সোজা হইয়া বসিলে মাথাঘোরা ; মাথা খাড়া করিলেই মাথাঘোরা (একন্, চায়না) ; প্রাতঃকালে ঘুম ভাঙ্গিয়া চক্ষু মেলিলেই মাথাধরা, মাথায় ভারিবোধ এবং মস্তিষ্কের সম্মুখদিকে চাপাবোধ ; মাথায় চাপাবোধ বাহার দরুণ মনে হয় যেন মস্তিষ্ক অত্যন্ত পূর্ণ এবং বহির্দিকে ঠেলিয়া পড়িতে চাহে (একন্, চায়না, নেট্রাম্-মিউর, মার্ক্) ; শিরঃপীড়া বাহার দরুণ মনে হয় যেন মাথার মধ্যস্থ ও সমুদয় পদার্থই কপাল দিয়া ঠেলিয়া বাহির হইবে (একন্, অস্‌ফিটিক্) এবং মাথা ছোট করিলে বাহার বৃদ্ধি হয় ; বামচক্ষুর উপরে চাপপড়ার ভায়া বেদনা এবং তৎপর মাথার পশ্চাভাগে চাপাবৃত্ত বেদনা ; এই বেদনা উক্ত স্থান হইতে সমুদয় শরীরে বিস্তৃত হয় এবং তাড়াতাড়ি চলিবার পর এবং আহারের পর এত প্রবল হয় যে উহার দরুণ যেন মাথার দপ-দপানি স্পষ্ট অজুত হয় ; কানের পশ্চাদ্ধিকে কদিয়া ধরার ন্যায় সামান্য বেদনা যাহা গালের হাড় পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় ; প্রাতে ঘুম ভাঙ্গিলেই মাথার ঠিক উপরিভাগে দপ-দপানি বেদনা (নেট্রাম্, অস্, গ্লোনয়েন্, ষ্ট্রোমন্) ; কাশিলে মস্তিষ্কের বামপার্শ্বে ক্রমাগত স্ফীতি বিধানের ভায়া বাতনা অজুত হয় (কার্কো-বেজ্) ; মাথার পশ্চাভাগে চাপিয়া ধরার ভায়া বেদনা বা যাতনা, যাহা গ্রীবা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় এবং বেলা দুইপ্রহরের সময় বাহার উপশম হয় ; প্রবল শিরঃপীড়া বাহার দরুণ মনে হয় যেন মাথা ফাটিয়া যাইবে (আমন-কার্ক্, ক্যাপ্স্, চায়না, মার্ক্, নেট্রাম্-মিউর, পাল্) ; কাপড় ইস্তিরি করার

সময় বা মুখমণ্ডল ঘামিবার পর উহা ঠাণ্ডা জল দিয়া ধোয়াইলে শিরঃশীতা ; চলিলে, মাথা হেট করিয়া উপুড় হইলে বা চক্ষু মেলিলে শিরঃশীতার বৃদ্ধি এবং চাপিলে উহার উপশম হয় ; কেবল মাথা উষ্ণ এবং মুখমণ্ডল কাল্চে লালবর্ণ ও শরীরের অন্যান্য অংশ ঠাণ্ডা ; প্রাতঃকালে ঘুম ভাঙ্গিলেই মাথা ধরে ।

চক্ষু । ডাইন চক্ষে অত্যন্ত জ্বালাবোধ এবং চক্ষুদিয়া জল পড়া (আর্ম) ; ডাইন চক্ষের উপরের পাতার টল্‌টলে ক্ষীতি (এপিস্, ক্যালীকার্ণ) ; বাম চক্ষের গোলকে অত্যন্ত টাটানি এবং চাপায়ুক্ত বেদনা (এই বেদনা বারম্বার হয় এবং বারম্বার যায়) ; চক্ষুর গোলক সঞ্চালন করিলেই এই বেদনা অধিক হয় (ফাইস্ট্, স্পাইজেন্) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় যেন চক্ষু স্বাভাবিক অপেক্ষা ছোট হইয়াছে ; চক্ষু উহার কোটিরের মধ্য দিকে আবৃত্ত ।

কর্ণ । কর্ণে সৌ সৌ শব্দ হয় ।

নাসিকা । নাসিকা ক্ষাত এবং স্পর্শ করিলে উহাতে অত্যন্ত বেদনা এবং টাটানি (আলাম্, নাক্) ; নাকদিয়া রক্ত পড়া (স্ট্রীলোকের রক্তঃস্রাবের সময় যোনিদ্বার দিয়া রক্তস্রাব না হইয়া নাক দিয়া রক্ত পড়িলে (Vicarious Menstruation) (একন্, বেল্) বিশেষতঃ প্রাতঃকালে ঘুম হইতে উঠিলে (আগারিকান্, আয়ু, কাক্-কার্ক, চায়না) ; নাসারন্ধ্রের প্রবাহ এবং ক্ষত ; নাসারন্ধ্র শুক এবং রক্ত ; নাকে শুকনা সন্ধি যাহা অনেক সময় সহজে আবাস হয় না ।

মুখমণ্ডল । মুখমণ্ডল উষ্ণ, লালবর্ণ, কোমল, শোথের স্থায় টল্‌টলে এবং উহাতে জ্বালা ; মুখমণ্ডল শিটা বা কিকা, হরিদ্রাবর্ণ বা নেটে-রঙ্গ বিশিষ্ট ; ডাইন মাড়ি সঞ্চালনের সহায়কারী সন্ধির কোটবে টাটানি এবং চাপা বোধ, সঞ্চালনে যাহার বৃদ্ধি হয় ; উপরের ওষ্ঠ এবং নাক ক্ষীত, লালবর্ণ এবং উষ্ণ (বেল্, নাক্) ; ওষ্ঠ শুষ্ক, উষ্ণ, ক্ষীত এবং ফটায়ুক্ত বাহ্য চাপিলে রক্ত পড়ে এবং জ্বালা করে ।

মুখগহ্বর এবং গলার অধ্য । মুখগহ্বর, ওষ্ঠ এবং জিহ্বা অত্যন্ত শুষ্ক (একন্, আর্স, হারোস্, ক্যালী নাইট্রিক, নাস্ম-মক্) ; জিহ্বার অগ্রভাগ আর্দ্র (মাক্) ; খাণ্ডার সময় দাঁতে ঘাটিনা ধরা বা ছিঁড়িয়া কেলার

জ্বর বেদনা বা যাতনা বাহা গ্রীবার পেশী পর্যন্ত বিস্তৃত হয় এবং উত্তাপে বৃদ্ধি হয়; ঠাণ্ডা জলে দাঁতেব বেদনার উপশম (বিস্‌মাক্‌, কফিরা, ক্রিমেটিন্‌) এবং কোন প্রকার গরম দ্রব্য মুখে দিলে বেদনার বৃদ্ধি (ক্যাক্‌-কার্ক্‌, মার্ক্‌, আল্‌স্‌); আক্রান্ত পার্শ্ব শয়ন করিলে বেদনা থাকে না এবং স্নুত পার্শ্বে শয়ন করিলে বেদনার বৃদ্ধি হয়; দাঁতে চিড়িকমাবার ছাব দপ্পদপিয়া বেদনা; হামাক্‌ খাওয়ার সময় দাঁতে দপ্পদপিয়া বেদনা (ইগ্নেস্‌); জিহ্বা সাধা গাঢ়নেপমুক্ত (আষ্টি-ক্লড্‌, মার্ক্‌); মুখে কোন স্বাদ থাকে না বা মিষ্ট স্বাদ (মার্ক্‌) বা অত্যন্ত তিক্ত স্বাদ (আস্‌, কলেস্‌, চায়না, নাক্স্‌ বম্‌, পাল্‌স্‌, সান্‌ক্‌); বাতস্রাব ঠাণ্ডা জল পাইলে মুখের তিক্তস্বাদ এবং বমনের ইচ্ছা কমে; মুখা অত্যন্ত শুষ্কবোধ এবং একবারে অধিক পরিমাণ শীতল জলপানের ইচ্ছা। গলার মধ্যে অত্যন্ত শুষ্ক বোধ (ব্যান্ট্‌, বেল্‌); গিলিবার সময় গলার মধ্যে সৃষ্টিবিধানের ছায় বেদনা (ক্যাক্‌-কার্ক্‌, বেল্‌); গলার মধ্যে পশ্চাৎভাগ ক্ষীত হওয়ার ছায় অনুভূত হয় (সিনা)।

পাকস্থলী এবং উদর । অতিরিক্ত জুগা (ফেরাম্‌, অ্যাসোডিন্‌, লাইকোপ্‌); কোন দ্রব্য পাঠতে ইচ্ছা হইলে উহা রোগী তৎক্ষণাৎ পাইতে চাহে, কিন্তু উহা দিলে সে লয় না (ক্যান্‌, রডোডেণ্‌); অত্যন্ত পিপাসা (বেল্‌, রাস্টক্‌) এবং অধিক পরিমাণ জলপানের ইচ্ছা (পডোজ্‌); অত্যন্ত পিপাসা এবং মদ্যপানের ইচ্ছা (চায়না); আহারের পর দিকা (হাবোস্‌, ইগ্নেস্‌); আহারের পর তিক্ত স্বাদবিশিষ্ট উদগার বা গলা দিয়া জল উঠা (চায়না, নাক্স্‌ বম্‌); সামান্য নড়াচড়াতেই বমন বা বমনোদ্বগ : পাকস্থলী পূর্ণ এবং চাপনে বেদনানুক্ত হয় (আস্‌, বেল্‌); একপানি পাথর থাকিলে যেক্রপ হব, আহারের পর পাকস্থলীতে সেক্রপ চাপ বোধ (একন্‌ ইফুলাস্‌, আস্‌, নাক্স্‌ বম্‌, পাল্‌স্‌), বাহার দকণ বোগী সর্দদা খুট্‌খিট্‌ করে; স্পর্শন এবং চাপনে উদ্রবোদ্ধ প্রদেশে (Epigastric Region) বেদনা (আস্‌, আষ্টি-ক্লড্‌, বেল্‌, লাইকোপ্‌); কাশিবার সময় পাকস্থলীর মধ্যে টাটানি; কঠি উদগার; প্রত্যেকবার আহারের পর উদরস্থ আহার দ্রব্যাদি বমন; জলপানের পর, বিশেষতঃ আহারের পর, জলপান করিলে ডাইন

পার্শ্বেব কৃত্রিম পাঁজরার নিম্নভাগে কসিয়া ধরার ত্রায় বেদনা অথবা স্ত্রী-
বিধানের ত্রায় ক্ষণিক বেদনা, নিখাস টানিতে বাহ্য অধিক বেদনায়ুক্ত
হয় বা টাটায় (একন্, চেলিডন্, চায়না, মার্ক); উদর স্ফীত এবং উহাতে
শূলবেদনার ত্রায় বেদনা (আলোজ্, কলোস্, লাইকোপ্); গুহদ্বার দিয়া
ভ্রূগন্ধযুক্ত দূষিত বায়ু নিঃসরণ (আলোজ্); উদর অত্যন্ত বেদনায়ুক্ত হয় এবং
টাটায় (এপিস্, বেল্); উদরে অত্যন্ত বেদনা বাহার দরুণমানে হয় যেন
উদরাময় হইতে; উদরে কামড়ানের ত্রায়, চিম্টি কাটার ত্রায়, কষ্টদায়ক
কর্জনবৎ বা খনন করার ত্রায় বেদনা, উদরাময়ের পর বাহার উপশম
হয় (কলোস্); উদরের শোথের ত্রায় স্ফীতি, উদরে গড়্ গড়্ কলকল
শব্দ এবং গুহদ্বার দিয়া ভ্রূগন্ধযুক্ত বায়ু নিঃসরণ; বক্রত প্রদেশে কসিয়া
ধরার ত্রায় বা জ্ঞানায়ুক্ত বেদনা এবং উহার স্ফীতি ও টাটানি; বক্রতে
স্ত্রীবিধানের ত্রায় বেদনা, চাপিলে, কাশিলে অথবা শ্বাস প্রশ্বাসে বাহার
বৃদ্ধি হয়।

মল এবং মলদ্বার । মলত্যাগের পূর্বে গুহ দ্বারে জ্বালা (আস্,
কায়্); মল ভ্রূগন্ধযুক্ত এবং জ্বালা উৎপাদক বা উগ্র; অত্যন্ত কোষ্ঠ
বদ্ধ, মল কঠিন, মোটা, লগ্ন এবং শুষ্ক (ক্যাক্-কার্ক্) পোড়ামাটির
তায় কঠিন (মাল্ফ্) দাড়া অতি কষ্টে নির্গত হয় (ইস্কলাস্); উদরাময়
এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পেটকামড়ানী।

মূত্র যন্ত্র । মূত্র কাল্চে (আস্, আন্টি-টার্ট্) প্রায় কটা বর্ণের
জ্বা (কষ্ট্), বিসাব (Beer) নামক মদ্যের ত্রায় (কলোস্), পরিমাণে
অল্প এবং কাল্চে (একন্)।

জননেন্দ্রিয় । দীর্ঘ নিখাসে স্ত্রীলোকেব ডিম্বকোষে স্ত্রী বিধানের
ত্রায় বেদনা; নিবাসিত সময়ের অনেক পূর্বে অতিদীর্ঘ রজঃস্রাব (আস্,
ক্যাক্-কার্ক্, নাক্স-বম্); রজঃস্রাব এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে নাক দিয়া
রক্ত পড় (Vicarious Menstruation) (হ্যানুয়েলিস্, পাল্, সিপিয়া);
স্তন স্ফীত, লালবর্ণ এবং উহাতে অত্যন্ত টাটানি বা বেদনা, মড়াচড়া এবং
দীর্ঘ নিখাসে দাহার বৃদ্ধি হয়; স্তনে ভ্রূ একবারেই থাকে না বা অল্প
পরিমাণ থাকে।

শ্বাস যন্ত্র । বায়ুনলের মধ্যে কঠিন শ্লেষ্মার সঞ্চার (নাক্স বন্) ; বারবার কাশিলে বা গলা থেকে দিলেই যাওয়া কেবল তরল বা আল্‌গা হয় (ক্যালী-বাই) ; ঠাণ্ডা বাতাস হইতে উষ্ণ ঘরে প্রবেশ করিলেই কাশির উদ্রেক (নেটাম্-কার্ক, বিবেট্-আল্‌ব্) ; স্বভঙ্গ বা স্বর মৃদু এবং কর্কশ (কার্কো-বেজ্, ফ্‌স্, স্পঞ্জ্) ; হক্ হক্ করিয়া শুষ্ক কাশি, বায়ুনলের উপরি-ভাগ হইতে যাওয়ার উদ্রেক হয় ; শুষ্ক কাশি এবং তদ্রূপ মনে হয় যেন পাক-স্থনী হইতে কাশি উঠে (সিপিয়া) ; কাশির সঙ্গে সঙ্গে বক্ষস্থির (Sternum) নীচে ষাটটা ধরার জ্বার বেদনা ; শ্বাসের মধ্যে উপরের দিকে অনবরত হামা-দিয়া হুড্ হুড্ করিয়া বাতাসের জ্বার অল্পভূত হওয়ায় দরুণ কাশি এবং তৎ-পৰ শ্লেষ্মা নির্গমন ; বুকে আঁটা বোধ বাতাস দরুণ বোগী শ্বাস প্রশ্বাস বিলম্বে বিলম্বে ফেলিতে বাধা হয়, কিন্তু শ্বাস প্রশ্বাস বিলম্বে বিলম্বে ফেলিলে আবাব বুকে বেদনার উদ্রেক হয় ; বুকের মধ্যে স্থচীবিধানের জ্বার প্রবল বেদনা (একন্, কালী-কার্ক, ফ্‌স্, পাল্‌স্), বাতাস দরুণ রোগী নড়িতে বা দীর্ঘ নিশ্বাস টানিতে অত্যন্ত কষ্ট অনুভব করে (বোরাক্স, বেল্, সিমিসিফ্, মার্ক্, ফ্‌স্, সাল্‌ফ্) ; বক্ষস্থির নীচে ভারিবোধ যাওয়া ডাইন স্বল্প পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় এবং বাতাস দরুণ শ্বাস প্রশ্বাসের ব্যাঘাত জন্মে ; দীর্ঘ নিশ্বাস অত্যন্ত কষ্টকর ; বুকের ডাইন পার্শ্বে কষ্টানুভব এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে ডাইন বগলের প্রতিতে স্থচীবিধানের জ্বার বাতনা ; স্বভঙ্গ, ঠাণ্ডা বাতাসে বাতাস উৎপন্ন বা বৃদ্ধি হয় ; আত্ম বা পানের পৰ কাশির বৃদ্ধি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে উদরস্থ আহার দ্রব্যাদি বমন : কাশি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বুকে স্থচীবিধানের জ্বার বেদনা বা বাতনা ও গলা দিয়া চট্‌চট্‌য়া আঁঠা মরিচার রঙ্গের শ্লেষ্মা নির্গমন (Rusty sputa) ; বিকারের লক্ষণাক্রান্ত ফুফুস্ প্রদাহ (Typhoid Pneumonia) ।

হৃৎপিণ্ড । হৃৎপ্রদেশে চাপিয়া ধরার ন্যায় বেদনা ; হৃৎপিণ্ড প্রবলবেগে এবং অত্যন্ত শব্দ করিয়া দপ্ দপ্ করে ; নাড়ি পূর্ণ, কঠিন এবং দ্রুতগামী (একন্) ।

গ্রীবা এবং পৃষ্ঠ দেশ । ঠাণ্ডা লাগিলে দেকপ হয় ঘাড়ে দেকপ বেদনা ; গ্রীবার ডাইন পার্শ্বের পেশীতে কসিয়া ধরার জ্বার বেদনা

যাহার দরুণ গ্রীবা শক্ত হয় বা উহা নোয়ান যায় না; পৃষ্ঠদেশ হইতে বুকের
মধ্য দিয়া খোঁচা বিধার জ্বায়ে বেদনা; কোমরের পশ্চাৎ ভাগে বেদনা;
এই বেদনার দরুণ রোগী চলিতে বা ফিরিতে অত্যন্ত কষ্ট অনুভব করে;
কোমর চাপিয়া শয়ন করিয়া থাকিলে কোমরে খেঁৎলিয়া যাওয়া বা
মোচ্ড়াইয়া পড়ার জ্বায়ে অত্যন্ত কষ্টকর বেদনা বা যাতনা (আগিকা,
আস্)।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, হাত, পা ইত্যাদি। সমুদয় অঙ্গেই ক্রান্তি, ভাবি
এবং দরুণবেদন এবং উহা শক্ত হয় বা নোয়ান যায় না; আক্রান্ত সন্ধি লাল
বর্ণ এবং ক্ষীণ (সিমিসিফ, পাল্‌স্) এবং উহা শক্ত হয় বা নোয়ান যায় না ও
সামান্য নড়াচড়াতেই উহাতে সচী বিধানের জ্বায়ে বেদনা; প্রায় সমুদয় অঙ্গ
এবং সন্ধিতেই কসিয়া ধবার জ্বায়ে ক্ষণস্থায়ী বেদনা; নড়াচড়া বা স্পর্শনে
সন্ধিতে স্তম্ভবিধানের জ্বায়ে বেদনা। বিশ্রাম কালীন বা স্থিতি ও নিশ্চলভাবে
থাকিলে ডাইন রুদ্রে কসিয়া বা চাপিয়া ধবার জ্বায়ে বেদনা; ডাইন কুণ্ডলিবেদ
সন্ধিব ক্ষীণিতি এবং উহাতে স্তম্ভবিধানের জ্বায়ে বেদনা; কুণ্ডলি হইতে মনিবন্ধ
পর্যন্ত হাতের এক বাটন ধরসা ছিড়িয়া ফেলার জ্বায়ে বেদনা; মোচ্ড়াইয়া
পড়িলে বা খেঁৎলিয়া গেলে যেকপ হয়, সঞ্চালনে মনিবন্ধে সেরূপ বেদনা
(একন্, ক্যান্-কার্প্, ইউপেট্-পার্ক্, দাস্টক্); আঙ্গুলের সন্ধি ক্ষীণিতি
এবং উহাতে বাটিয়া ধরার ন্যায় বেদনা (কল্‌চ্), শারীরিক পরিশ্রম
এবং স্পর্শনে যাহার দরুণ হয়। পা এত দরুণ এবং শক্তিহীন হয় যে উহা
দরুণ রোগী দাঁড়াইতে পারে না; কৃচ্‌কীতে স্তম্ভবিধানের ন্যায় বেদনা;
কৃচ্‌কীর সময়ে স্তম্ভবিধানের ন্যায় বেদনা যাহা ঠাঁটুর সন্ধি পর্যন্ত
বিস্তৃত হয়; উক্‌কে অত্যন্ত ক্রান্তিবেদন, নাচের বর হইতে সিঁড়ি ভাঙ্গরা
উপরের যাব উত্তীর্ণ হইবার সময় যাহার দরুণ হয়, ঠাঁটুর সন্ধিতে কসিয়া ধরার
ন্যায় প্রবল বেদনা এবং যাহা অত্যন্ত শক্ত হয় বা নোয়ান যায় না; ঠাঁটুর
সন্ধিতে স্তম্ভবিধানের ন্যায় বেদনা; পায়ের ডিনে (পোডাং) চিমটি
কাটা, ছিঁড়িয়া ফেলা, খেঁৎলিয়া যাওয়া বা মোচ্ড়াইয়া পড়ার জ্বায়ে বেদনা
বা যাতনা, চাটবার সময় পায়ের পাতার সন্ধিতে কসিয়া ধরা; পায়ের পাতা
উক্‌ এবং ক্রান্তি, বিস্তৃত কবীর সময় পায়ের পাতার সন্ধির মধ্যস্থ দিকে

মোটভাইয়া পড়ার স্থায় বেদনা (আস্‌, পাল্‌স্‌) ; পাঞ্জের পাতায় খেঁচ-
লিয়া যাওয়া বা স্থচীবিধানের স্থায় বেদনা ।

চর্ম্ম । সমুদয় শরীর (মুখমণ্ডলও) হরিদ্রাবর্ণ ; গালের মেলার নামক
জ্বহির (Malar bone) উপরস্থিত স্থান লালবর্ণ এবং উষ্ণ ; সমুদয় শরীরে
লাল ফুসুড়া (ফ্লেণ্‌, রাস্‌টম্‌) ; স্ফোটক জ্বরের (Eruptive Fevers) ফুসুড়ী
বিকাশ-প্রাপ্ত হইতে গোণ হয় অথবা ফুসুড়ী একবার বাহির হইয়া হঠাৎ
বন্দিয়া যায়, যাচার দক্ষণ স্বাস মন্ত্র বা মস্তিস্কের আবরক পর্দার অস্থখ বা
উহার শোথও হইতে পারে (জেল্‌স্‌, ছেলিবোরাস্‌) ; বিসর্প বা ইরিসিপেলাস্‌,
বিশেষতঃ সন্ধির, প্রস্থতী বা নবপ্রসূত শিশুর গায় লালচে ফুসুড়ী ।

নিদ্রা । সমুদয়দিবসই বারম্বার হাঁটবোলা ; দিনের বেলা নিদ্রা-
বল্য বা নিদ্রার ভাব (আর্টি-টার্টি, এপিস্‌, মার্ক্‌, নাক্স্‌, মক্স্‌, নাক্স্‌, বম্‌,
ফস্‌, সিগিয়া) ; নিদ্রাশূন্যতা অথবা ঘুম হইলেও মধ্যে মধ্যে ঘুম ভাঙ্গিয়া
যায় ; স্পষ্ট-ভাবনাক স্বপ্ন দেখা (আপিকা, অরাম্‌, বেল্‌) ; আপনার কাজ
কর্ম্ম বা পারিবারিক বিষয়ে স্বপ্ন দেখা ; ঘুম হওয়া হওয়া সময়ে ভয় বাইয়া
চমকিয়া উঠা (অপোপিকাস্‌, আস্‌, বেল্‌, হারোস্‌, থ্রামোনিরাম্‌) ।

জ্বর । নাড়ী পূর্ণ, কঠিন, জাঁটা এবং দ্রুতগামী ; শীতবোধ এবং
উহার সঙ্গে সঙ্গে মাথায় ঘোণামেলে দোহ, গাল লালবর্ণ, অত্যন্ত পিপাসা ;
সবিরাম জ্বর ; শীত বা শীতকম্প অত্যন্ত প্রবল এবং অনেকক্ষণস্থায়ী ; শীত-
লাবস্থা এবং উষ্ণাবস্থায় পিপাসা এবং অধিক পানিবাহী শীতল জল পানের
ইচ্ছা, শুষ্ক কাশি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বুকে সজাবিধানের স্থায় বেদনা ;
ভ্রষ্ট, জ্বাত এবং পায়ের আঙ্গুলে শীত আরম্ভ হয় ; গায় স্থানান্তরিত শুষ্ক
উদ্ভাপ ; আত্যন্তিক উদ্ভাপ এবং স্থানান্তরিত বাহ্যিক দক্ষণ মনে হয় যেন
শিবির মধ্যে বক্ত আকৃত্যে ; আয়িক-জ্বর বা অব-বিকার এবং উহার সঙ্গে
সঙ্গে প্রাণবিকৃত্য এবং রক্ত বহা মন্ত সমূহের অতিবক্ত উত্তেজনা ; সামান্য
কাবণে পত্ন পরিমাণে, টুকুপকম্প অথবা চৈতন্য বশ্য হয় (মার্ক্‌) ।

ব্যান্‌হার । বাত রোগ এবং বক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ হেতু শিরঃ-
পীড়া (Congestive Headache) ; ফুস্‌স্‌-প্রদাহ ; ফুস্‌স্‌বাবরক কিল্লী
প্রদাহ ; বায়ুন প্রদাহ ; বহুও প্রদাহ ; অগ্রবেষ্ট কিল্লী প্রদাহ (Peritonitis) ;

হৃদযন্ত্রাঘাতক বিলীপ্রদাহ (Pericarditis) ; বাতরোগ ; সকল প্রকারের পেণী এবং সন্ধিবাত জনিত প্রদাহ ; পাকস্থলীতে বেদনা ; অজীর্ণ বোগ ; কোষ্ঠবদ্ধ ; জরায়ু হইতে রক্তস্রাব (Metrorrhagia) ; অতি রিক্ত রক্তস্রাব (Menorrhagia) ; রক্তবোধ ; স্তন-প্রদাহ ; রক্তস্রাবেক পরিবর্তে নাসিকা ইত্যাদি দিয়া রক্তস্রাব (Vicarious Menstruation) ; শ্লেটক বোগ ; হাম-জ্বর এবং আরক্ত জ্বর ; পিত্তাধিক্য হেতু জ্বর ; আন্ত্রিক-জ্বর বা জ্বর-বিকার ; সবিরাম এবং স্বল্প বিরাম জ্বর (Intermittent and Remittent Fevers) ; ঠাণ্ডা লাগিয়া বা কোন প্রকার মানসিক উত্তেজনা বা অবসন্নতা হেতু মাথা ধরা ; মস্তিষ্কের তরুণ শোথ (Acute Hydrocephalus) ; উদরাময় ; কামলবোগ ; উদরী (Ascites) ; স্ত্রীকাক জ্বর ; বায়ুনল এবং কুক্ষুসের তরুণ এবং পুণ্ড্রন প্রদাহ ; কুক্ষুসাবরক বিলীর কৃত্রিম প্রদাহ বা প্লুরোডিনিয়া (Pleurodynia) ; হৃৎপ্রদাহ (Carditis) ইত্যাদি বোগে ব্রাইওনিয়া ব্যবহ্য্য ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । বৃহৎ এবং ক্ষুদ্র সন্ধিবাতক্রান্ত রোগীর পক্ষে বিশেষ উপযোগী ; ছিড়িয়া ফেলা বা স্থতীবিধানের দ্বারা বেদনা, সামান্য নড়াচড়াতেই বাগার বৃদ্ধি হয় ; সোজা হইয়া বসিলেই বমন এবং শরীর অবসন্ন হইয়া মুর্ছাবি ভাব ; আক্রান্ত স্থান কাল্পে বা মলিন লাল বর্ণ ; অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অত্যন্ত দুর্বলতা, চলিলেই বাগার বৃদ্ধি হয় ; চাপিলে শব্দবৎ প্রায় সমুদ্র অংশেই বেদনা অনুভূত হয় ; শোথের দ্বারা ক্ষীণ, দিনের বেলা বাগার বৃদ্ধি হয় এবং রাত্রিতে বাগা কমে ; মুখগহ্বর এবং গর্ভস্থক এবং উষ্ণ ; অধিক পরিমাণে শীতল জল পানের ইচ্ছা ; আত্মবেদ পরে উদবত আহার দ্রব্যাদি বমন । প্রাতঃকালে (উদরাময়) ; সন্ধ্যায় সময়, নড়াচড়া, উত্তাপে বা শীতকালে, উষ্ণ আহারাদি, আহারের পর এবং কাশিবাদ সময় অস্ত্রের বৃদ্ধি । ঠাণ্ডা বাতাস, ঠাণ্ডা ঘরে, ঠাণ্ডা আহার দ্রব্য, বসিয়া থাকিলে, শয়ন করিয়া থাকিলে, বিশেষতঃ বেদনামুক্ত পক্ষে, অস্ত্রের উপশম ইত্যাদি ব্রাইওনিয়াস কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ । বাত রোগে ব্রাইওনিয়াস কাৰ্য্যের সঙ্গে একোনাহট, রাস্টুঙ্গ এবং কল্চিকামের অনেক সাদৃশ্য আছে ; এর রোগে

ইহার কার্য অনেকটা ব্যাপ্টিস্মিয়া এবং ইউপেটোরিয়াম্ পার্কলিয়েটামের
 ত্রায় ; মাস্কক ঝিল্লীর (Serous membranes) উপর ইহার কার্য একোনা-
 নাইট, অর্ডিনিক্ এবং নার্কিউরিয়াস্ করোসাইবাসের ত্রায় ; সাইনো-
 বিয়াল্ ঝিল্লীর (Synovial membranes) উপর ইহার কার্য পাল্‌সেটিলার
 ত্রায় ; আহার নালী (Alimentary Canal) উপর ইহার কার্য
 নাস্ত্রবমিকা এবং লাইকোপডিয়ামের ত্রায় ; যকৃতের উপর ইহার কার্য
 অনেকটা নার্কিউরিয়াস্ সলিউবিলিস্ এবং চেলিডোনিয়ামের ত্রায় ;
 বায়ুনলের উপর ইহার কার্য নাস্ত্রবমিকা এবং সেনিগার ত্রায় ; ফুফুসের
 উপর ইহার কার্য, ফক্ষাস্, চেলিডোনিয়াম্ এবং টার্টার এমিটিকের ত্রায় ।
 এতদ্ভিন্ন কোন কোন বিষয়ে ইহার কার্যের সঙ্গে আণ্টিমোনিয়াম্ ক্রুডাম্,
 আণিকা, ক্যামোমিলা, চায়না, ইগ্নেনিয়া এবং সাল্‌ফারের কার্যের
 কতকটা সাদৃশ্য আছে ।

প্রতিবেদক ঔষধ । একোনাইট, আলাম্, ক্যাম্ফার, ক্যামো-
 মিলা, ক্লিমেটিল্, কফিরা, ইগ্নেনিয়া, নিউরিয়াটিক্ অ্যাসিড্, নাস্ত্রবমিকা,
 পাল্‌সেটিল, রাস্ট্রম্, সেনিগা ইত্যাদি ব্রাইওনিয়ার প্রতিবেদক ঔষধ মধ্যে
 পরিগণিত ।

ডাইলুশন বিচার । বাত এবং বাত জনিত রোগে ও অজীর্ণ
 রোগে ১,৩ এবং ৬ দশমিক ক্রম বিশেষ উপকারী । শ্বাস যন্ত্রের অস্থখে ৬, ১২
 এবং ৩০ ডাঃ বিশেষ উপকারী । মস্তিষ্কের শোথে ৩০ ডাঃ অধিক উপকারী ।
 ইহার ১০০ এবং ২০০ ডাইলুশনও অনেক সময় ব্যবহৃত হইয়া থাকে । কিন্তু
 ৩০ ডাঃ অধিক উপকারী উচ্চ ক্রম লেখক স্বয়ং ব্যবহার করিয়া দেখেন নাই ;
 অতএব উহা উপকারীতা সম্বন্ধেও তিনি বিশেষ কিছু বলিতে পারেন না ।
 শ্বাস যন্ত্রের অস্থখে অনেক চিকিৎসক ৩ দশমিক ডাইলুশন ব্যবস্থা করিয়া
 থাকেন । এতদ্ভিন্ন সন্ধিবাতে ১০ ফোঁট, মূল আরোক ২ কাচা ওলিভ্ অয়েল
 (Olive oil) বিশাইয়া আফ্রোস্তি স্থানে প্রাতে ও বৈকালে মালিস করিলে
 বিশেষ উপকার দর্শিতে দেখা যায় ।

ক্যাল্কেরিয়া কার্বোনিকা,—কার্বোনেট্ অব্ লাইম্—ক্যাল্ক্—কার্ব্

(CALCAREA CARBONICA,—CARBONATE OF LIME,—CALC.-CARB.)

কার্বোনেট্ অব্ লাইম্ স্বগার অব্ মিনের সহিত যণু নিয়মে মিশা-
ইয়া এবং ঘুটিয়া ইহাব্ সম দশমিক হইতে ৩৮ শততমিক ক্রম পর্য্যন্ত গুঁড়া
প্রস্তুত হইয়া থাকে। ৩৮ শততমিক অথবা ৬৫ দশমিক ক্রম হইতে যথা
নিয়মে ইহাব্ ৪র্থ শততমিক ক্রমের অধিক প্রস্তুত হইয়া থাকে। অধিকার
সেল্ (Oyster shell) হইতে যে কার্বোনেট্ অব্ লাইম্ প্রস্তুত হয় তাহাই
ছোমিওপ্যাথিক মতে ঔষধার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া। অতি, দৃঢ়, পেশ, স্নায়ু এবং সংক্ষেপে, শব্দ-
রের এমন কোন অংশ বা যন্ত্র নাই (তবু এই হট্টক আব ঘনই হট্টক) বাহ্যিক
উপর ক্যাল্কেরিয়া কার্বোনিকাব্ কার্য দেখিয়া পাওয়া যায় না। অতএব
ইহা শরীরে প্রবেশ করিয়া রক্ত এবং আন্তর্য পরিপোষণ কার্যের বাধাত
স্ফাটন উহার এমনত অবস্থা আনয়ন করে যেকপ অবস্থা গণ্ডমালা
(Scrofula), আন্তর্যবিক যন্ত্রের ফোড়িক বোগ (Tuberculosis) এবং
অতিরিক্ত যথাযোগ্য বিকাশ প্রাপ্ত না হওয়া হেতু বোগ (Rachitis) এবং
তজ্জনিত রোগে দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব উল্লিখিত বোগ এবং তজ্জনিত
রোগমূলে ক্যাল্কেরিয়া কার্বোনিকা বিশেষ উপকারী।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মন। মনের অত্যন্ত উত্তেজ এবং উহার মধ্যে যথেষ্ট অস্পন্দন (একন্,
ক্যাল্কট্, স্পাইচেল্); কাল্পনিক ভ্রমের প্রভাব বা ঘটনাব্ কথা শুনিয়া
অত্যন্ত চিন্তা এবং মনের উত্তেজ; সকল বিষয়েই আশঙ্কা; নিরাশা এবং বিনয়
ভাব (ইয়েস, পাল্‌স্, নেটাম্-মিউর); সৰ্ব্ব প্রকার কার্যেই অনিচ্ছা;
ভবিষ্যতে কোন প্রকারের বিপদ ঘটবে এই ভাবিয়া ভয় পাইয়া সৰ্ব্বদা
চিন্তাবৃত্ত পাকা (একন্, আলান্, আনাকাউ); রোগী (জীবক) মনে
করে যেন সে তাহার হিতাহিত জ্ঞান হারাইবে অথবা অল্প লোকে তাহার

মনের অবস্থা জানিতে বা বুঝিতে পারিবে (সিমিসিদ্) ; যেমন সন্ধ্যা হইয়া অন্ধকার হইতে থাকে রোগীর মনে তবের উদয় হইয়া সে কাঁপিতে থাকে (একন্, আস্, মার্ক্, রাস্টক্স) ; কোন কারণ না থাকিলেও ভয় ধাওয়া, ক্লিন্নতা এবং কাঁদিবার ইচ্ছা ; স্বরণ শক্তির হ্রাস বা একবারে বিনাশ ।

• মস্তক । • বহির্বাযুতে বেড়াইবার সময় মাথা ঘোরা (আগারিকান্, স্লোনয়েন্, লেডম্, সিনিয়া, সাল্ফ্), বিশেষতঃ মাথা হঠাৎ ফিরাইলে (সান্সু-নেরিয়া) ; নিম্ন স্থান হইতে উচ্চ স্থানে উঠিতে বা উপর দিকে তাকাইলে মাথা ঘোরা (কুপ্রাম্, সান্সুনেরিয়া) ; মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য এবং উহাতে পরমবোধ ও উহার সঙ্গে সঙ্গে মুখমণ্ডল লালবর্ণ এবং শোথের ভ্রায় টল্‌টলে (বেল্, ওপি-য়াম্) ; মাথায় অনবরত পূর্ণ বোধ ; মাথার মধ্যে এবং উপরে বরফের ভ্রায় ঠাণ্ডাবোধ (লয়েস্) ; মাথার এক পার্শ্বে উক্ত প্রকার ঠাণ্ডা বোধ (কন্, বিরেট্-আল্‌ব্) ; একস্থান তক্তা চাপা দিয়া রাখিলে বেক্রপ হয়, মাথায় সেক্রপ বেদনা ; কপালে ভারিবোধ, পুস্তকাদি পাঠ করার সময় বা লিখিবার সময় ঘাহার বৃদ্ধি হয় ; কপালে অত্যন্ত বেদনাযুক্ত বা কষ্টদায়ক চাপাবোধ যাহা নাসিকা পর্য্যন্তও বিস্তৃত হয় (একন্, ক্যালী-বাই) ; মাথার উপরিভাগের হাড়ের জোড় খোলা থাকে (Open Fontanelles) ; মাথা বড় হয় (ক্যাক্-ফন্, সাইলিসি) ; মাথায় চুলকানি ; শিশুগণের ঘুম ভাঙিলেই মাথায় চুলকানি ; মাথার চুল পড়িয়া যায় (গ্রাক্, নেট্রাম্-মিউর, নাইট্রিক্-আস্, কন্, সিনিয়া), বিশেষতঃ মাথার এক পার্শ্বের ; মাথার চুল বিশিষ্ট অংশে পাচড়া বা খোস ; প্রত্যেক দিন প্রাতঃকালে মস্তিষ্কের ঠিক মধ্যাংশে দপ্‌দপিয়া বেদনা, মানসিক পরিশ্রমে ঘাহাব বৃদ্ধি হয় ; শিরঃপীড়া এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বমনোদ্বগ এবং মাথাঘোরা, মানসিক পরিশ্রম, মাথা হেট করিয়া উপুড় হইলে অথবা বহির্বাযুতে বেড়াইলে ঘাহাব বৃদ্ধি হয় ; ঘুমের অবস্থায় শিশুর মাথায় বিন্দু বিন্দু ব্যথ হয় ; একশেষে মাথা বেদনা (আধ্‌কপালিয়া মাথা বেদনা) ।

• চক্ষু । • বালি বা অন্য কোন প্রকার বস্তুর কণা প্রবেশ করিলে বেক্রপ হয়, চক্ষের মধ্যে সেক্রপ বাতনা (একন্) ; চক্ষু দিয়া প্রচুর পরিমাণে জল পড়া (ইউক্রেস্, মার্ক্) ; চক্ষুর পাতা লালবর্ণ এবং রাত্রিতে চক্ষুর পাতার পাতায়

লাগিয়া থাকে (এথুসা, লাইকোপ্, বার্ক্, পাল্‌স্, সাইলিসি, সাল্‌ক্) : চক্ষু পাতার প্রান্তে চুলকানি (কার্কী-বেজ্, সাল্‌ক্) ; চক্ষুর নাকের নিকটবর্তী কোণে জ্বালা বা স্থচীবিধানের জ্বায় বাতনা ; শিশুগণ এবং গণ্ডমালা ধাতু বিশিষ্ট লোকের চক্ষু প্রদাহ ; একখানি সৰু কাপড়ের মধ্য দিয়া দেখিলে যেরূপ হয় রোগী সেরূপ কাপড় দৌধে ; নেত্রনালী (*Pistula Lachrymalis*) ; চক্ষুর কর্ণিকাতে (*Forica*) ক্ষত হয় এবং দাগ পড়ে ; চক্ষু সম্মুখে যেন আগুনের কণা উড়িয়া যাইতেছে এরূপ অস্বভূত হয় ।

কর্ণ । বাম কর্ণের সম্মুখের ক্ষীতি, বাহ্য চাপিলে চক্ষু বেদনাগত হয় ; কানের মধ্যে গানের শব্দের জ্ঞান, নৌ গোল এবং জেব্ জেব্ শব্দ হয় (চারনা, সাল্‌ক্) ; কান দিয়া পূর্ব পড়া (হিপ্-সাল্‌ক্, গ্রাফাইটিস্, লাইকোপ্) ; ডাইন কানের গম্ভীর ভাগে কুস্কড়ী বাহ্য হইতে কলতান পড়ে (গ্রাফাইটিস্, হিপ্-সাল্‌ক্) ; কানে কম শুনা ; সবিরাম জ্বরে কোই-নাইনের অতিরিক্ত ব্যবহার দ্বারা মূর আরাম হওয়া এবং তৎকণ কানে কম শুনা :

নাসিকা । নাক ক্ষীত, বিশেষতঃ উহা ব গোড়া ; নাসারন্ধ্, ক্ষত এবং টাটানি (আলাম্, অরাম্, গ্রাফাইটিস্, ক্যালী-বাই, নাইটিক্, আগিড্, পাল্‌স্) ; বারম্বার হাঁচি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কখন নাক দিয়া স্লেয়া নির্গত হয়, কখন বা স্লেয়া নির্গত হয় না ; পচা ডিম বা বন্দুকের বারুদ গোড়াইলে বেরূপ হয়, নাকে সেরূপ ভগ্নক (ক্রিরাজ্) ; নাক দিবা রক্ত পড়া, বিশেষতঃ প্রাতঃকালে (অসারিকাক্, অস্থ্য, ব্রাই) ; নাসা বা নাকড়া ; সন্ধি এবং নাক দিয়া জলবৎ তরল স্লেয়া নির্গমন ।

মুখমণ্ডল । মুখ মণ্ডল কিকা বা শিটা, শোথের জ্বায় টল্‌টলে এবং বসিয়া যায় ; চক্ষু বসিয়া বার এবং উহা নীলের রেখা দ্বারা পরিবেষ্টিত হয় (চারনা, ক্যালী-আগোড্, সিকেল্) ; মুখমণ্ডলে কলতানি, চুলকানি এবং মরা চক্ষু বিশিষ্ট কুস্কড়ী, প্রধানতঃ গাল এবং কপালে (আটি-কুড্, গ্রাফাইটিস্, লাইকোপ্) ; শুষ্ক এবং মুখের মধ্যে কুস্কড়ী (আটি-কুড্, গ্রাফাইটিস্, লাইকোপ্) ; প্রাতঃকালে উপরের ওষ্ঠের ক্ষীতি (এপিস্, বেজ্) ; হস্তাধির নির-

স্থিত গ্রন্থির ক্ষীতি এবং উহাতে বেদনা (এরাম্, অরাম্, ব্যারাইটা-কার্ক্, নেট্রাম-কার্ক্, রাস্টেক্, সাইলিসি); মুখমণ্ডল হরিদ্রাবর্ণ; গাল চক্কাকারে লালবর্ণ; শিশুগণের গালাদিতে খোদাবিশিষ্ট ফুসুড়ী ধুইলে বাহাতে অলানুভূত হয় ।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য । ঠাণ্ডা বাতাস লাগিবা বা ঠাণ্ডা জল বা জলীয় দ্রব্য পানে দাঁত বেদনা (আন্টি-ক্ৰুড্, ষ্টাকিস্, সাল্‌ফ্); ঠাণ্ডা লাগিলে যেকুল হয় সেকুল দাঁত কিড্ মিড্ করার ইচ্ছা; কষ্টে দাঁত উঠা (ক্যাক্-ফস্); জিহ্বা সালা লেপযুক্ত (আন্টি-ক্ৰুড্, ষ্টাই, মার্ক্, নাক্স্ বন্, পাল্‌স্, সাল্‌ফ্); জিহ্বার অগ্রভাগে ক্ষত হওয়ার স্থায় অলায়ুক্ত বেদনা বা টাটানি (ক্যাক্-ফস্, ক্যাক্সো-আনিমেল্, কলোস্), উষ্ণ আহার বা পানীয় দ্রব্যে বাহার বন্ধি হয়; গিলিবাব সময় জিহ্বার নীচে বেদনা; মুখে টক স্বাদ (চায়না, ইন্ডেস্, ম্যাগেস্-ক্যাক্স্, নাইট্রিক্-অ্যাস্); রাত্রিতে ঘুম ভাঙ্গিলে জিহ্বার শুক প্রাপ্ত; রক্তস্রাবের পর দন্তশূল, বা দন্তশূল থাকিলে উহার বন্ধি; গর্ভবতী স্ত্রীলোকের দন্তশূল; মাড়ি দিয়া রক্ত পড়া । গলাব মধ্য বেদনা বাহা কর্ণ পর্যন্ত বিস্তৃত হয় (বেল্, হিপ্-সাল্‌ফ্, ক্যালী ডাই); গিলিবাব সময় গলার মধ্য স্থলীস্থানের স্থায় বেদনা বা বাতনা; সঙ্কুচিত হইলে যেকুল হয় গিলিবাব সময় গলাব মধ্য সেকুল অতুত হয়; আহারবহা গলনালীর সংকোচন (Stricture of the Oesophagus) (বেল্, হায়োস্); টনসিল্ ক্ষীত; তালুকার প্রদাহ এবং ক্ষতি; আল্‌জিহ্বা কাল্‌তে লালবর্ণ এবং কোষ্ঠার স্থায় ফুসুড়ী দ্বারা আবৃত ।

পাকস্থলী এবং উদর । প্রাতঃকালে ডষ্ট ক্ষুধা; ক্ষুধা শূন্যতা; কিন্তু খাইতে আরম্ভ করিলে খাইতে ভাল লাগে; অত্যন্ত পিপাসা (একন্, রাই, সাল্‌ফ্); উদরস্থ আহার দ্রব্যাদির স্বাদ বিশিষ্ট বারম্বার উদ্গার উঠা (আন্টি-ক্ৰুড্, চায়না, ক্যাক্সো-আনিমেল্, গ্রাফাইটিস্, সন্, পাল্‌স্); গলা-দিয়া স্বাদশূন্য জল উঠে; প্রাতঃকালে বমনোবেগ (ন্যাম্ বন্, পাল্‌স্) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গা মাটি মাটি করা এবং শব্দ কম্পন; বমনোবেগ এবং মুখ দিয়া টকজল নির্গমন; টক স্বাদ বিশিষ্ট পদার্থ বমন, প্রবানতঃ শিশু-গণের দাঁত উঠার সময় (এথুনা); পাকস্থলী একটী বাতীর স্থায় ফুগে; পাক-

স্থলীতে চাপাবোধ বাহ্যি গলার মধ্য পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় (আস্); ডেলার জায় কোন বস্তু লাগিয়া থাকিলে যেরূপ হয়, পাকস্থলীতে সেরূপ চাপা বোধ (আস্, ব্রাই); পাকস্থলীর গভীর অংশে চাপিয়া ধরার জায় প্রবল বেদনা; দিক্ করা বস্তুতে অকর্চি; মাংসে অকর্চি; লোভা আহার জব্দ এবং ডিব খাওয়ার ইচ্ছা; পেটে জ্বপ সহ্য হয় না; আহারের পর বুক জ্বালা এবং উদ্যাব দ্বারা বায়ুনিঃসরণ। কোমরে কাপড় কসিয়া পবিত্রে পারা যায় না বা কাপড় পরিলে কষ্টবোধ হয় (কার্কো-বেজ্, গ্রাফাইটিস্, ল্যাক্); কুচকির ঠিক উপরিভাগ যেন একগাছি ফিতা দিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছে এরূপ অনুভূত হয় এবং উদরোদ্ধ প্রদেশে দপদপানি এবং কীপনি; প্রত্যেক বার পদনিষ্ক্ষেপে যত্নত প্রদেশে চাপাবোধ; মাথা হেট কবিতা উপুড় হইলে অথবা মাথা হেট করার পর সোজা হইলে যত্নত প্রদেশে স্তম্ভনিধানের জায় বেদনা বা বাতনা; উদর অত্যন্ত কঠিন এবং ক্ষীত (আস্, ল্যাবলিটা-কার্দ); অস্ত্রের মধ্যে বাতস্থার খিল ধরার জায় প্রবল বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে উরুতে ঠাণ্ডা বোধ, প্রধানতঃ সন্ধ্যার সময় এবং রাত্রিতে; অস্ত্রের মধ্যে দূষিত বায়ু কুদ্ধ হইয়া থাকে (অরাম্, কার্কো-বেজ্, লাইকোপ্); শিশু বা ছোট বালক বালিকাগণের মেসেন্টারিক গ্রন্থি (Mesenteric glands) ক্ষীত এবং কঠিন হয়; শিশুশিলা বহির্গত হওয়ার সময় বেদনা (Biliary colic, Gallstone); কুচকির গ্রন্থি ক্ষীত এবং বেদনামুক্ত (ক্রিনেটন্); শারীরিক পরিশ্রমে তলপেটে অত্যন্ত কষ্টদায়ক চাপা বোধ।

মল এবং মল দ্বার। অর্শ বোগ এবং মলত্যাগের সময় অশেষ ক্ষীত অন্তর্বলী গুলি বাত্বর হইবা পড়ে (অলোজ্, ল্যাক্, মিউন-আস্, পাল্‌ম্); শুষ্ক দ্বার দিয়া রক্ত পড়ে; শুষ্ক নিম্নভাগে ভাঙ্গি বা চাপা বোধ (অলোজ্); প্রাতঃকাল হইতে বেলা দুই প্রহর পর্য্যন্ত শুষ্ক খিল ধরার জায় কষ্টভূত্ব; পেটকানড়ানি এবং অশেষ বলী গুলির মধ্যে স্তম্ভনিধানের জায় বেদনা বা বাতনা ও তরুণ অত্যন্ত উদ্বেগ, যত্নে দরুণ বসিয়া থাকিতে না পারিয়া যোঁয়া পা-চোঁয়া কন্দিয়া বেড়াইতে বাধ্য হয়; শুষ্ক এবং শুষ্কদ্বারে জ্বালাভব (অর্শ, ক্যাজ্, অপিপি); বারদ্বার মলভাগ, মল প্রথমতঃ কঠিন হইয়া কঠিনের জায় এবং তৎপরে তরল উদরস্থ অর্জীর্ষ আহার

দ্রব্যের কণা বিশিষ্ট (আন্টি-ক্লুড, চায়না, পডোফ্); পচা ডিমের জায়
 হর্গন্ধযুক্ত (আক্সিপিয়াস-টুবার, ক্যাম); সাদা, টকগন্ধযুক্ত মল ত্যাগ; শিশু
 গণের দাঁত উঠার সময় চাঞ্চি গোলার জায় মলত্যাগ; উদরাময়, পাক-
 স্থলীতে অল্প এবং শুষ্ক বাহির হওয়ার জায় মলত্যাগ; উদরাময়, পাকস্থলীতে
 অল্প এবং শুষ্ক বাহির হওয়ার স্বভাব বিশিষ্ট ধাতু; ফুস্ফুসে ফোটক
 (Tubercles) হওয়ার পূর্ববর্তী লক্ষণ; কোষ্ঠবদ্ধ এবং মল কঠিন মোটা
 লম্বা নেড়; (ব্রাই, সাল্ফ্); অসাড়ে বা অনিচ্ছাপূর্বক ফেণাযুক্ত মল
 ত্যাগ; শুষ্ক কুট্ কুট্ করা এবং উহাতে গোল স্ত্রবৎ কুনি; শুষ্কধারের
 ভয়ানক কুটকুটানি।

মূত্র যন্ত্র । অত্যন্ত কাণ্চে মূত্র ত্যাগ, কিন্তু মূত্রে তলানি পড়ে
 না; হর্গন্ধযুক্ত মূত্র (ক্রিয়াজ্, সাল্ফ্); কাণ্চে কটাবর্ণ মূত্র এবং উহাতে
 সাদা তলানি পড়ে (ক্যাহ্, কল্চ); বারম্বার মূত্র ত্যাগ (রাত্রিতেও); মূত্র
 ত্যাগের সময় মূত্র নালীতে জ্বালা; রক্ত মূত্র ত্যাগ; চলিবার সময় অসাড়ে
 বা অনিচ্ছাপূর্বক মূত্র নির্গমন।

জননেন্দ্রিয় । পুরুষাঙ্গের মাথার আবরক চর্ম (Prepuce), ফ্রিনাম্
 (Froenum) এবং মূত্রনালীর মুখের প্রদাহ এবং তদ্রূপ পুরুষাঙ্গের মাথা
 এবং ফ্রিনামের নীচে হরিদ্রাবর্ণেব পুঁথ সঞ্চিত হয়; স্ত্রী সহবাসের অতি-
 রিক্ত ইচ্ছা, কিন্তু স্ত্রীসহবাসেব সময় লিঙ্গ খাড়া হয় না এবং সামান্য আলিঙ্গনে
 এবং কম সময়ের মধ্যেই ধাতু নির্গত হয় (নেট্রাম্-কার্ক) এবং তৎপর রোগী
 অত্যন্ত হর্গন্ধ বা অবসন্ন হইয়া পড়ে। স্ত্রী লোকের নিয়মিত সময়ের অনেক
 পূর্বে, অনেক দিন ব্যাপিয়া অতিরিক্ত বা প্রচুব রক্তস্রাব (আম্ভা, আমন্-
 কার্ক, কোকাশ্, নাম্ বম); হৃদেব জায় স্বেত প্রদর (কোনায়াম্, লাইকোপ্
 পাল্, দিপিয়া, সাল্ফ্-আম্) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বোনিদ্বারে চুলকানি
 এবং জ্বালা; পাকিয়া পুঁথ হইলে যেকণ হয়, স্তনে সেক্রপ বেদনা, বিশেষ-
 মতঃ স্পর্শনে; জননেন্দ্রিয়ার প্রদাহ; সামান্য উত্তেজনায়ই রক্তস্রাব
 আরম্ভ হয়; রক্তস্রাবের সময় মাথা ঘোরা, মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য বা রক্তা-
 বরোধ, দস্তশূল এবং পায়ের পাতা শীতল ও আর্দ্র; জরায়ু মুখে স্ত্রী-
 বিধানের জায় বেদনা; বোনিদ্বারে চুলকানি এবং চাপাবোধ; বোনি

দ্বারে অনবরত কনকনানি; জরায়ু স্থান ভ্রষ্ট হয় বা সরিয়া পড়ে (Prolapsus Uteri)।

শ্বাস যন্ত্র । সন্ধ্যার সময় শয়ন করিয়া থাকিলে কণ্ঠনালীতে সাঁই সাঁই শব্দ ; প্রাতঃকালে যাতনাহীন স্বরভঙ্গ বা স্বর শূন্যতা (কণ্ঠ, কার্কো বেজ্) ; বারম্বার দীর্ঘ নিশ্বাস আবশ্যক হইয়া পড়ে; সামান্য উচ্চ স্থানে উঠিলেও শ্বাস কষ্ট (একন, আমন্-কার্ক, আস্থি পিয়াস্-টুবাস, আস্, ক্যাক্ট) ; কাশি; গলার মধ্যে হুড়্-হুড়ী; রাত্রিতে শুষ্ক কাশি (হায়োস) ; প্রথমতঃ অত্যন্ত শুষ্ক কাশি এবং তৎপব কাশির সঙ্গে সঙ্গে গলা দিয়া প্রচুর পরিমাণে লোন্তা স্বাদ বিশিষ্ট স্লেয়া নির্গমন (লাইকোপ্, আস্, কার্কো-বেজ্, কস্, ষ্টানাম্, সিপিয়া) এবং কোন অংশ ছিঁড়িয়া পুগলে বেরূপ হয়, কণ্ঠনালীতে সেরূপ বেদনাম্ভব ; প্রাতঃকালে কাশি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গলা দিয়া হরিত্রাবর্ণের স্লেয়া নির্গমন (পাল্) ; তেলার ত্রায় কোন পদার্থ বারম্বার এদিক ওদিক চলিয়া বেড়ানোর ত্রায় অল্পভূত হওয়াব দ্রুপ কাশি ; নিশ্বাস এবং আহারে কাশির উদ্রেক ; গলাদিয়া স্লেয়া নির্গমন এবং মুখে মিষ্ট স্বাদ (ষ্টানাম্) ; গলা দিয়া রক্ত পড়া এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বৃকে ঋশ্-ঋশে বোধ ও টাটানি ; স্পর্শনে এবং নিশ্বাস টানিতে বৃকে অত্যন্ত বেদনা ; বৃকে আঁটা বোধ এবং কণ্ঠাম্ভব, যাহার দ্রুপ স্নেহ হয় যেন বৃকের মধ্য রক্ত দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া বহিয়াছে ; নিশ্বাস টানিবার সময় বৃকের মধ্যে কণ্ঠনবৎ বেদনা ; নিশ্বাস টানিবার সময় বৃকে আলায়ুক বেদনা বা টাটানি ; বাহিরে বা আহারের পর জ্বস্পন্দন এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত উদ্বেগ ; জীলোকের স্তনে অতিরিক্ত পরিমাণে ভর হয় ।

গ্রীবা এবং পৃষ্ঠদেশ । গ্রীবাব গ্রন্থি গুলি ক্ষীণ এবং অত্যন্ত কঠিন (ব্যাবাইটা-কার্ক, কাসো-বেজ্, আরোড্) ; বেস্তানে চুল শেষ হইয়াছে গ্রীবাব দে স্থানের গ্রন্থি গুলির বেদনাহীন ক্ষীণতি ; গ্রীবাব গ্রন্থিতে বেদনা ; মাথা কিরাইবাব সময় গ্রীবাতে বেদনা যাহার দ্রুপ মনে হয় যেন উক্ত স্থানে একটা ছাব (Tumour) হইবে ; মোচড়াইয়া পড়িলে বেরূপ হয়, পৃষ্ঠদেশ এবং কোমরে সেরূপ বেদনা (রাস্টিগ্) ; ছই স্বকের মধ্যবর্তী

কানে চাপিয়া ধরার দ্বারা বেদনা যাহার দরুণ ঋষি প্রস্থাসের ব্যাঘাত
করে ; মেরু দণ্ডের মধ্যাংশ বাকিয়া পড়ে ।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, হাত, পা ইত্যাদি । সমুদয় অঙ্গে শ্রান্তি বোধ ;
দ্বারা অঙ্গের সন্ধিতে পক্ষাঘাত বা মোচড়াইয়া পড়ার দ্বারা বেদনা এবং
নড়াচড়াতে কোমরের পশ্চাৎ ভাগে বেদনা । বাহু সঞ্চালন করিলে অথবা
উহা ধরিয়া কখনো উহাতে মোচড়াইয়া পড়ার দ্বারা বেদনা ; চাপিয়া
শয়ন করিলে বাহু অবশ ও বেদনাবৃত্ত হয় ; এক বা উভয় বাহুতে খিল
ধরা ; বাম বাহুর দুর্বলতা বা পক্ষাঘাতের দ্বারা অবশ বোধ ; অঙ্গের
সন্ধি মোচড়াইয়া পড়িলে, থেংলিয়া গেলে, স্থান ভ্রষ্ট হইলে বা সরিয়া
পড়িলে বেক্রপ হয়, ঋণিবন্ধে সেক্রপ বেদনানুভব (একন্, ব্রাই, রাস্-
টন্, ইউপেট্-পার্ক্,) ; হাতের কাঁপনি ; আঙ্গুলের সন্ধিগুলি অত্যন্ত
ক্ষীত ; হাতের পাতার ঘর্ম্ম হয় । অনেকক্ষণ চলিয়া বেড়াইলে সেক্রপ হয়
উরু এবং পায়ের পাতায় সেক্রপ ক্রান্তি বোধ (আর্জেন্ট্-নাইটি, চায়না
নাইটি-ক্-আস্,) ; ক্রী বা পুরুষ সহবাসের পর পায়ের দুর্বলতা এবং কাঁপনি
(চায়না, কস্-আস্) ; হাঁটুর সন্ধির ক্ষীতি ; পায়ে খিল ধরা (ক্যাম্ফার) ;
রাজিতে পায়ের ভিমে (থোড়ায়) খিল ধরা (একন্, ক্যাম্ফার, নাক্সবন্,
সাইলিসি, সাল্ফ্,) ; পা বিস্তৃত করার সময় হাঁটুর সন্ধির পশ্চাৎভাগে খিল
ধরা ; পায়ের পাতা এবং আঙ্গুলের তলায় খিল ধরা ; সন্ধার সময় বসিয়া
থাকিলে পায় ঝাঁ ঝাঁ ধরে বা উহা অবশ হয় ; পায়ের পাতায় জ্বালা
(সাল্ফ্) ; পায়ের পাতা আর্দ্র এবং শীতল ; পায়ের পাতা ঘামে (সিপিরা,
সাইলিসি) ; কুচকি-সন্ধি-বাত এবং আক্রান্ত স্থানে স্ফটাবিধানের দ্বারা বা
কর্ত্তনবৎ বেদনা ; শিশুগণ গোণে চলিতে বা হাঁটিতে শিখে ; ক্রীলোকের
সন্তান প্রসবের পর পায়ের ষ্ঠেত ক্ষীতি (Milk-leg) ।

চর্ম্ম । পায়ের টিবিয়া (Tibia) নামক অস্থি উপর লাল রেখার
দ্বারা দাগ পড়িয়া চুল্কা হয় এবং চুল্কাইলে বা ঘষিলে জ্বালা করে ; চর্ম্ম
অস্বস্থ এবং ক্ষতবৃত্ত ; দীর্ঘাত্ম ঘায়েও পূঁব হয় (গ্রাফ্, হিপ্-সাল্ফ্,
সাল্ফ্) ; আনবাত (Nettle-Rash) শীতল বাতাস লাগিলে যাহা থাকে
না ; নিম্ন ওঠের লাল অংশের প্রান্তে নয়া চর্ম্মবৃত্ত ত্রণের দ্বারা ক্ষুণ্ণী ;

গায় কলতানি বিশিষ্ট ময়া চর্মযুক্ত কুস্কুভী (গ্রাক্, হিপ্-সাল্ফ্, লাইকেপ্, মার্ক্); গায় উচু, লাল, কঠিন এবং ক্ষাত প্রাপ্ত বিশিষ্ট গভীর নালী বা ।

নিদ্রা । দিনের বেলা শ্রান্তিবোধ এবং নিদ্রাবল্য; প্রাতঃকালে সজ্জে ঘুম ভাঙে না; ক্রমাগত অনিবাধ্য নিদ্রাশূন্যতা, চক্ষু বুজিলেই রেণী না না প্রকারের আকৃতি দেখিতে পায়; রাত্রি অধিক না হইতে ঘুম হয় না; ঘুমের ঘোরে ভয়ানক চিন্তা উৎপাদক স্বপ্ন দেখা (আর্গিকা, চেল্, আই); ঘুমেরঘোরে চক্ষু মেলিলেই ভয়ানক আকৃতি বা দৃশ্য দেখা ।

জ্বর । অভিশয় আভ্যন্তরিক শীত বোধ; একবার শীত এবং এক-বার গ্রীষ্ম বোধ (ককিউলাস্, মার্ক্); বারবার হঠাৎ উষ্ণাহত্ব, প্রথমতঃ রাত্রিতে (ল্যাক্); রাত্রিতে আভ্যন্তরিক উষ্ণাহত্ব, প্রথমতঃ হাত এবং পায়ের পাতায়; প্রাতঃকালে জ্বর। শুরু; সামান্য শারীরিক পরিশ্রমেই প্রচুর ঘর্ম হয় (অগ্না, চিনিলাম্-সাল্ফ্, ক্যালী-নাইট্, মার্ক্, ফস্, সিপিগা, সাইলিস্); প্রাতঃকালে প্রচুর ঘর্ম হয় (চিনিলাম্-সাল্ফ্, নাইট্রিক্-অ্যাস্, ফস্, রাস্ট্রজ্); রাত্রিতে ঘর্ম (চারনা, মার্ক্, ফস্, ফস্-অ্যাস্, সাল্ফ্); উষ্ণাবহার পিপাসা এবং তৎপর শীত বোধ; ঘুমের প্রথমা-বস্থার ঘর্ম; রাত্রিতে ঘর্ম, মাথা, গ্রীবা এবং বুকেই ঘর্ম অধিক হয়; সন্ধার সময় জ্বর; পূর্নাক ১০টা হইতে ১১টা পর্যন্ত জ্বরের অক্রমণ বা আরম্ভ ।

ব্যবহার । গণমাশ, আভ্যন্তরিক বস্তুর ফেটিক রোগ (Tubercles) এবং আন্তর অদম্পূর্ণ বিকাশের দ্রবণ রোগ (Rachitis) ও তজ্জনিত সর্স প্রকারের অস্থি; অস্থি, গ্রন্থি এবং চর্মের অস্থি; নাসা; গায় কোষ্ঠার স্থায় সম্পূর্ণ কুস্কুভী; মদোন্মত্ততা (Delirium Tremens); বাতালদিগের অস্থি; বৃগী রোগ; কোরিয়া (Chorea); বাত রোগ; চক্ষু-প্রদাহ; শিশু গণের কঠকর দাঁত উঠা; প্রেমা জনিত পুরাতন অস্থি, বিশেষতঃ পাকস্থ-লীর; মাথার গুম্বিক বা মরা চর্ম পড়া; উদরায়ন; কোষ্ঠবদ্ধ; অতিরিক্ত রক্তস্রাব; যেত প্রদর; পুরাতন আকারের আনবাত; সবিবাহ-জর অথবা যে প্রকার জ্বর কোইনাইটনের অপব্যবহারের দ্রবণ আটাইয়া যায়; বজ্রকাশ ইত্যাদি রোগে ক্যাকেরিয়া ক্যাকোনিকা ব্যবহার্য ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । গণমাশাধা; ঠাণ্ডা বাতাস লাগিলেই

অস্বাভাবিক বোধ; সহজে বা সামান্য কারণেই সন্ধিলগ্না; স্থলকার্যবিশিষ্ট শিশু, ছোট বালক বালিকা অথবা যুবা যুবতীর অস্বাভাবিক; রোগী শীর্ণ হয়, কিন্তু তাহার পেটটী মোটা বা স্বাভাবিক থাকে, এবং ক্ষুধাও স্বাভাবিকই থাকে; দন্দপিয়া বেদনা; আত্যন্তিক নীত; ক্ষুদ্র সন্ধি বাতের ভায় সন্ধির ক্ষীণতা এবং কঠিনতা; প্রাতঃকাল, সন্ধ্যার সময়, রাত্রি দুই প্রহরের পর, ঠাণ্ডা এবং ঠাণ্ডা বাতাসে, উচ্চ স্থানে উঠিবার সময়, জী বা পুরুষ সহবাসের সময় বা উহার পর, শারীরিক পরিশ্রমে, চলিয়া বেড়াইলে, ছুপ খাটিলে (পেটের অস্বাভাবিক বা উদরানয়), পূর্ণিমা তিথিতে বা উহার নিকটবর্তী সময়ে, দান করিলে অস্বপ্নের বৃদ্ধি; এবং প্রাতঃকালে, আগ্রহের পর, শ্রম হইতে উঠিলে, শুষ্ক বহিঃস্থায়ত, বেদনাতুর্ত পাশে শয়ন করিলে অস্বপ্নের উপশম; পেশী স্পন্দন; শরীরের কাঁপনি, সমুদয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গে দুর্বল এবং শ্রান্তিবোধ ইত্যাদি ক্যাক্সেরিয়া কার্ভোনিকার কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক নির্দিষ্ট লক্ষণ। নাপাটী বড়, পেটটী বড়, শরীর জীর্ণ শীর্ণ, কিন্তু ক্ষুধা স্বাভাবিকই থাকে : রোগীর সামান্য কারণেই সন্ধি লাগে, পাবের পাতায় ঠাণ্ডা এবং ভিজা বোধ, যেন ভিজা মোজা পরা রহিয়াছে ইত্যাদি কয়েকটি প্রাকৃতিক লক্ষণ অন্যান্য লক্ষণের সঙ্গে যে রোগীতে থাকে তাহার চিকিৎসায় ক্যাক্সেরিয়া দ্বারা বিশেষ দৃষ্টি পাওয়া যায়।

সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ। ব্যারাইটা কার্বোনিকা, আরোডিন, কফ-রাস এবং সাইলিসিয়ার কার্বোয় সঙ্গে ক্যাক্সেরিয়া কার্ভোনিকার কার্যের অনেক সাদৃশ্য আছে। এতদ্ভিন্ন কোন কোন বিষয়ে আর্সিনিক, ক্যাক্সেরিয়া কফট্রিকা, গ্রাফাইটস, নাইট্রিক অ্যাসিড, ম্যাকউরিয়াস, সালফার, চাণনা, লাইকোপডিয়াস ইত্যাদি ঔষধের কার্যের সঙ্গে ক্যাক্সেরিয়া কার্বোনিকার কার্যের সাদৃশ্য আছে।

প্রতিষেধক ঔষধ। ক্যাফার, নাইট্রিক অ্যাসিড, নাক্সোনিকা, সালফার ইত্যাদি ক্যাক্সেরিয়া কার্বোনিকার প্রতিষেধক ঔষধ মধ্যে পরিগণিত।

ডাইলুশন বিচার। ১২ এবং ৩০ ক্রমই সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শিশুগণের কষ্টকর দাত উঠার সময়ের অস্বাভাবিক লেখক ১২ ডাইলুশনই

সচরাচর ব্যবহার কবিয়া বিশেষ ফল পাইয়া থাকেন। ৬, ১০০ এবং ২০০ ডাইলুশনও অনেক সময় ব্যবহার্য। ২০০ ডাইলুশন দুই দিন অন্তর একদিন ১ মাত্রা, এই প্রকার ১ মাস এবং কোন কোন সময় ২ মাস ক্রমাগত ব্যবহার করিয়া গণ্ডমালা জনিত পুৰাতন আকারের চক্ষুপ্রদাহে অনেক বোগী চিকিৎসায় লেখক বিশেষ ফল পাইয়াছেন। কিন্তু তাদৃশী বোগীর চিকিৎসা ইহার সঙ্গে সাল্ফার ২০০ ডঃ পর্যায়ক্রমে ব্যবহাৰ কবিত্তে হইয়াছিল। ৩ ক্রমের গুঁড়াও অনেক চিকিৎসক ব্যবহাৰ কবিয়া থাকেন।

কার্বো বেজিটেবিলিস্,—(অঙ্গার),—কার্বো-বেজ্ ।

(CARBO VEGETABILIS,-VEGETABLE CHARCOAL,-CARB-VEG.)

কোন এক বিস্মৃত হোমিওপ্যাথিক ঔষধ বিক্রেতাব ঐবদানব হইতে আদিত অঙ্গার ক্রয় করিয়া সুগাৰ অব্ মিক্চর সঙ্গে মিশাইয়া যথানিয়মে ৩৮ শততমিক বা ৬ষ্ঠ দশমিক ক্রম পর্য্যন্ত গুঁড়া প্রস্তুত হয়। ৩৮ শততমিক বা ৬ষ্ঠ দশমিক ক্রমের গুঁড়া হইতে যথা নিয়মে ৪র্থ শততমিক ক্রমের আরো ক প্রস্তুত হইয়া থাকে। ৫ম এবং ততোধিক শততমিক ক্রমের আরো ক যথানিয়মে বেক্টিলাইড্ স্পিৰিটে প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া । ইহা বক্ত এবং স্নায়বিক মাণ্ডলকে আক্রমণ করিয়া উহার উৎকলতা বা অবসন্নতা উৎপাদন করে। স্লেয়ক কিলীর, বিশেষতঃ পৰিপাক সম্বন্ধীয় বস্তুর স্লেয়ক বিলীণ, উপর ইহার কাণ্য আঁত প্রেরণ। ইহা দ্বারা উক্ত বস্তুর নিঃসরণ বৃদ্ধ এবং অপবিন্দিত হয় এবং তদ্বারা পাকস্থলী ও অন্ত্রের মধ্যে অতিবিক্ত পরিমাণে দূষিত বায়ুর সম্ভাব হইয়া থাকে। পাকস্থলী এবং অন্ত্রের মধ্যে দূষিত বায়ু উৎপাদন কৰা এই ঔষধের একটী বিশেষ প্রাকৃতিক গুণ বা শক্তি মধ্যে পরিগণিত।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মন । চিন্তা এবং মনের কষ্ট; চিড়্, চিড়্ করা, খিট্, খিট্ করা

এবং বাগ করার স্বভাব বা ইচ্ছা (ব্রাই, কাম্); বাহ্য দেখিতে বা শুনিতে পাওয়া যায় রোগীর উহার সমুদয় বিষয়েই বৈরাগ্য বা অমনোবোগ (বার্বেবিস্, ফন্স্); মনে আস্তে আস্তে ভাবের উদয় হয়; সহজেই ভয় খাওয়ার স্বভাব; পক্ষ্যার সময় মনের অত্যন্ত অশান্তি এবং চিন্তা ।

মস্তক। মাথার গোলমেনে বোধ বাহার দরুণ কোন বিষয়ে চিন্তা করা অত্যন্ত কঠিন হইয়া পড়ে (আমন্-কার্, ক্রিয়াজ্); মাথা ঘোরা, বাহার দরুণ রোগী কোন বস্তু পরিয়া থাকিতে বাধ্য হয়; মাথা হেট কবিয়া উপুড় হইলে মাথা ঘোরা (একন্, বেণ্); একখানি সীসা বসাইয়া রাখিলে ঘেরুপ হয় মাথার সেরুপ ভাবি বোধ (ল্যাক্), মাথার হাড় সমুচিত হইলে ঘেরুপ হয় মাথার সেরুপ বেদনা বা কন্কনানি; কাশিবার সময় মাথার মধ্য দিয়া স্ফীতিবিশিষ্ট হ্রাস অত্যন্ত কষ্টদায়ক বেদনা (ব্রাই); নিশ্বাস টানিতে মাথার অত্যন্ত কষ্টদায়ক দপ্-দপানি; কপালে,—চক্ষুর ঠিক উপরিভাগে, চাপিয়া ধরিলে হ্রাস অত্যন্ত কষ্টদায়ক বেদনা; মাথার পশ্চাৎ ভাগে ঘূর্ণশে বেদনা বা কন্কনানি; মাথার পশ্চাৎ ভাগের বান পার্শ্বে কদিয়া ধরা বা ছিঁড়িয়া ফেলাব হ্রাস বেদনা; মাথার পশ্চাৎভাগেব নিম্নাংশে চাপিয়া ধরিলে হ্রাস বেদনা; মাথায় চাপ, এমন কি টুপির চাপও, সহ হয় না (নাইট্রিক্-অ্যাম্, মেজিরিফাম্); মাথার টুপী ছাড়িলেও মাথা যেন একখানি কাপড় দিয়া বাধা রহিয়াছে একপ অল্পভূত হয়; মাথাব চুল পড়িয়া যায়; মাথার পশ্চাৎ ভাগের চুলই অধিক পড়ে ।

চক্ষু। কোন একটী ভাবিবস্তু যেন চাপিয়া রহিয়াছে চক্ষুব উপরে একপ অল্পভূত হয় (কঠ, কোনারাম, জেন্স) বাহ্য দরুণ পুস্তকাদি পাঠ কবিবার সময় অক্ষর চিনিবার দ্রুত অনেক চেষ্টা বা যত্ন কবিত্তে হয়; চক্ষুর সম্মুখে যেন কাল দাগ ভাসে, উপরেব দিকে তাকাইলে চক্ষুর পেশিতে বেদনার উদ্বেক হয়; চক্ষুব পাতাব ধারের চূর্ণকানি (কার্-ফাখ্, সাল্ফ্); চক্ষুর অতিবিক্ত ব্যবহারের দরুণ দুইব বস্তু দেখিতে অশক্তি (Myopia, -Short-Sightedness) ।

কর্ণ। কানে টন্টন্ শব্দ হওয়া (একন্, বেণ্, চাঘনা, সাল্ফ্); কানের সম্মুখে যেন কোন ভাবি জব্য চাপিয়া রহিয়াছে একপ অল্পভূত হয়

(চেলিডন্), কিন্তু রোগীর কানে শুনিবার শক্তির কোনও হ্রাস হয়না; প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় বাম কর্ণ লাল এবং উষ্ণ হয় ।

নাসিকা । অনেক সম্ভাব্য ধরিয়া প্রত্যহ নাক দিয়া অধিক পরিমাণ রক্ত পড়া; প্রত্যেক বার রক্ত পড়ার পূর্বে এবং পরে রোগীর মুখমণ্ডল ফিকা বা শিটা হওয়া; বারম্বার ইঁচি এবং নাকের মধ্যে অনবিরত হুড়ু হুড়ু করা; নাকের গোড়ার কসিয়া ধরা; সন্ধি এবং তৎকরণ নাক দিয়া গাঢ় শ্বেদ্য নির্গমন ।

মুখ মণ্ডল । মুখ মণ্ডল অত্যন্ত ফিকা বা শিটা (আস্), ধূসরের আভাবুক্ত হরিজ্ঞা বর্ণ; মুখমণ্ডল মৃতবৎ (বিরেট্-আল্‌ব্); মুখমণ্ডল এবং মাড়ির হাড় টাটানি (হিপ্-বাল্‌ক্, কালী-বাই, নাট্‌ট্রিক্-আস্); মুখমণ্ডলের উর্ধ্ব এবং নিম্নাংশে কসিয়া ধরা; বাম গালে ছিঁড়িয়া ফেলার ছায় অন্বেষ্য হয় (পাল্‌স্); উপরের ওষ্ঠ এবং গাল স্ফীত এবং উচ্চাতে চিড়িক বারবার ছায় বেদনা; উপরের দন্ডান্ত্রে চিড়িক মত্তা এবং ছিঁড়িয়া ফেলার ছায় বাতনা; উপরের ওষ্ঠের স্পন্দন ।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য । সামান্য কারণেই মাড়ি দিয়া রক্ত পড়ে (মার্‌ক্, নাট্‌ট্রিক্-আস্. কন্‌); দন্ত মাড়ি-বণ (Ham-boil); কন্‌সের দাঁতে কসিয়া ধরা বা ছিঁড়িয়া ফেলার ছায় বেদনা বা বাতনা; মাড়ি হইতে দাঁত আত্মগোপন হইয়া নড়ে এবং দাঁতের গোড়ার মাংস ফুলে ও বেদনাতৃক হয় বা টাটান; চিবাইবার সময় মাড়িতে অত্যন্ত বেদনা এবং টাটানিব উদ্বেগ হয় (কষ্ট্, মার্‌ক্); জিহ্বা মাড়ি-লেশযুক্ত (অস্টি-কন্‌, লস্‌ট্, মার্‌ক্, নাক্স্. বন্‌. পাল্‌স্) এবং হারদ্রাব আভাবিত কটা বর্ণ; জিহ্বা টাটায় এবং উচ্চাতে ঢাল উত্তীর্ণ হইবার ছায় মত্তা অন্বেষ্য হয় (নাট্‌ট্রিক্-আস্); মুখগহ্বর উর্ধ্ব এবং উচ্চায় সঙ্কুচিত জিহ্বার অগভীর শুষ্ক এবং আলাপিত; মুখ অধিক পরিমাণ ঝাল জঠ; তালুকার বন্ধনাদি এবং গিল্মা শুষ্ক; হারদ্রাব পূর্ণ এবং পরে মুখে তিত্ত প্রদেহ (বস্, নাক্স্. বন্‌, পাল্‌স্.); গলা দিয়া আদক পরিমাণে শ্বেদ্য উঠে, গলার মধ্যে ঢাল উত্তীর্ণ হইবার ছায় অগভীর (আমন্-কাক্স্, কষ্ট্, কন্‌. পাল্‌স্.); প্রিনতে, কাশিতে এবং নাক ঝাড়িয়া কফ ফোঁসে; নাকের গোড়ায় মুখগহ্বরের সম্ভাব্য ভাগ এবং গলার মধ্যের

পশ্চাৎভাগে বা হওয়ার ছায় বেদনা অনুভূত হয়; আহার বহা গলনালীর উপরি-
ভাগের সন্ধোচন (বেল্, ক্যাম্প্, হায়োস্); মুখের মধ্যে শুক বোধ, অশ্বচ
পিপাসা থাকে না; গলার মধ্যে ঠাণ্ডা বোধ ।

পাকস্থলী এবং উদর । মাংসে অরুচি (আলান্, আর্বিকা,
গ্রাফাইটিস্); তৈলাক্ত বা চর্কিযুক্ত আহার দ্রব্যে অরুচি (পাল্‌স্); হৃদে
অরুচি, কারণ, হৃদ ধাইলেই পেটে দূষিত বায়ুর সঞ্চার হয় (চারনা,
সাল্‌ক্); প্রায় অনবরতই প্রবল উদগার উঠে; টক উদগার উঠে (আস্‌ত্রা,
নাক্স্ বন্, ফন্, সাল্‌ক্); উগ্র গন্ধযুক্ত বা কাঠ উদগার উঠে (পাল্‌স্);
প্রাতঃকালে বমনোদগে এবং উহাব সঙ্গে সঙ্গে পেট গুলিয়া বা মোচড়াইয়া
উঠে; চীত হইয়া শয়ন করিলে বা চলিয়া বেড়ানোর সময় পাকস্থলীতে অশ্বল
হয়; পাকস্থলীতে জ্বালা (আর্স্, ক্যাম্‌ফার, ক্যাহ্, লোবিলিয়া, সাল্‌ক্);
পাকস্থলীতে পূর্ণ এবং কসিয়া ধবার ছায় বাতনা; পাকস্থলীতে সন্ধো-
চক আক্ষেপ ঘূহা বৃক পর্যন্ত বিস্তৃত হয় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে উদর
ক্ষীত হয়; উদরোজ্জ্ব প্রদেশে অত্যন্ত টাটানি (আণ্টি-ক্রুড্, আর্স্, বেল্);
অত্যন্ত ক্ধা বা তৃষ্ণা; মুখে তিক্ত বা লোস্তা স্বাদ; আহার দ্রব্য অত্যন্ত
লোস্তা লাগে; পরিপাক শক্তির অভাৱ হ্রাস, এমন কি সামান্ত আহার
দ্রব্যও পরিপাক পায় না । উদরের পার্শ্বে, স্পর্শ করিলে বেদনার উদ্রেক
হয়,—এমন কি রোগী কোমরে কাপড় পরিতেও অত্যন্ত কষ্ট এবং বেদনা-
ভবন করে (ক্যাব্-কার্ক্, ল্যাক্, গ্রাফাইটিস্); বহুতে আঁটাবোধ এবং
স্থিতিবিধানের ছায় বেদনা বা বাতনা (ব্রাই, ক্যানী-কার্ক্, চারনা, নাক্স্ বন্,
সিপিনা); উদরে দূষিত বায়ু সঞ্চার হেতু শূল বেদনা; উদর অত্যন্ত
পূর্ণ বাহার দরুণ নহে হয় যেন উদর কাটিয়া বাইবে, সামান্ত আহার দ্রব্য
উদরস্থ হইলেই বাহার বৃদ্ধি হয় এবং গুল ছার দিয়া বায়ু নিঃসরণে বাহার
উপশম হয় (কলোন্, লাইকোপ্, চারনা, সাল্‌ক্); উদর অত্যন্ত কাঁপে,
গলা বা গুল ছার দিয়া বায়ু নিঃসরণে বাহার উপশম হয় (সাল্‌ক্);
উদর যেন অত্যন্ত ঝুলিয়া পড়িয়াছে এক্ষণ অনুভূত হয়, বাহার দরুণ
রোগী কুজা হইয়া চণিতে বাধ্য হয়, উদরের স্থানে স্থানে দূষিত বায়ুর
সঞ্চার (লাইকোপ্) ।

মল এবং মলদ্বার । শুষ্ক দ্বার দিয়া জ্বালা উৎপাদক, ক্ষতকারক
 ক্লেদ নিঃসরণ (মার্ক-কর) ; শুষ্ক মলো কামড়ানী বা ফুড় ফুড় করা ;
 কোথপাড়া বা কষ্ট দায়ক বাহের বেগ ; শুষ্কদ্বার দিয়া রক্ত পড়া ; শুষ্ক
 দ্বার দিয়া অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত বায়ু নিঃসরণ (আলোক, ব্রাই, কল্চ, মেঞ্জি-
 রিয়ান, সাইলিসি), দান্তের পর শুষ্ক দ্বারে জ্বালা (আস্, ক্যাস্, ক্যাপ্স) ;
 শুষ্ক দ্বারে ষাট্টরা ধরা, বা স্থলী বিধানের জ্বালা বেদনা বা টাটানি ;
 নরম মলও অতি কষ্টে নির্গত হয় (আলান্, নাক্স-মক্স) ; শ্লেষ্মা ভেদ
 এবং উদার সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত কোথপাড়া ; পচা মৃত দেহের গন্ধের জ্বালা
 অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত, অসাড়ে বা অনিচ্ছা পূর্বক, মল ভাগ (আস্) ; কোষ্ঠ
 বন্ধ এবং মল কঠিন ও পরিমাণে অল্প ; ফিকা তরল শ্লেষ্মা ভেদ ;
 দুর্গন্ধযুক্ত রক্ত এবং শ্লেষ্মা ভেদ ; শুষ্ক দ্বাবে নীলবর্ণ বৃহৎ প্রাকারের
 অশের বলী, যাঁহা বদ্বর্ণ শুষ্ক দ্বার অত্যন্ত জ্বালাযুক্ত হয় এবং টাটায় ।

মূত্র । মূত্র লাল তলানিপড়ে (বেল্, লাইকোপ, ক্লিরাঙ্ক, দিপিয়া) ;
 রক্তের সঙ্গে মিশ্রিত হইলে বেকপ হয়, দুই সেকপ কাল্চে লালবর্ণ (একন্,
 ক্যাস্) ; রাত্রিতে বিছানায় প্রস্রাব করা (কষ্ট, পাল্, বেল্, সিনা) ।

জননেন্দ্রিয় । শৃক্ণের নিদ্রাবস্তায় হস্ত মৈথুন ; স্ত্রী সত্বাসের সময়
 সামান্য আনন্দনেই ধাতু নির্গমন ; মলভাগের সময় ধাতু নির্গমন, যুগ্মের
 ঘোবে অজ্ঞানিত রূপে ধাতু নির্গমন । স্ত্রীলোকের নিয়মিত সময়ের অনেক
 পূর্বে অতিরিক্ত রক্তস্রাব (আমন্-কাল, আস্, ক্যাস্, ক্যাস্, নাক্স, বন্)
 বক্ত অত্যন্ত গাঢ় এবং উগ্র গন্ধযুক্ত ; প্রাতঃকালে ষেত প্রদর নিঃসরণ
 এবং সব্বদ্য দিবস কিছুই থাকে না ; দুগ্ধের জ্বালা ক্ষত কারক ষেত প্রদর
 (আস্, কোনাগন্, অক্রিয়াঙ্ক) । যোনির স্থানে স্থানে লালবর্ণ এবং ক্ষত হয় ;
 যোনিতে ঘা ও চুলকানি ; ষেত প্রদর নির্গমনের সময় যোনিদ্বারাদিতে ছাল
 উঠিয়া ঘাওয়াব জ্বালা এবং টাটানি (মার্ক) ; যোনিদ্বারে নালা
 ঘা এবং শুষ্ক জ্বালাযুক্ত বেদনা বা বাতনা ; শিশুকে স্তন্যদুগ্ধপান করান হেতু
 দুর্গন্ধতা (চায়না), স্তনের স্থানে স্থানে গ্রন্থি জ্বালা ফাঁতি এবং উদার
 সঙ্গে সঙ্গে বগলের গ্রন্থি কঠিনতা, উদারে জ্বালাযুক্ত বেদনা, উদেগ এবং
 স্বাস্থ্য প্রস্থান ঘন ঘন বা স্থায় কষ্ট ।

শ্বাস যন্ত্র । বায়ুনের উপরিভাগে খণ্ডখণ্ডে বোধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গভীর কর্কশ শব্দ প্ররোগ করার চেষ্টা করিলে শব্দ একেবারেই হয় না (কষ্ট, চায়না, ফস্, কালী-বাই) ; শ্বব স্তম্ভ এবং গলার মধ্যে ছাল উঠিয়া যাওয়ায় স্ত্রায় অনুভূত হয় এবং যাহা সঙ্কার সময় বৃদ্ধি হয় ; প্রাতঃকালে স্বরশূন্যতা (কষ্ট, ফস্) ; শ্বাস কষ্ট ; বৃকে পূর্ণবোধ এবং সামান্ত নড়াচড়াতেই হৃৎস্পন্দন ; সর্বাঙ্গী পাতার বাতাস পাইতে ইচ্ছা এবং সর্বাঙ্গী বাতাস থাওয়ার ইচ্ছা (আস্, ব্যাপ্ট্) ; আক্ষেপক, গভীর, অনিচ্ছাপূর্ণক কর্কশ কাশি, গলার মধ্যে খণ্ডখণ্ডে বোধ এবং হুড়্, হুড়ী বা চুলকানিব দৰুণ যাতন উদ্ভেক হয় ; গলা দিয়া হরিশ্রাব আভায়ুক্ত সবুজ, লোভা স্বাদ বিশিষ্ট, চট্ চট্িয়া আঠা শ্লেষ্মা নির্গমন (আস্, লাইকোপ্, ফস্, সিপিয়া) ; বৃকে তরল এবং শান্তিবোধ (হানাম্) ; কয়লার আঙুনে বেকপ হয় বৃকের মধ্যে সেকপ জ্বালা বোধ ; বৃকের মধ্যে ছাল উঠিয়া যাওয়ার স্ত্রায় জ্বালা এবং টাটানি ; বৃকে কষ্টবোধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বৃকের মধ্যে শ্লেষ্মার সাঁই সাঁই ঘড়্ ঘড়্ শব্দ হওয়া (আস্টি-টাইট্) ; বৃকের উপরিভাগের ডাইন পার্শ্বে চাপিয়া ধরার স্ত্রায় বেদনা ; বৃকের বাম পার্শ্বে ছিড়িয়া ফেলার স্ত্রায় বাতন ; অনেক কাল ব্যাপিয়া স্বরভঙ্গ, সঙ্কার সময় এবং কথা বলিলে যাহার বৃদ্ধি হয় ; স্বরশূন্যতা ; কাশি এবং গলা দিয়া রক্তমিশ্রিত শ্লেষ্মা নির্গমন এবং উহা ব সঙ্গে সঙ্গে বৃকের মধ্যে জ্বালা ; কাশি এবং কেবল প্রাতঃকালেই গলা দিয়া শ্লেষ্মাদি নির্গমন ; আহান বা পানের পর বা কথা বলিলে কাশির বৃদ্ধি ।

হৃৎপিণ্ড এবং নাড়ী । নাড়ী স্তম্ভবৎ স্তম্ভ, তরল, লুপ্তপ্রার বা লুপ্ত (একন্, আস্, ক্যাম্ফাব) ; হৃৎস্পন্দন ; শ্বাস প্রস্থাস হৃৎপিণ্ডের বাস্তবিক অস্তিত্বের স্ত্রায় ।

ঘাড় এবং পৃষ্ঠদেশ । গ্রীবার গ্রন্থিগুলি ক্ষীণ এবং বেদনাসূক্ত (বায়ানাইটা-কার্ক্, ক্যাব-কার্ক্) ; ঘাড়ের গ্রন্থিগুলিই আধক ক্ষীণ হয় ; গ্রীবার পেশী গুলিতে ছিড়িয়া ফেলার স্ত্রায় বেদনা ; বাত রোগে বেকপ হয় গ্রীবা এবং পৃষ্ঠদেশে সেকপ কসিয়া ধরার স্ত্রায় বেদনা ; ডাইন স্ক্যাহিতে জ্বালা ; কোমরের পশ্চাৎভাগে প্রবল বেদনা ; বোগী (স্ত্রালোক্) প্রথমতঃ বসিতে পারে না, তৎপর সে মনে করে যেন তাহার পৃষ্ঠদেশে একখানি কাঠ

ছুটিয়া রহিয়াছে যাহার দরুণ সে তাহার পৃষ্ঠের নীচে একটা বালিস রাখিতে বাধ্য হয়; মেকদণ্ডের নিম্নভাগে এবং গুহ দ্বারের ঠিক উপরি ভাগের হাড় চাপিয়া ধরার জ্বায় বেদনা বা টাটানি ।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, হাত, পা ইত্যাদি । সমুদয় অঙ্গে অবশবোণ; চাপিয়া শয়ন করিলে অঙ্গ একেবারে অসাড় হয়; সমুদয় অঙ্গে কসিয়া ধরা বা ছিড়িয়া ফেলার জ্বায় বেদনা (ব্রাই, কলোস্, লাইকোপ্, মার্ক্); সমুদয় অঙ্গে মোচড়াইয়া পড়ার জ্বায় বেদনা । ডাইন স্কন্ধে অলোপুভব; ছুই কনুইয়ের সন্ধিতেই মোচড়াইয়া পড়ার জ্বায় বেদনা; বাম হাতের কনুই হইতে হাতের পাতা পর্য্যন্ত ছিড়িয়া ফেলা এবং কসিয়া ধরার জ্বায় বেদনা বা বাতনা; ছুই হাতের মণিবন্ধেই ছিড়িয়া ফেলার জ্বায় বেদনা; বাম হাতের অঙ্গুলে ছিড়িয়া ফেলার জ্বায় বেদনা । কুচকির সন্ধিতে কসিয়া ধরার জ্বায় বেদনা যাহা উরু দেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়; গা শক্ত হয় বা উহা নোবান যায় না, যাহার দরুণ প্রথম চলিবার সময় পা টলে; পক্ষাঘাতে যেক্রপ হয় উদর হইতে বাম পা পর্য্যন্ত কসিয়া ধরার জ্বায় সেরূপ বাতনা; পায়ের পাতার তলায় খিল ধরা (সাইলিনি); সন্ধার সময় শয়ন করার পর পায়ের পাতার তলায় খিল ধরা; হাত, পা বরকের জ্বায় শীতল; পায় খিল ধরা (সাল্ফ) (রাত্রিতে); পায়ের পাতায় ঘর্ম্ম; পায় ভর্গন্ধযুক্ত ঘর্ম্ম; পায় ভর্গন্ধযুক্ত ক্ষত বাহা হইতে সহজে রক্ত পড়ে; পায়ের আঙ্গুল লালবর্ণ এবং ক্ষীত ।

চর্ম্ম । গায় আর্দ্র কুস্কড়ী এবং যেখানে কুস্কড়ী নাই সেখানে জালা; গায় ক্ষত বাহা হইতে সহজেই রক্ত পড়ে (অসাকিটিডা, মার্ক্); ভর্গন্ধযুক্ত ক্ষত এবং উহাতে জালাযুক্ত বেদনা (আস্); শরীরের না না স্থানে জালা; আমবাত (Urticaria) ।

নিদ্রা । দিনেরবেলা ঘুমের অভ্যস্ত ইচ্ছা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বারবার হাইতোলা,—চলিলে ঘুমের ইচ্ছা দূরীভূত হয়; রাত্রিতে নিদ্রা-শূন্যতা; রাত্রিতে ঘুমেরঘোরে সৰ্বদাই ভয়ানক স্বপ্ন দেখা ।

জ্বর । সন্ধার সময় শীত কম্প এবং তপ্পনতা; কখন কখন শীত শরীরের এক পার্শ্বেই সঞ্চিত হয়; শীতলাবস্থায়ই কেবল পিপাসা এবং হাত পায়ের পাতা শীতল বাহা সন্ধার সময়ই অধিক হয়; জ্বরের সঙ্গে প্রায়ই

পিপাসা থাকে না (পাল্‌স্) ; প্যুজি রসক্ষয় হেতু জ্বর বা হেকটিক-ফিবার (Hoctic Fever) ; অত্যন্ত দুর্বল কারক ঘর্ম (চায়না, ফস্-আস্) ; নাড়ী দ্রুতগামী, অত্যন্ত দুর্বল বা ক্ষীণ অথবা একবারে লুপ্ত (যেমন ওলাউঠার পতনাবস্থায় হইয়া থাকে) ; সবিরাম-জ্বর এবং কেবল শীতলাবস্থায়ই পিপাসা এবং তৎপর শরীর অত্যন্ত উষ্ণ হওয়ার পর ঘর্ম হয় ; রাত্রিতে ঘর্ম (কপালে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম) ।

ব্যবহার । কোইনাইনের অপব্যবহার জনিত অসুখ (প্রধানতঃ সবিরাম বা স্থল-বিরাম জ্বরে) ; পাবাব অপব্যবহার জনিত অসুখ ; অতিরিক্ত লবণ বা লবণাক্ত মাচ মাংস খাওয়া, পচা মাচ, মাংস বা চর্বিযুক্ত বা পচাদ্রব্য খাওয়ার দরুণ অসুখ ; মুখে বা বা দাঁতের গোড়া দিয়া রক্ত পড়া ; মুখ দিয়া জল উঠা ; অজীর্ণ, পাকস্থলিতে বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বমন ; উদরাময় ; কোষ্ঠবদ্ধ ; অর্শরোগ ; স্বরভঙ্গ ; স্বরশূন্যতা ; ফুফুসের হৃদয় হৃদয় বায়ুনলের বিস্তৃতি (Emphysema) ; বায়ুনল প্রদাহ ; হাঁপানি কাশি ; যক্ষাক্রান্ত ; সবিরাম বা পালজ্বর ; আত্মিক-জ্বর বা জ্বর বিকার ; ক্ষত ; বিকচ (Eczoma) ; গ্রন্থির অসুখ ; স্নায়িক পাণ্ডুরোগ (Chlorosis) ; গায় পচাযুক্ত ঘা বা গ্যাঙ্গ্রিন্ (Gangrene) ; ওলাউঠার পতনাবস্থায় পেট ফাঁপা, বুকে আঁটা বোধ, শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট বোধ, ভেদবর্মী বদ্ধ, অথবা দুর্গন্ধযুক্ত কুমড়া পচা জলের স্থায় তরল ভেদ, নাড়ী স্রবৎ হৃদয় বা একেবারেই লুপ্ত, পিপাসা অথবা পিপাসা কোন কোন রোগীর থাকেও না, সমুদয় শরীর ঠাণ্ডা, বিশেষতঃ হাত পায়ে পাতা, হাত পায়ে আঙ্গুল অনেকক্ষণ জলে ভিজাইয়া রাখিলে যেকপ হয়, সরুপ কঁোকড়া, কপাল এবং গ্রাবায় বিন্দু বিন্দু ঘর্ম বা সমুদয় শরীর প্রচুর চট্‌চট্‌তা শীতল ঘষে আবৃত, স্বরভঙ্গ, মুখমণ্ডল এবং চক্ষু বসিয়া যায়, জিহ্বা ঠাণ্ডা, শ্বাস ঠাণ্ডা ইত্যাদি লক্ষণে কার্বো বেজিটেবিলিস্ বিশেষ উপকারী । ইউরোপীয় হোনিওপ্যাথিক চিকিৎসকগণ বলেন যে ওলাউঠার পতনাবস্থায় সঙ্গে কার্বো বেজিটেবিলিসের লক্ষণের সাদৃশ্য নাই । কিন্তু এতদ্বন্ধে ওলাউঠার পতনাবস্থায় উক্ত লক্ষণ বর্তমানে এই ঔষধ দ্বারা আমরা অনেক সময় আশাতিরিক্ত ফল পাইয়া থাকি ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । জ্বালাযুক্ত বেদনা ; সামান্য শরী-

রিক পরিশ্রমেই অত্যন্ত দুর্বলতা বা অবসন্নতা ; রোগী সর্বদা বাতাস খাইতে চাহে এবং পাখা দিয়া তাহার গায় অনবরত বাতাস দিতে বলে ; মল, মূত্র, লাল, ঘর্ম, বা পুঁয়াদি অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত ; রক্তশ্রাব, শ্বেতশ্রাব, উদরাময় ইত্যাদির পরবর্তী অস্থি ; অত্যন্ত বলক্ষয় ; সমুদ্র শরীর নীলবর্ণ হওয়া ; ক্ষত বা ঘাহইতে সহজে রক্ত পড়া ; প্রাণকাল, সন্ধ্যার সময় এবং রাত্রিতে অস্থিরতার বৃদ্ধি ; বেলা দুই প্রহরের সময় দুর্বলতার বৃদ্ধি ; গরম, শেত শেতিয়া বায়ু, বায়ুর অবস্থার পরিবর্তন বা কোন প্রকার ভারি বস্তু উঠাইলে অস্থিরতার বৃদ্ধি ইত্যাদি কার্কো বেঞ্জিটেবিলিসের কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ । ডাক্তার হিউগ্জ (Dr Hughes) বলেন যে লাইকোপডিয়াম্, বিরেট্রাম্ আল্‌বাম্ এবং কার্কোলিক্ আসিড্ ইত্যাদিই কার্কো বেঞ্জিটেবিলিসের প্রকৃত সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ মধ্যে পরিগণিত । এতদ্ভিন্ন আসিনিক্, চারনা, ল্যাকেসিস্, নাক্স বমিকা, মার্কিউরিয়াসের কার্যের সঙ্গেও কোন কোন বিষয়ে কার্কো বেঞ্জিটেবিলিসের কার্যের সাদৃশ্য আছে ।

প্রতিষেধক ঔষধ । আসিনিক্, ক্যাম্ফার, ককিয়া, ল্যাকেসিস্ ইত্যাদি কার্কো বেঞ্জিটেবিলিসের প্রতিষেধক ঔষধ মধ্যে পরিগণিত ।

ডাইলুশন বিচার । ৬ এবং ১২ ক্রমই সচরাচর সমুদ্র অস্থির ব্যবহৃত হইয়া থাকে । ওলাউঠার পতনাবস্থায় ১২ এবং ৩০ ডাইলুশন বিশেষ উপকারী । পাকস্থল্যের পুরাতন অস্থির বা অর্জীর্ণ রোগে, (বিশেষতঃ শিশু, ছোট বালক বালিকাগণের) বুক জ্বালায় পক্ষে ৩ ক্রমের শুঁড়া অস্ত্রান্ত্র ক্রম অপেক্ষা অধিক উপকারী । কখন কখন কোন কোন রোগে এই ঔষধের ১০০ এবং ২০০ ডাইলুশনও ব্যবহৃত হইয়া থাকে । ওলাউঠার পতনাবস্থায় লেখক ৩০ ডাইলুশন ব্যবহার করিয়া অস্ত্রান্ত্র ডাইলুশন অপেক্ষা অধিক উপকার পাইয়া থাকেন ।

ক্যামোমিলা,—ক্যাম্ ।

(CHAMOMILLA,—CHAM.)

ইউরোপের অনেক স্থানে শস্ত ক্ষেত্রে, জঙ্গল জমিতে অথবা রাস্তার ধারে এই গাছ জন্মে । যখন ফুল হয় তখন ইহার সমুদয় গাছ লইয়া উহা দ্বারা ২০ ডিগ্রী ওয়ার প্রফ্ স্পিরিটে বথানিয়মে ইহার মূল আরোক প্রস্তুত হয় ।

সাধারণ ক্রিয়া । স্নায়বিক মণ্ডলীর উপর ইহার কার্য অতি প্রবল । ইহা সমুদয় স্নায়বিক মণ্ডলীকে অতিবিক্ত পরিমাণে উত্তেজিত করে এবং তদনুগত স্নায়ু গতি উৎপাদক শক্তির হ্রাস বা অবসন্নতা হওয়া হেতু অত্যন্ত দুর্বলতা বা বলক্ষয় হয় । স্নায়বিক মণ্ডলীর মধ্য দিয়া যুক্ত এবং পরিপাক ও শ্বাস প্রশ্বাস কায্য সম্বন্ধীয় বস্তুদির শৈল্পিক ক্রমের উপর ইহার কার্য প্রবল হওয়া হেতু উক্ত বস্তুগুলি উত্তেজিত হইয়া উহাতে রক্তাধিক্য বা রক্তাববোধ এবং শ্লেষ্মার সঞ্চয় হয় ও উহাতে অজ্ঞান প্রকারের বিকৃতাবস্থা উৎপন্ন হইয়া থাকে ।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মন । মনের উত্তেজনা এবং চিন্তা ; মনের অশান্তি ; সামান্য কারণেও খিট্‌খিট্‌ করা এবং বক্বক্ব করা (একন্, এবিস্-ক্যান্) ; সর্বদা চিড়্‌চিড়্‌ করা এবং অধৈর্য্যতা (আনাকার্ড্, ব্রাই, নাক্স্-বম্, হিপ্-সাল্‌ফ্) ; সর্বদা রাগ প্রকাশ করা (কাক্-ফস, কষ্ট, বোরাক্স্) ; সর্বদা চিড়্‌চিড়্‌ করা (ব্রাই) ; সর্বদা অস্থিরতা ; রোগী (শিশু বা ছোট বালক বালিকা হইলে) অনেক প্রকারের দ্রব্য চাহে যাচা দিলে সে লয় না (ব্রাই, সিনা) ; রোগী (শিশু হইলে) সর্বদা কাঁদে বটে, কিন্তু তাহাকে কোলে কারয়া বেড়াইলে সে আর কাঁদে না ; লিখিবার বা পড়িবার সময় মধ্যে মধ্যে শব্দ ছাড় যায় (লোইকোপ্, নাক্স্-মফ্) ; অসহ্য বেদনা বাহার দরুন রোগী পাগলের স্থায় অস্থির হইয়া পড়ে (চায়না, কফিয়া) ; সর্বদা ঝগড়া করার ইচ্ছা ; নিরাশার আব ।

মস্তক । মাথায় গোলমেলে বোধ ; আহারের পর মাথাধোরা (নাক্স্-বম্) অথবা বিছানা হইতে উঠিলে মাথাধোরা (একন্, ব্রাই, ফস্) ;

কপালের পার্শ্বে আঙ্গুল দিয়া চাপিয়া ধরার ভ্রায় চাপাবৃত্ত বেদনা ; কপালের এক পার্শ্বের স্থানে স্থানে ছুরী দিয়া কাটাৰ ভ্রায় বেদনা অথবা আধ্‌কপালিয়া (একপেশে) মাথা বেদনা ; মস্তিষ্কের এক অর্দ্ধাংশে ক্ষণিক মপদপানি ; মাথার উপরিভাগ হইতে কপাল এবং কপালের দুই পার্শ্ব পর্য্যন্ত চাপা বোধ ; বেদনাদির কথা শ্রবণ পড়িলেই বেদনাদির বৃদ্ধি হয় (ইগ্নেস্) ; হঠাৎ মাথা হেট করিলে অথবা মানসিক পরিশ্রমে বেদনাদির বৃদ্ধি ; মাথায় উষ্ণ ঘর্ষ ।

চক্ষু । প্রাতঃকালে চক্ষু ক্ষীত হয় ; কেতুর বা পূৰ্ব্বে সংযুক্ত শ্লেষ্মা দ্বারা চক্ষুৰ পাতায় পাতায় লাগিয়া থাকে (ক্যাক্স-ক্যাক্স, লাইকোপ্, মার্ক্, পাল্‌স্, সাইলিসি, সাল্‌ক্) ; চক্ষুর কোটরে অত্যন্ত চাপা বোধ ; চারিদিক হইতে চাপিলে বেক্রপ হয়, চক্ষুর গোণকে সেকপ অস্থিত হয় এবং তদ্রূপ চক্ষে রূপকালের ভ্রাতৃ অন্ধকার দেখায় ; চক্ষে আলায়ুক্ত উষ্ণাত্তভব ; চক্ষু প্রদাহ, বিশেষতঃ চক্ষুর নিম্ন পাতায় ধারের ; চক্ষুর স্বেতাংশ হরিত্রা বর্ণ ; চক্ষুর পাতার স্পন্দন ; চক্ষু দিয়া রক্ত পড়া ।

কর্ণ । স্রোতের ভ্রায় প্রবল বেগে জল বহিয়া যাইলে সেকপ হয়, কানের মধ্যে সেকপ সৌ সৌ শব্দ হয় (ককিউলাস্, জেল্‌স্) ; কানে চাপিয়া ধরার ভ্রায় বেদনা ; কানের মধ্যে ছিড়িয়া ফেলা বা চিড়ক মারার ভ্রায় বেদনা বা ব্যতনা (মার্ক্, পাল্‌স্) ; কর্ণমূলস্থ গ্রন্থির প্রদাহ (Parotitis) ।

নাসিকা । সমুদয় প্রকার গন্ধহ নাকে লাগে বা অসহ্য হয় (একন্, আগারিকাশ্, অরাম্, বেল্, কল্‌চ্, তিপ সাল্‌ক্) ; হাঁচি দেওয়ার উচ্ছা এবং নাকের মধ্যে স্ফুটুড়ী বা শুষ্কাত্তভব ; নাসারন্ধ্র রুদ্ধ হইয়া থাকে ; সন্ধি হওয়ার পূর্বে বেক্রপ হয় নাকের মধ্যে সেকপ অস্থিত হয় ; নাক দিয়া রক্ত পড়া ।

মুখমণ্ডল । একগাল গাল বর্ণ ও অপর গাল মলিন বা ফিকা (একন্, অগ্নিকা) ; মুখমণ্ডলে আলায়ুক্তভব ; মাড়িতে স্ফটাবিধানের ভ্রায় বেদনা বা ব্যতনা বাধ্য কনের শেষ দাঁত বা কর্ণপর্য্যন্তও বিস্তৃত হয় ।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য । ওষ্ঠ কাটাযুক্ত এবং উচ্ছায়ে মরা চৰ্ম্ম উঠে ; ঠাণ্ডা লাগিয়া, আহারের পর অথবা বিছানার উষ্ণতাতে অথবা উষ্ণ ঘরে দাঁতের গোড়ায় কদিয়া ধরা বা স্ফটাবিধানের ভ্রায় বেদনা (মার্ক্),

কোন প্রকার উষ্ণ দ্রব্য পানে দাঁতে বেদনা (পাল্‌স্); দাঁত যেন আভাবিক অপেক্ষা অনেক লম্বা হইয়াছে এক্রপ অন্তত্ব হর (কষ্ট, লাইকোপ্, নাইট্রিক্ আস্); মুখে ধাতুর স্বাদ বা মিষ্ট স্বাদনিশিষ্ট লাল উঠে (ফাইটোল্, কস্, প্রাথম্, পাল্‌স্); মুখে তিক্ত স্বাদ (আস্, ব্রাই, কলোস্, চায়না, নাক্স্, বম্, পাল্‌স্, সাল্‌ক্); মুখে পচা উগ্র গন্ধযুক্ত চর্নিব স্বাদ (কষ্ট, পাল্‌স্); জিহবার উপর এবং নীচে ফোঁসী পড়া এবং উঠাতে ভল ফুটানের স্থায় বেদনা বা ব্যতনা; মুখে তুর্গন্ধ; মুখ গহ্বর ও জিহ্বা উষ্ণ এবং শুষ্ক এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পিপাসা; জিহ্বা লাল এবং কাটাকৃত; কোমল তালুকা এবং টনসিল ক্ষীত ও কালচে লালবর্ণ; ডেলার স্থায় কোন পদার্থ লাগিয়া রহিয়াছে গলার মধ্যে এক্রপ অন্তত্ব হয়। আহারবহা গলনালীর আক্ষেপিক সঙ্কোচন; গলার মধ্যে বেদনা এবং কর্ণমূলস্থ গ্রাস্তব ক্ষীতি।

পাকস্থলী এবং উদর। পচা ডিমের গন্ধযুক্ত উদার উঠা (আগারিকাশ্, অ্যান্টি-টাইট্, আনকা, সোরিনাম্, সিপিয়া); অত্যন্ত পিপাসা এবং ঠাণ্ডা ভল খাওয়ার অত্যন্ত ইচ্ছা; বমনোদেগ; টক স্বাদ বিশিষ্ট পদার্থ বমন; একপানি পান্য বসাইয়া রাখিলে যেক্রপ হর, আহারের পর পাকস্থলীতে সেরূপ চাপাবোধ (আস্, ব্রাই, পাল্‌স্); পাকস্থলী এবং খাট পাজরার হাড়ের নীচে চাপসা ধরার স্থায় বেদনা যাহার দরুণ স্বাস প্রশ্বাসের ব্যাঘাত জন্মে; আহারে আনচ্ছা; প্রাতঃকালে মুখে তিক্ত স্বাদ; তিক্তস্বাদ বিশিষ্ট পিত্ত বমন; রাগ হইলেই পেটে শূল বেদনার স্থায় বেদনার উদ্বেক হয়; পাকস্থলীতে জ্বালা, নাভিগ্রদেশ এবং উদরের দুই পার্শ্বে শূল বেদনার স্থায় বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কোমরে ভাজিয়া যাওয়ার স্থায় বেদনা বা ব্যতনা; উদরে ঘাটয়া ধরার স্থায় বা কর্তনবৎ বেদনা; উদর ঢাকের স্থায় ক্ষীত (কাঙ্কা-বেজ্, চায়না) বাহা চাপিলে অত্যন্ত বেদনায়ুক্ত হয়; উদরের এক পার্শ্ব হইতে অপব পার্শ্ব পর্য্যন্ত নাভির উপাভাগে বেদনা বাহা ডাইন পার্শ্বে আরম্ভ হইয়া বাম পার্শ্বে পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়।

মল এবং মলদ্বার। অর্শ রোগ, কিন্তু উহার দরুণ মলত্যাগের সময় শুষ্ক দ্বার দিয়া রক্ত পড়ে না (Blind Piles) (ব্রোমিন্, নাক্স্, বম্); সাদা

চট্‌চটিয়া পদার্থ ভেদ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পেট কামড়ানী বা শূল বেদনা ; সবুজ বর্ণের বেদনাহীন জলবৎ তরল ভেদ (সাল্‌ফ্‌) ; উষ্ণ, পচা ডিমের গন্ধযুক্ত মলভাগ (আক্টিপিয়াস্-টুবার, ক্যাক্-কার্ক্‌) ; সবুজবর্ণের, ক্ষতকারক, জলবৎ তরল ভেদ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পেটকামড়ানী বা শূল বেদনা (সাল্‌ফ্‌), পিপাসা, মুখে তিক্ত স্বাদ এবং তিক্ত উদগার, উঠা ; শিশুগণের দীর্ঘ উঠার সময় উদরানয় ।

মূত্রযন্ত্র । মূত্র নিঃসারক নালীর (Ureters) দিকে প্রসব বেদনার স্রাব বেদনা বাহ্যার দক্ষণ মূত্রত্যাগের বারম্বার ইচ্ছা হয় ; মূত্র ত্যাগের সময় মূত্রাধারের গ্রীবাতে জ্বালানুভব ।

জননেন্দ্রিয় । জীলোকের গুহ দ্বারের ঠিক উপরিভাগে কসিয়া ধরা ; জরায়ুর মধ্যে শূল বা চিমটিকাটার স্রাব বেদনা এবং তৎপর জরায়ু হইতে বড় বড় চাপ চাপ, থানা থানা রক্ত নির্গমন ; জরায়ু হইতে প্রচুর পরিমাণে চাপ চাপ থানা থানা রক্তস্রাব এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে জরায়ুতে প্রসব বেদনার স্রাব অত্যন্ত প্রবল বেদনা এবং পায়ে ছিড়িয়া ফেলার স্রাব বেদনা বা বাতনা (সিমিসিফ্‌, পাল্‌স্‌) ; হরিদ্রা বর্ণের জলবৎ উগ্র জ্বালা উৎপাদক স্রব প্রদর নিঃসরণ ; স্তনের বোটা প্রদাহযুক্ত হয় এবং টাটায় ; স্তন কঠিন এবং সামান্য স্পর্শনেই টাটায় (ব্রাই, কোনায়াম্‌) ; স্তন্য প্রসবের পর জরায়ুতে অত্যন্ত কষ্টদায়ক বেদনা ; স্তন্য প্রসবের পর জরায়ু হইতে ক্লোদ (Lochia) নিঃসরণ বন্ধ হইয়া তৎপর উদরানয়, পেটকামড়ানী এবং দন্তশূল ; স্তন্য প্রসবের পর অন্ত্রবেষ্ট কিল্লীপ্রদাহ (Puerperal Peritonitis) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে শরীর অত্যন্ত উষ্ণ, মনের উদ্বেগ এবং মুচ্ছার ভাব, মুখমণ্ডল লালবর্ণ, বিশেষতঃ একগাল ; অন্ত্রবেষ্ট কিল্লীতে শূণ্যের সঞ্চার ; স্তন্য প্রসবের পর স্তনে দুধ থাকে না ।

স্থান বস্তু । বায়ুনলে চাপা বোধ এবং তদ্রূপ গলায় নধা উত্তেজিত হইয়া কাশির উদ্বেগ ; কর্ণনালীতে ছাল উঠিয়া বাওয়ার স্রাব অহুত হয় (নাক্সবম্‌) ; রাত্রি ছই প্রহরের সময় কাশির আক্রমণ বাহ্যার দক্ষণ রোগী (জীলোক) মনে করে যেন কোন পদার্থ গলায় মধ্যে নিম্নদিক হইতে উঠিয়া লাগিয়া থাকিয়া তাহার নিশ্বাস বন্ধ করিতেছে ; ঘূমের ঘোরে প্রবল

শুক কাশি ; শ্বাস প্রশ্বাসের সময় বায়নলের মধ্যে সাঁই সাঁই ঘড়্ ঘড়্ শব্দ হয় (আন্টি-ক্রুড্, ইপিকাক্) ; বুকের উপরিভাগের সঙ্কোচন বা উহাতে আঁটা বোধ ; বুকে স্থী বিধানের ত্রায় বেদনা (ব্রাই, ক্যাস্, ক্যালী-ক্যার্ক্) ; রাত্রিতে শিশুগণের (ঘুমেরঘোরেও) খুশ্-খুশ্ কাশি ; বুকের মধ্যে আলাহুভ্বী । স্বপ্পন্দন ।

পৃষ্ঠদেশ । পৃষ্ঠ দেশ এবং কোমরের পেশীতে থেঁৎলিয়া যাওয়া না মোচড়াইয়া পড়ার ত্রায় বেদনা (আর্গিকা, ব্রাই) ; গুহ দ্বারের ঠিক উপরি-ভাগে বেদনা, বিশেষতঃ রাত্রিতে ; পৃষ্ঠ দেশে কসিয়া ধরার ত্রায় বেদনা ।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, হাত, পা ইত্যাদি । আক্রান্ত অঙ্গের হাড়ের আব-রক পর্দায় (Periosteum) বেদনা এবং উক্ত অঙ্গের পক্ষাঘাতের ত্রায় দুর্ব্ব-লতা ; মোচড়াইয়া পড়িলে বা ক্রান্ত হইলে যেরূপ হয় সন্ধিতে সেরূপ টাটানি, এবং হাত, পায়ের পাতা সঞ্চালনে অশক্তি ; বাহ্যে অবশ বা অসাড় বোধ (লাইকোপ্), বিশেষতঃ কোন দ্রব্য ধরিবার সময় ; বাহ্যে আক্ষেপ এবং হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলী হাতের পাতার তালুর দিকে আকৃষ্ট হয় । পায়ের ডিমে (খোড়ায়) খিল ধরা (ক্যাক্-কার্ক্, ক্যাম্ফার, নাক্স বম্, সাইলিসি, সাল্ফ্, কুপ্রাম্, হায়োস্, নাইট্রিক্-অ্যাস্) ; কোন প্রাণী হামাদিয়া গেলে যেরূপ হয়, পায়ের ডিমে সেরূপ হুড়্-হুড়্ করা এবং উহাতে জারিবোধ ; পায়ের পাতার তলার আলাবোধ (ক্যাক্-কার্ক্, সাইলিসি) যাহার দরুণ রোগী বিছানা ছাড়িয়া ঠাণ্ডা মাটিতে চলিয়া বেড়াইতে বাধ্য হয় (সাল্ফ্) ।

নিদ্রা । ঘুমের ইচ্ছা রহিয়াছে, অথচ রোগী ঘুমাইতে পারে না (বেল্, ল্যাক্, ওপিয়াম্) ; অস্থির নিদ্রা বা বারম্বার ঘুম ভাঙ্গিয়া যাওয়া এবং ঘুমেরঘোরে কৌথানী বা কৌকানী, চমকিয়া উঠা, কাদিয়া উঠা, বিছানায় বারম্বার এপাশ ওপাশ করিয়া ছট্-ফট্ করা এবং কথা বলা ।

চর্ম্ম । চর্ম্ম অস্থির যাহার দরুণ সামান্য আঘাত লাগিলেই বা হয় এবং ঘায়ে পূর্ব উৎপন্ন হয় (বোরাক্স্, গ্রাফ্, হিপ্-সাল্ফ্, সাইলিসি, সাল্ফ্) ; গালে লালবর্ণ ক্ষুদ্রী হয় (শিশুগণ এবং যে সকল জ্বীলোক শিশু-গণকে স্তন দ্বারা পান করায় তাহাদিগের) ; চর্ম্ম কামল রোগের ত্রায় হরিদ্রা বর্ণ হয় ; ঘর্ষযুক্ত স্থান চুলকাই ।

জ্বর । সমুদয় শরীরেই শীত বোধ এবং উষ্ণতার সঙ্গে সঙ্গে মুখমণ্ডল ও চক্ষে অত্যন্ত আগাযুক্ত উষ্ণাভাব এবং নিখাস উষ্ণ ; শরীরের পশ্চাৎ ভাগে ঠাণ্ডা বোধ এবং সমুখ ভাগে গরম বোধ অথবা পশ্চাৎভাগে গরমবোধ এবং সমুখ ভাগে ঠাণ্ডা বোধ ; সামান্য শীত কম্প এবং উষ্ণতার সঙ্গে সঙ্গে পৃষ্ঠ দেশ এবং উদরে পর্যায়ক্রমে উষ্ণাভাবের ছায় হুড় হুড়ী ; শরীরের স্থানে স্থানে একবার শীত বোধ, এবং একবার গরম বোধ (কার্ক-কার্ক) ; মাথা এবং মুখ মণ্ডলে উষ্ণাভাব (একন্, বেল্) ; গায় বাতাস লাগিলেই শীত বোধ ; আবৃত স্থানে প্রচুর উষ্ণ বর্ষ্য হয় (বেল্) ; নখা এবং কপালে বর্ষ্য । এক গাল লাল এবং অপর গাল ফিকা, শিটা বা বলিন ; নাড়ী ক্ষুদ্র, আঁটা এবং দ্রুতগামী ।

বাবহার । কোপ জনিত অস্থ (একন্, ব্রাই) ; স্থানিক উত্তেজনা হেতু জ্বর, অর্থাৎ শিশুর দাঁত উঠা, অজীব, ক্রমিক উত্তেজনা বা যন্ত্রের অস্থ জনিত জ্বর ; উক্ত কারণে উদবামব এবং আক্ষেপ (Convulsions) ; শিরঃ-পীড়া, কর্ণশূল, দন্তশূল, মুখমণ্ডল এবং গ্রীবার অ্যাস্থূল, উদরে শূল বেদনার ছায় বেদনা ; সকল প্রকারের প্লেগা জনিত অস্থ, অজীর্ণরোগ, কঠকর রক্তস্রাব এবং বাধকের বেদনা, জরায়ু হঠাৎ অতিরিক্ত রক্তস্রাব (Metrorrhagia), পেশী এবং সন্ধিবাত, উষ্ণতার সঙ্গে সঙ্গে স্রাববিক মণ্ডনীয় অত্যন্ত উত্তেজনা এবং স্থান পরিবর্তনকারি বেদনা নাহাব দরুন বোর্গি বিতানা ছাড়িয়া ছুটিয়া বেড়াইতে বাধ্য হয় ; গায় পূর্ণ সম্বলিত গভীর বা ভাসান বা ; কোপ জনিত কামল রোগ ; নব প্রসূত শিশুর চক্ষুপদাহ ; মাথা লাগিয়া বাতাক্রান্ত রোগীর চক্ষু প্রদাহ ; সন্তান প্রসবের পর অধরেকিকীপ্রদাহ (Puerperal Peritonitis) ; স্তনের প্রদাহ, ক্ষতি এবং কঠিনতা ; পায়ে ব্রিসে খিল ধরা ; হিষ্টিরিয়ার লক্ষণাক্রান্ত আক্ষেপ ; উদরের স্থানে স্থান দাবান বায়ুর অতিরিক্ত সঞ্চার হেতু শূল বেদনা উভয়দি অস্থে ক্যামোমিলা বিশেষ উপকারী ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । শিশু এবং ছোট বালক বালিকা ব অস্থ ; রোগী বেদনাদি একবাবুই সহ্য করিতে পারে না ; বেদনাদি আরম্ভ হইলেই অত্যন্ত চর্কলতা ; রাহিতে বেদনাদির বন্ধি এবং উষ্ণতার সঙ্গে সঙ্গে পিপাসা এবং উষ্ণাভাব ; একগাল লাল ও উষ্ণ এবং অপর গাল ঠাণ্ডা

এক ফিকা বা মলিন ; রোগী (শিশু) সৰ্বদা খিট্ খিট্ করে এবং কোলে চাপিয়া বেড়াইতে চাহে ; শিশুগণের দাঁত উঠার সময় সবুজ বর্ণের তরল প্লেম্বাদি ভেঙ্গ এবং আক্ষেপ ; প্রাতঃকালে, রাত্রিতে, ক্রোধে, ঠাণ্ডা লাগিলে, শয়ন করিলে, ঘর্ম্মাবস্থায় এবং ঘুমের অবস্থায় অশ্রুতের বৃদ্ধি এবং ঘর্ম্ম হওয়ার পর, বস্তু অবস্থা হইতে উঠিলে অথবা নড়াচড়াতে অশ্রুতের উপ-
শমন ; ঝারবিক মণ্ডল উত্তেজিত হওয়ার ধাতু ; পেশী বা সন্ধিবাতের ধাতু ইত্যাদি ক্যামোমিলার কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক নির্দিষ্ট লক্ষণ ।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ । ঝারবিক মণ্ডলীর উপর ক্যামোমিলার কার্যের সঙ্গে আগারিক্যাণ্, বেলাডোনা, ককিয়া, হায়োয়াথেমাস্, ইথ্রে-
সিয়া এবং ট্র্যামোনিয়ানের কার্যের অনেক সাদৃশ্য আছে । এতস্ত্রি কোন কোন বিষয়ে ইহার কার্যের সঙ্গে একোনাইট্, আর্সিনিক্, ব্রাইওনিয়া, চায়না, সিনা, ককিউলাস্, কলোসিস্, গ্রাফাইটিস্, হিপার সাল্‌ফিউরিস্, ম্যাগ্নেসিয়া কার্বোয়ানিকা, নাকিউরিয়াম্, নাক্স্ বমিকা, পাল্‌সেটিলা এবং সাল্‌ফারের কার্যের সাদৃশ্য আছে ।

প্রতিষেধক ঔষধ । একোনাইট্, ক্যাম্ফার, ককিউলাস্, ককিয়া, ইথ্রেসিয়া, নাক্স্ বমিকা, পাল্‌সেটিলা, কলোসিস্ ইত্যাদি ক্যামোমিলার প্রতিষেধক ঔষধ মধ্যে পরিগণিত ।

ডাইলুশন বিচার । ৬ এবং ১২ ডাইলুশনই সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে । শিশুগণের দাঁত উঠার সময়ের অশ্রুতে ১২ ডাইলুশন বিশেষ উপকারী । এই প্রকার অশ্রুতে ৩০ ডাইলুশনও ব্যবহৃত হইয়া থাকে । অনেক চিকিৎসক এই ঔষধের ১,৩, ১৮ ডাইলুশনও ব্যবহার করিয়া থাকেন । অস্ত্রের স্থানে স্থানে দূষিত বায়ুর অতিরিক্ত সঞ্চার হেতু শূল বেদনার (Flatulent colic) পক্ষে এই ঔষধের মূল আয়োক ২।৩ ফোঁটা মাত্রায় সেবনে বিশেষ উপকার দর্শিতে দেখা যায় । এমন কি, উক্ত প্রকার শূল বেদনার ৩৪টী রোগীর চিকিৎসার এই ঔষধের মূল আয়োকের ২।৩ ফোঁটা মাত্রায় অল্প ঘণ্টা অন্তর ১ মাত্রা প্রয়োগে শূল বেদনা একবারে দূরীভূত হইতে দেখা গিয়াছে । কোন রোগীকেই ৩ মাত্রার অধিক সেবন করাইতে হয় নাই । তবে ইহা দ্বারা রোগ একবারে সারিয়া যায় না, ফেবল উহাও উপশনই হইতে দেখা যায় ।

চায়না,—সিক্কোনা,—চায়না ।

(CHINA,—CINCHONA,—CHINA)

দক্ষিণ আমেরিকার অনেক স্থানে এই গাছের জন্ম। ইহাকে পেরুবিয়ান বার্ক (Peruvian Bark) বলিয়া থাকে। এতদেশে দাঙ্গিলাং এবং নীলগিরিতে ইহাও চাস হইয়া থাকে। ইহার গাছ দেখিতে অতি সুন্দর। লাল, পাণ্ডু এবং হরিদ্রা বর্ণ এই তিন প্রকারের সিক্কোনা জন্মে। হরিদ্রাবর্ণের গাছের শুকনা বাকল দিয়া যথা নিয়মে বেক্‌টিকাইড্ বা প্রফ্‌ স্পিরিটে ইহার মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে এবং এই প্রকার প্রস্তুত করা আরোকই হোমিওপ্যাথিক মতে রোগ চিকিৎসায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন সুগার অব্‌ নিক্সের সঙ্গে মিশাইয়া কোইনাইনের গুঁড়া ঔষধ প্রস্তুত হইয়া থাকে।

হোমিওপ্যাথির আবিষ্কর্তা মৃত মহাত্মা সামুয়েল্‌ হানিমান্‌ জানিতেন যে, সিক্কোনা একটা অর নিবারক এবং শরীরের তেজ বা শক্তি উৎপাদক ঔষধ (Tonic) বিশেষ। কি উপায়ে এই উই কার্য সাধাধিত হয় তাহা নিরাকরণার্থ তিনি স্বস্থ শরীরে সিক্কোনা খাইয়া তাঁহার কম্পজ্বর হওয়াতে তিনি হোমিও-প্যাথিক মতে রোগ চিকিৎসা প্রণালী আবিষ্কার করিয়াছিলেন। (অর্থাৎ স্বস্থ শরীরে যে দ্রব্য বা ঔষধ খাইয়া যে সকল বিকৃত লক্ষণ প্রকাশ পায়, উহা কোন রোগে প্রকাশ পাইলে উক্ত দ্রব্য বা ঔষধেই উক্ত রোগ আরাম হয়। ইহা নামই হোমিওপ্যাথি বা ("Similia Similibus Curantur")।

সাধারণ ক্রিয়া । গ্যাংলিয়নিক্‌ (Ganglionic) স্নায়বিক মণ্ডলীর উপর সিক্কোনার কাণ্য অত্যন্ত প্রবল। উক্ত স্নায়বিক মণ্ডলের যে অংশ শরীরের পরিবর্তনের সহায়তা করে তাহার উপরই সিক্কোনার কার্য অধিক প্রবল চওঁষাব দক্ষণ সার্ভান্সিক চর্কণতা এবং অবদরতা উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহা রক্তকে চলবৎ তরল করে ; অতএব রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়ার শক্তির হ্রাস করে এবং তদ্রূপই সার্ভান্সিক চর্কণতা এবং নানা বস্তু অতিরিক্ত চেতনা দেখিতে পাওয়া যায়। যান্ত্রিক কার্যের বৈলক্ষণ্যের দক্ষণ রক্তশ্রাব, প্রচুর পরিমাণে ঘৰ্ম্ম এবং মূত্র নিঃসরণ, উদবাসয় ইত্যাদি অস্বাভাবিক উৎপন্ন হইয়া থাকে। যকৃত এবং প্লীহার উপরও সিক্কোনার কার্য প্রবল, এবং তদ্রূপ

যক্কে রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ হইয়া উহার প্রদাহ এবং তজ্জনিত নানা প্রকারের পিত্তজনিত অন্থ হইয়া থাকে । পিত্ত জনিত অন্থের মধ্যে কামল রোগই সর্বাধিক প্রবল । প্লীহাতে রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ হইয়া উক্ত বস্ত্র অত্যন্ত বদ্ধিত এবং কঠিন হইয়া থাকে । যে প্রকার অর মেলেরিয়া জনিত, এবং যাহা কোন নির্দিষ্ট সময়ে আইসে, সে প্রকার অরই সিঙ্কোনা দ্বারা উৎপন্ন হয় । অতএব মেলেরিয়া জনিত সবিরাম অরে সিঙ্কোনা বিশেষ উপকারী এবং এক অব্যর্থ ঔষধ মধ্যে পরিগণিত ।

স্বাভাবিক মণ্ডলীর অতিরিক্ত উত্তেজনা বা চেতনা, সামান্য স্পর্শন, নড়া-চড়া, শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রমে লক্ষণাদির বৃদ্ধি, অত্যন্ত বলক্ষয় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুধা বা পিপাসা না থাকা ইত্যাদি সিঙ্কোনার বিশেষ প্রাকৃতিক নির্দিষ্ট গুণ বা প্রকৃতি মধ্যে পরিগণিত ।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মন । মনের মধ্যে নানা প্রকারের ভাব এবং কল্পনার উদয় হয়, প্রধানতঃ সন্ধ্যাকালে এবং রাত্রিতে (কফিয়া) ; সামান্য বিষয়ের জন্যও অত্যন্ত চিন্তা ; মনের অতিবিক্ত উত্তেজনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে নিরাশা এবং কোন প্রকার গোলমাল সহ হয় না ; সমুদয় বিষয়ে অমনোবোগ এবং বৈরাগ্য (বাক্সেবিস্, মার্ক্, ফস্, ফস্-আস্) ; অনিবার্য চিন্তা, ভয় এবং বিপদের আশঙ্কা (একন্, অবাম্, বেল্, ইগ্নেস্, ফস্) ; চিড্ চিড্ করা, থিট্ থিট্ করা এবং সহজেই চটিয়া যাওয়া বা রাগ করা (ব্রাই, ক্যাম্) ; শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রমে অনিচ্ছা ।

মস্তক । নেসা করিলে যেরূপ হয় মাথায় সেরূপ গোলমালে বোধ (ককিউল্, বন্স্, রাস্টেক্স্, পাল্) ; সর্দি বা রাত্রিতে সোজা হইয়া বসা বা নিদ্রাশূন্যতার দৰ্শন মাথার উত্তাবস্থা ; মাথাঘোরা, মাথা পশ্চাদ্ধিক্ টলিয়া পড়িতে চাহে (আগ্গাটিকাস্) ; রাত্রিতে জাগিলে মাথাঘোরা ; মাথা খাড়া কবিলে মাথাঘোরা (ব্রাই) ; রক্তাদি শ্রাবের পর মাথাঘোরা ; রক্তাল্পতার দৰ্শন মাথাঘোরা ; অতিরিক্ত পরিমাণে রক্তশ্রাবের পর মাথায় অত্যন্ত দৃঢ়পিয়া বেদনা ; সর্দি বদ্ধ হইয়া শিরঃপীড়া ; স্ত্রী সহবাসে অত্যা-

চার এবং হস্তমৈথুনের পর মাথার পশ্চাদ্ধাগে বেদনা (কম্-আস্, ষ্টাকিলে-গ্রিয়া) ; শিরঃপীড়া বাহার দরুণ মনে হয় যেন মাথা ফাটিয়া যাইবে (জাই, মার্ক্, নেটাম্-মিউর) ; মস্তিষ্ক মাথার হাড়ের উপর চেউয়ের ত্রায় বার-বার আঘাত করে (গ্লোনয়েন্) ; মাথায় চাপিয়া ধরার দ্বারা বেদনা যাহার দরুণ মনে হয় যেন মস্তিষ্ক মাথার মধ্য হইতে বহির্দিকে ঠেলিয়া বাহির হইতেছে ; মাথার কাকনি বা উহাতে ছিড়িয়া ফেলার দ্বায় বেদনা ; হঠাৎ ঠাণ্ডা বাতাস লাগিলে, বহির্বাযুতে অথবা সামান্য স্পর্শনে শিরঃপীড়া বৃদ্ধি এবং প্রবল চাপ দিলে উহার উপশম হয় (বেল্) ; স্পর্শনে মাথা টাটার (একন্, বেল্, মার্ক্) ; চুল নাড়িলেও চুলের গোড়া বেদনাযুক্ত হয় বা টাটার ; মাথার প্রচুর ঘর্ম হব (সাইলসি),—এই ঘর্ম বহির্বাযুতে বেড়াইলেই অবিক হয়।

চক্ষু । দৃষ্টিশক্তির দুর্বলতা বা চক্ষে ঝাপসা দেখা ; চক্ষুব খেতাংশ হরিদ্রাবর্ণ (ক্যাঙ্ক, চেলিডন্, আয়োড্, প্রাধাম্) ; চক্ষে উজ্জ্বল আলোক সহ হয় না (একন্, বেল্, ড্যাননাম্-সাল্ফ) ; চক্ষু সঞ্চালনে বেদনা এবং তদরুণ মনে হয় যেন চক্ষু সঞ্চালনের বাহ্যিক ব্যাঘাত হইতেছে ; চক্ষু লালবর্ণ এবং উহাতে জ্বালা ; বাণির কণা প্রবেশ করিলে সেক্রপ হয়, চক্ষে সেক্রপ চাপা-বোধ ; পুস্তকাদি পাঠ করিবার সময় মনে হয় যেন সমুদয় অক্ষর একত্রে মিলিয়া গিয়াছে।

কর্ণ । কানের মধ্যে টনটন শব্দ হয় (ক্যাঙ্ক-ক্যাঙ্ক্, মার্ক্, নাক্স-বন্) ; কানের মধ্যে গুনগুন, সোঁ সোঁ শব্দ হয় অথবা কানের মধ্যে স্ফু-স্ফু (একন্, বেল্) ; কানে কন্ড শব্দ ; কানের মধ্যে তিড়িক্‌মার।

নাসিকা । নাক দিয়া বারবার বক্তপড়া, প্রধানতঃ প্রাতঃকালে (আগারিকাক্, আঙ্গ্, জাই) ; নাসিকার মূলে চাপিয়া ধরার দ্বারা বেদনা (একন্, ক্যালী-বাই, ডিপ্-সাল্ফ) যাহা নাকের পার্শ্বপর্ষ্যন্ত বিস্তৃত হয় ; সন্ধি এবং নাক দিয়া প্রচুর পরিমাণে জীবৎ স্লেষ্মা নির্গমন।

মুখমণ্ডল । মুখমণ্ডলশিটা বা ফিকা এবং কখন কখন মলিন, ধসরের আভাযুক্ত হরিদ্রাবর্ণ অথবা কাল (আস্) ; মুখমণ্ডল শিটা হয় এবং বসিয়া যায় ; চক্ষু বসিয়া যায় (আস্, বিরেট্-আঙ্ক্) এবং নীলের আভা

যা পরিবেষ্টিত হয় (ইপিকাক্, ক্যালী-আয়োড্, সিকেল্, সাল্ফ্); মদ্য-পান, স্ত্রী সহবাসে অত্যাচার এবং হস্তমৈথুনে যেরূপ হয়, মুখমণ্ডল সেরূপ শিটা বা ক্রম্; ওষ্ঠ শুষ্ক, কাল্চে লেপযুক্ত, কৌকড়া এবং ফাটাবুক্ত (আস্); হরাস্থির নিম্নস্থিত গ্রন্থি ক্ষীণ (ক্যাক্-কার্ক্, ব্যারাইট, আয়োড্); কোন নির্দিষ্ট সময়ে (Periodical) মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূল বা বেদনা; অত্যন্ত বেদনা যাহা টক্ষুর নিম্নভাগ এবং হরাস্থির নিকটস্থ স্নায়ুগুলিই অধিক আক্রমণ করে এবং বাহ্যার দক্ষণ আক্রান্ত স্থান স্পর্শ করিলেও টাটার (স্পাইজেল্),—উক্ত বেদনা রাত্রিতে শয়ন করিয়া থাকিলে বৃদ্ধি হয়। হরাস্থির নিম্নস্থিত গ্রন্থির ক্ষীণতা ।

মুখগহ্বর । দাঁত নড়ে এবং কেবল চিবাইবার সময়ই উহা বেদনায়ুক্ত হয় (কার্কো-আনিমেল্, মার্ক্, নাইট্রিক্-আস্); দাঁতে দপ্‌দপিয়া বেদনা; সামান্য আঘাত লাগিলেই দাঁতের বেদনা বৃদ্ধি হয়; হঠাৎ ঠাণ্ডা বাতাস লাগিলে দাঁতের বেদনা বৃদ্ধি হয় (সাল্ফ্) এবং দাঁতে দাঁতে চাপিয়া ধরিলে বেদনার উপশম হয়; জিহ্বা হরিস্থার লেপযুক্ত (চেলিডন্); জিহ্বা সাদা ময়লাযুক্ত; জিহ্বার জ্বালা এবং স্‌চৌর্বিধানের স্থায় বাতনা অম্লভূত হয়; মুখের মধ্যে শুষ্কাম্লভব (আস্, ব্রাই, নাক্স্‌বন্, পাল্‌স্); মুখে কোন স্বাদই থাকে না অথবা প্রথমতঃ মিষ্ট এবং তৎপরে টক স্বাদ; মুখে চট্‌চট্‌বাতিক্ত স্বাদ (একন্, ব্রাই, কলোস্, নাক্স্‌বন্, পাল্‌স্, সাল্ফ্); পারার অপব্যবহারের পর অনেক কাল ধরিয়া মুখে দিবারাত্রি লাগ উঠা; সমুদয় শরীরের, প্রধা-নতঃ পাকস্থলীর অত্যন্ত দুর্বলতা; মুখে অনববত জল উঠা ।

পাকস্থলী এবং উদর । আহার বা পানের ইচ্ছা একবারেই থাকে না; অনেক রকমের দ্রব্য খাওয়ার ইচ্ছা, কিন্তু কোন বস্তু খাইবে রোগী স্থির করিতে পারে না; অন্নদ্রব্য খাওয়ার ইচ্ছা (আণ্টি-ক্রুড্, আণ্টি-ট্যার্ট্); ফল খাওয়া এবং মদ্যপানের ইচ্ছা (ব্রাই); অত্যন্ত প্রবল পিপাসা এবং ঠাণ্ডা জল খাওয়ার ইচ্ছা (একন্, ব্রাই, ওপিরাম্); রোগী বারম্বার জল খায়, কিন্তু সে একেবারে অধিক পরিমাণে জলাদি খাইতে পারে না (আস্); কাঠ উল্লার, টক্ উল্লার (কার্কো-বেজ্, সাল্ফ্); দুধ খাওয়ার পর উল্লার (কার্কো-বেজ্), তিক্ত উল্লার (ব্রাই, নাক্স্‌বন্) -

উদরস্থ আহার দ্রব্যের স্বাদবিশিষ্ট উদ্গার (আন্টি-ক্রুড, ক্যাক্স-কার্ক, ফস্, পাল্‌স্); পেটে খালিবোধ এবং পেট গুলিয়া বা মোচড়াইয়া উঠা; সামান্য পরিমাণ আহারদ্রব্যাদি উদরস্থ হইলেই অনেক ক্ষণ ধরিয়া পেটে ভারি এবং চাপাবোধ হয় (লাইকোপ্, নাক্স-বম্); দুধ খাইলেই পেটের অস্থখ হয় (কার্কো-বেজ্, সাল্‌ফ্); পাকস্থলীর মধ্যে দগ্ধ দগ্ধ করা (পাল্‌স্, সিপিয়া); ক্ষত হইলে যেৰূপ হয় পাকস্থলীতে সেরূপ জ্বালা এবং টাটানি বাহার দরূপ পেটের উপর সামান্য স্পর্শ-ভারও সহ্য হয় না; পাকস্থলীর মধ্যে ঠাণ্ডাবোধ; পেট পূর্ণ রহিয়াছে সর্বদা এরূপ অস্থভূত হয় বটে, কিন্তু খাইতে ইচ্ছা করিলে রোগী খাইতে পারে, অগতঃ খাইলেই অস্থখবোধ হয়; আহারদ্রব্য ভাঙ্গরূপ পরিণাম পায় না; অনেকক্ষণ আহার দ্রব্যাদি পাকস্থলীতে থাকে, (অধিক বেলায় খাইলেই এরূপ ঘটয়া থাকে); রক্তবমন এবং তদরূপ অধিক পরিমাণে রক্তনির্গমনের দরূপ রোগী ফিকা বা শিটা এবং ডার্ল হইয়া পড়ে; স্পর্শনে পাকস্থলী অত্যন্ত টাটায়; রক্তস্রাব বা রক্তমোক্ষণের পর পাকস্থলীতে বেদনা, অন্ন হওয়া এবং পেট ঠোস্ মারিবা থাকা। উদর শ্লীত (আন্টি-ক্রুড, ব্রাই) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে উদ্গার বা ডেকুর তুলিবার ইচ্ছা; উদর শ্লীত হইয়া যেন উহাতে অত্যন্ত কসিয়া ধরে এবং উদ্গার বা ডেকুর উঠিলেও উদরের শ্লীতি সামান্য পাব-মাণেও কমে না; পেট ফাঁপে (আণিকা, ব্রোমিন্); জগ খাইলে উদরে পচায় স্তার অস্থভূত হয়; চর্মের নীচে ক্ষত হইলে যেৰূপ হয়, যকৃত প্রদেশে সেরূপ বেদনা বা বাতনা বাহার দরূপ আক্রান্ত স্থানে সামান্য স্পর্শনের ভারও সহ্য হয় না (ইক্সলাস্, ব্রাট, চেলিডন্, মার্ক্); যকৃত শ্লীত এবং কঠিন হয় (ফস্, সাল্‌ফ্); প্রীহার শ্লীতি, প্রদাহ এবং কঠিনতা (ফস্); অস্থের মধ্যে দূষিত বায়ুজনিত শূলবেদনা (Flatulent Colic), আহারের পর এবং প্রান্ত্রিতে বাহার অধিক উদ্বেক হয় (কলোস্); গুহবার দিয়া অধিক পরিমাণে দূষিত বায়ু নিঃসরণ (আলোজ্, কার্কো-বেজ্) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কখন কখন পেটকামড়ানি।

মূল । উদরাময়, বেদনাহীন উদরাময় (আস্, পডোক্, ফস্-আস্); ডার্লকারক উদরাময় (ফস্); ফলাদি খাইয়া উদরাময় (নিষ্টাস্); উদরস্থ অজ্ঞান

আহার জব্যের কণা বিশিষ্ট মূলভেদ (আন্টি-ক্রুড্, আস্, ক্যাক্-কার্ক্, ফস্, পডোফ্) ; মল কাল (আস্, লেপ্টেণ্ড্রা) ; হরিদ্রা বর্ণের তরল মলত্যাগ (চেলিডন) ; জলবৎ তরল ভেদ বা অসাড়ে বা অনিচ্ছাপূর্বক ভেদ (আস্, হায়োস্) ; শুষ্ক দ্বার দিয়া নরম মল নির্গত হইতেও কষ্ট বোধ (আলাম্, কার্কোবেজ্, নাক্স-মক্) ।

মূত্রযন্ত্র । বারম্বার প্রসাব করা (এপিস্, আর্জেন্ট-মেট্, ফস্-আস্) ; মূত্র কাল্চে, ঘোলাটিয়া এবং পরিমাণে অল্প ; মূত্রে ইটের গুঁড়ার ছায় লাল্চে তলানি পড়ে (আর্গিকা, নেটাম্-নিউর, লুফর, ফস্) ; মূত্র কাল্চে, ঘোলাটিয়া এবং পরিমাণে অল্প ; মূত্র নালীতে স্থচী বিধানের ছায় বাতনা ।

জননেন্দ্রিয় । স্ত্রীসহবাসের ইচ্ছা ; স্ত্রীসহবাস বিষয়ে চিন্তা বা কল্পনা ; ধ্বজভঙ্গ (আগারিকাশ্, ফস্-আস্, ক্যাম্ফার) ; রাত্রিতে নিদ্রাবস্থায় বারম্বার অনিচ্ছাপূর্বক হর্সলকারক ধাতু নিঃসরণ (অবাম্, জেলস্, ফস্-আস্) ; আত্মরক্ত স্ত্রী সহবাস, অগ্রদোষ বা হস্তনৈখুন হেতু অতিরিক্ত পরিমাণে ধাতু নিঃসরণ জনিত অস্থব (আগারিকাশ্, নাক্স্ বম্, ফস্-আস্, ষ্টাকিস্) ; চলিবার সময় জননেন্দ্রিয় প্রদেশে ভারিবোধ । জরায়ুতে রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ এবং উহাতে পূর্ণ এবং ভারিবোধ বাহার দরুণ মনে হয় যেন জরায়ু নিম্নদিকে ঠেলিয়া নামিতেছে, চলিয়া বেড়াইবার সময় বাহার বৃদ্ধি হয় (বেল্) ; অতিরিক্ত পুরুষ সহবাস বা রক্তস্রাবের দরুণ স্ত্রীলোকের ভিষকোষ প্রদাহ, বাহার দরুণ আক্রান্ত স্থান স্পর্শ করিলে টাটার ; জরায়ু হইতে অতিরিক্ত পরিমাণে কাল্চে রক্তস্রাব এবং তদ্রুপ মুচ্ছা ; যোনি দ্বার দিয়া রক্তমিশ্রিত সিরাম (Serum) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পর্যায়ক্রমে পুষ্ণ নিঃসরণ ; রক্তস্রাবের পূর্বে যেত প্রদর নিঃসরণ অথবা রক্তস্রাবের সময় রক্ত না পড়িয়া যেত প্রদর নিঃসরণ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে জরায়ুর আন্তর্গত সঙ্কোচন ; আতুড়ে স্ত্রীলোকের পুরুষ সহবাসের অতিরিক্ত ইচ্ছা (Nymphomania (প্লাটিনা, বিরেট্-আলব্) ; জরায়ু হইতে অতিরিক্ত পরিমাণে রক্তস্রাব (Metrorrhagia) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কানে টন্ টন্ শব্দ হওয়া, মুচ্ছা, শীতবোধ, দৃষ্টিরোধ ; জরায়ু হইতে কাল্চে চাপ্ চাপ্ থানা থানা

রক্ত নির্গমন; জরায়ুতে খিলখরা এবং উহার ঝাঁকনি ও স্পন্দন; সর্বদা পাখা দিয়া বাতাস খাওয়ার ইচ্ছা; সন্তান প্রসবের পর অনেক দিন খরিয়্যা বোনি দ্বারা দিয়া ক্লেদ (Lochia) নিঃসরণ; এই ক্লেদ কখন কখন দুর্গন্ধযুক্ত এবং পূঁঘ মিশ্রিতও হইয়া থাকে; রক্তঃস্রাবের পূর্বে ষ্ণেতপ্রায় নিঃসরণ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কুচ্কির দিকে চাপা বোধ; গর্ভস্রাবের পর রক্তস্রাব হইয়া মুচ্ছা।

শ্বাস যন্ত্র। স্বরভঙ্গ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গলা দিয়া কর্কশ শব্দ হওয়া (কার্কা-বেজ); গলকের ধূমে কণ্ঠনালীতে যেরূপ হয়, উদ্ভেকনার দরুণ দেরুপ আক্ষেপিক কাশি (আস্, ইথেস্); প্রাতঃকাল এবং রাত্রিতে কাশি; কাশি এবং দিনের বেলা বা সন্ধ্যার সময় গলা দিয়া দানায়ুক্ত শ্লেষ্মা নির্গমন; রাত্রি বা প্রাতঃকালে কাশি থাকে না; আহারের পর কাশির বৃদ্ধি (নাজ্ বম্); হাসিলে কাশির বৃদ্ধি (ফস্); কথা বলিলে কাশির বৃদ্ধি (কস্, সোরিনাম্); মাথা নীচু করিয়া শয়ন করিলে কাশির বৃদ্ধি; কণ্ঠনালী সামান্য চাপিলে কাশি; গায় হঠাৎ জোরে বাতাস লাগিলে অথবা রক্তস্রাব, ধাতু নিঃসরণ বা উদরাময় হইলে কাশির বৃদ্ধি; বৃকে কণ্ঠভ্রুব; সন্ধ্যার সময় বৃকে কণ্ঠভ্রুব; রাত্রিতে মধ্যে মধ্যে নিশ্বাস বন্ধ হয় (একন্, আস্); বৃকে শ্লেষ্মার সঞ্চয়ের দরুণ নিশ্বাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম হওয়া (আণ্টি-কুড্, সাগু-কাণ্); নিশ্বাস প্রথমে বায়ুনের মধ্যে সাঁই সাঁই শব্দ হয় (আণ্টি-কুড্, ইপি-কাক্); বাসিরা থাকিলে বৃকের নিম্নভাগে এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্ব পর্যন্ত সমুদয় অংশে চাপিয়া বা কদিয়া ধরার জ্বাৰ বেদনা বা বাতনা বাহার দরুণ অত্যন্ত উদ্বেগ হয়; এই কণ্ঠ বা বাতনা দাড়াইলে বা চলিয়া বেড়াইলেই দূরীভূত হয়; রক্তোৎকাশ এবং তৎপর কুস্তুস পাকিয়া উঠাতে পূঁঘ হওয়া; বৃকে সৃষ্টাবিধানের জ্বাৰ বেদনা, সামান্য স্পন্দনেই বাহার বৃদ্ধি হয়; মারিলে যেরূপ স্তন্য, বৃকের পার্শ্বে দেরুপ বেদনা (শাণিকা, আপস্, সাইগুস্); বৃকের বান পার্শ্বে সৃষ্টা বিধানের জ্বাৰ বেদনা বাহার দরুণ নিশ্বাস প্রথমে কোনও ব্যাঘাত জন্মে না; দীর্ঘ নিশ্বাস টানিবার হচ্চা। জ্বংস্পন্দন এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বৃকে এবং মুখমণ্ডলে রক্তাদিক্য বা রক্তাবরোধ।

পৃষ্ঠদেশ। একখানি পাথর চাপা দিয়া রাখিলে যেরূপ হয় হুই

স্কন্ধের মধ্যবর্তী স্থানে সেরূপ চাপা বোধ ; মাথা হেট করিয়া অনেকক্ষণ উপুড় হইয়া থাকিলে অথবা কোন ভারি দ্রব্য চাপা দিয়া রাখিলে যেরূপ হয়, কোমরে সেরূপ বেদনা, (অর্গিকা, ডাক্, পাল্‌স্‌) ; খিল ধরিলে, মোচড়াইয়া পড়িলে বা খেঁৎলিয়া গেলে যেরূপ হয় কোমরের পশ্চাত্তাগে সেরূপ অসহ্য বেদনা, সামান্য নড়াচড়াতেই যাহার বৃদ্ধি হয় ; সামান্য নড়া চড়াতেই পৃষ্ঠদেশ এবং গ্রীবাংশে ঘর্ষ হয় ; পৃষ্ঠদেশে স্থতীব্র-বেদনা ।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, হাত, পা ইত্যাদি । সমুদয় অঙ্গের শিথিলতা এবং হাতের কাঁপনি ; অঙ্গ প্রত্যঙ্গে অবশ বা অসাড় বোধ ; অঙ্গ প্রত্যঙ্গে, প্রধানতঃ উরুদেশে ভাব বোধ ; অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কাঁপনি যাহা কেবল রোগীই অনুভব করিতে পাবে, অঙ্গ লোকে টের পায় না এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডাবোধ । হাত ইত্যাদির ভাড়ে পক্ষাদ্বয়ের ত্রায় ধাক্কা লাগা বা ছিড়িয়া ফেলার ত্রায় বেদনা, স্পর্শনে যাহার বৃদ্ধি হয় ; লিখিবার সময় হাত কাঁপে (ক্যাক্-কার্ক্) ; বাম হাতের পশ্চাৎ ভাগেব ক্ষীতি ; এক হাত ঠাণ্ডা এবং অপর হাত গরম । অস্থির আবরক পর্দা (Periosteum) ছুবি দিয়া চাচিলে যেরূপ হয় উরুদেশেব ভাড়ে সেরূপ কসিয়া ধরার ত্রায় বেদনা (কস্-আস্) ; ডাইন হাঁটু ব সন্ধি ক্ষীত এবং উন্ম ; মনে হয় যেন মোজার বান্ধনি (Larters) কসিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছে, যাহার দরুণ রোগী মনে করে যেন তাহার পা অবশ বা অসাড় হইবে ; পায়ের সন্ধির বাতের ত্রায় ক্ষীতি ; পায়ের পাতা এবং আঙ্গুলে বাতের বেদনার ত্রায় বেদনা, নড়াচড়া বা সামান্য আঘাত লাগিলেই যাহার বৃদ্ধি হয় ; অনেক দূর চলিয়া বেড়াইলে যেরূপ হয় পায় সেরূপ ক্লান্তি বোধ (আর্জেন্ট্-নাইট্, ক্যাক্-কার্ক্, নাইট্ ক্-আস্) ।

চন্দ্র । চন্দ্র হরিদ্রাবর্ণ (ব্রাহ) ; কামল রোগ (মাক্) ।

নিদ্রা । না না প্রকারের ভাব বা কল্পনা আসিয়া ঘুমের ব্যাঘাত জন্মায় ; নিদ্রাশূন্যতা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মাথাব্য চাপিয়া ধরার ত্রায় বেদনা বা যাতনা ; ভয় উৎপাদক স্বপ্ন দেখিয়া জাগিয়া মনের অত্যন্ত উত্তেজ ; রাত্রি দুই-প্রহরের পর এলোমেলো স্বপ্ন দেখা ; নিদ্রাবল্য অথবা ঘুম

বা পানের পর অথবা সামান্য আঘাত লাগিলেই বেদনা বা যাতনাদির বৃদ্ধি ;
 ছপ খাইলে (পেটের অস্থিরতার বৃদ্ধি), চলিলে, 'নড়াচড়াতে এবং একদিন অন্তর
 একদিন অস্থিরতার বৃদ্ধি ইত্যাদি চায়নার কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক
 লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত।

সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ। মেলেরিয়া জনিত অস্থিরে সিক্কোনার
 কার্যের সঙ্গে আগিনিক্ এবং সিড্রনের অনেক সাদৃশ্য আছে। শরীরের
 শক্তি বৃদ্ধি করার শক্তির বিষয় দেখিতে গেলে সিক্কোনার কার্যের সঙ্গে
 ফেরামের সাদৃশ্য আছে। এতদ্ভিন্ন কোন কোন বিষয়ে সিক্কোনার কার্যের
 সঙ্গে বেলাডোনা, ক্যাস্কেরিয়া কার্বোনিকা, গ্রাফাইটিস্, লাইকোপডিয়াম,
 মার্কিউরিয়াস্, নেট্রাম্ মিউরিয়াটিকাম্, নাক্স বমিকা, ফফরাস্, ফফরিক্
 আসিড্, পালমেটিলা এবং সাল্ফারের কার্যের কতকটা সাদৃশ্য আছে।

প্রতিষেধক ঔষধ। আগিনিক্, ক্যাস্কেরিয়া কার্বোনিকা,
 ফেরাম্, ইপিকাকিউএনা, নেট্রাম্ মিউরিয়াটিকাম্, নাক্স বমিকা, পালমে-
 টিলা, সিপিয়া, সাল্ফার, বিরেট্রাম্ আয়াম্ ইত্যাদি সিক্কোনার প্রতিষেধক
 ঔষধ মধ্যে পরিগণিত।

ডাইলুশন বিচার। উদরাময় ইত্যাদি রোগে ৬, ১২ এবং ৩০ এই
 তিন ক্রমই উপকারী। শিশুগণের উদরাময়ে ৩০ ক্রম অধিক উপকারী।
 স্নায়বিক মণ্ডলীর অস্থিরেও প্রথমোক্ত তিন ক্রমই উপকারী। হোমিওপ্যাথির
 আবিষ্কর্ত্তা হানিমান এই ঔষধের ১২ ক্রম ব্যবহার করিতেন। ডাক্তার হিউজ্
 বলেন যে স্নায়বিক অস্থির বাতাত কোন রোগেই তিনি ১ম অপেক্ষা উচ্চ
 ডাইলুশন ব্যবহারের আবশ্যকতা অনুভব করেন নাই। পূর্বাতি নিঃসরণ
 বা রসক্ষয় হেতু জ্বর (Hectic Fever) এবং অন্ত্রাশ্র অস্থিরে এই ঔষধের
 মূল আরোক প্রয়োগে অধিক উপকার দর্শে। লেখক চায়নার ১ম দশমিক
 ক্রমের আরোক ২।৩ কোঁটা মাত্রায় এবং সাল্ফেট্ অব্ কোইনাইনেল
 ১ম দশমিক ক্রমের শুঁড়া ১ গ্রেটন মাত্রায় এবং আদত কোইনাইন্ ৪।৫
 গ্রেটন মাত্রায় দাঁতের বিরাম কালে ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল
 পাইয়া থাকেন।

কুপ্রাম্,-(তাম্র)-কুপ্রাম্ ।

(Cuprum.)

(কুপ্রাম্ মেটেলিকাম্ (Cuprum Metallicum.)

(কুপ্রাম্ আসিটিকাম্ (Cuprum Aceticum.)

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা প্রণালীতে উক্ত দুই প্রকার কুপ্রাম্ (তাম্র) যথা (১) কুপ্রাম্ মেটেলিকাম্ (Cuprum Metallicum) এবং (২) কুপ্রাম্ আসিটিকাম্ (Cuprum Aceticum), সচরাচর অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে । কোন এক বিষমত্ব হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয় হইতে তাম্রার পরিষ্কৃত পাত ক্রয় করিয়া উহা যথা নিয়মে মূল কণাবিশিষ্ট সুগার অব্ মিক্কের সঙ্গে মিশাইয়া ঘুঁটিয়া ৩ শততমিক বা ষষ্ঠ দশমিক ক্রমের গুঁড়া প্রস্তুত করিতে হয় । তৃতীয় শততমিক ক্রমের গুঁড়া হইতে যথা নিয়মে ৪র্থ শততমিক ক্রমের আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে । এই প্রকার কুপ্রাম্কে কুপ্রাম্ মেটেলিকাম্ বলে । কোন এক বিষমত্ব হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয় হইতে আদত আসিটেট্ অব্ কপারের গুঁড়া ক্রয় করিয়া উহার এক ভাগ ২০ ভাগ চুয়ান জলে মিশাইয়া ইহার আরোক প্রস্তুত করিতে হয় । ইহাকেই এক প্রকার মূল আরোক বলা যাইতে পারে । কারণ, ইহা অপেক্ষা নিম্ন ক্রমের আরোক প্রস্তুত হইতে পারে না । এই আরোক যে শিশিতে থাকিবে সেই শিশির গায় কুপ্রাম্ আসিটিকাম্ ১৬ বলিয়া লিখিতে হইবে । ইহার ২ ফোঁটার তেল ১ম দশমিক ক্রমের ১ ফোঁটার তেলের সমান হয় । ২৫ ভাগ চুয়ান জলে ৫ ভাগ রেক্টিফাইড্ স্পিরিট মিশাইয়া যথা নিয়মে ইহার ২য় শততমিক ক্রমের আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে । ৩য় দশমিক ক্রমের আরোক যথা নিয়মে ডাইলুট্ স্পিরিটে প্রস্তুত হয় ; ২য় শততমিক ক্রমের আরোক ২০° ডিগ্রী ওয়ার প্রফ্ স্পিরিটে এবং ৫ম দশমিক এবং ততোধিক ক্রমের আরোক রেক্টিফাইড্ স্পিরিটে প্রস্তুত হইয়া থাকে । এই দুই প্রকার কুপ্রামের কার্যই প্রায় এক প্রকার । লেখক কুপ্রাম্ মেটেলিকাম্ই সচরাচর ব্যবহার করিয়া থাকেন । অতএব কুপ্রাম্ মেটেলিকামের বিষয়ই এস্থলে অধিক লিখিত হইল । এতদ্ভিন্ন কুপ্রাম্ আর্সেনিয়োসাম্ (Cuprum Arseniosum),

কুপ্রাম্ সাল্‌ফিউরিকাম্ (Cuprum Sulphuricum) এবং কুপ্রাম্ কার্বোনাস্ (Cuprum Carbonus) ইত্যাদিও কখন কখন ঔষধার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।
উহার বিবরণ যথা স্থানে লিখিত হইবে ।

সাধারণ ক্রিয়া । পাকস্থলী এবং অন্ত্রের উপর কুপ্রামের কার্য অত্যন্ত প্রবল । ইহা দ্বারা বিষাক্ত হইলে প্রথমতঃ পাকস্থলী এবং অন্ত্রের প্রদাহের লক্ষণাদি প্রকাশ পাইয়া শূল বেদনা, উদরাময়, লবমন ইত্যাদি অসুখ প্রকাশ পাইয়া থাকে ; এবং তৎপরে শরীরে শোষণীয় সায়বিক মণ্ডগী আক্রান্ত হয় এবং তদনন্তর আঙ্গুষ্ঠিক অসুখ, খিল পদা, আঙ্গুষ্ঠিক এবং পক্ষাঘাত ইত্যাদি অসুখগুলি প্রকাশ পায় । কোন নির্দিষ্ট সময়ে এবং এক সময়ে অনেক গুণি লক্ষণ প্রকাশ পায়না এই ঔষধের একটি প্রকৃত ঔষধ শক্তি বিশেষ ।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মন । মানব অত্যন্ত উদ্বিগ্ন এবং ব্যস্তমনে বিছানায় এপাশ ওপাশ করিয়া ছটফট করা (একন, অস) ; থাকিয়া থাকিয়া যেন মৃত্যু বরণ্যার জায় যন্ত্রণা উপস্থিত হয় ; ইচ্ছাদির বিশেষ চেতনা থাকে না ; তপিত কক্ষ রোগীর অতিরিক্ত চেতনা ; কোন ভাল কার্য্য কবিত্তেও রোগী ভীত হয় । কোন প্রকারের কার্য্য কবিত্তেই ইচ্ছা হয় না ।

মস্তক । উপরের দিকে তাকাইলে মাথা ঘোরা (ক্যাম্-ক্যাম্, সান্সুনেরিয়া) ব্যাধার দরুণ মনে হয় যেন মাথা সম্মুখদিকে উলিয়া পড়িবে এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টিভ্রমণ ব্যাধার দরুণ মনে হয় যেন চক্ষু একস্থানি সরু কাপড় দিয়া ঢাকা রহিয়াছে ; মস্তিষ্কে ঘোঁরা বা ওরা বা মোচড়া ইয়া পড়ার জায় বেদনা (ফেলিবোদাস্ এবং চক্ষু দু'দিকে বা ফিরাইলে চক্ষু কোটবে উক্ত প্রকারের বেদনা বা ব্যতনা ; মথোর উপরিভাগে এক বিশেষ প্রকৃতির স্ফুটন বা কুটুটানি ; মাথায় উপরিভাগে কোন প্রাণী হামা দিয়া বা ওরা জায় স্ফুটন (আর্জেন্ট-নাইট্রি, কল) ; মস্তিষ্কের অস্ত্রে শিঙ বা ছোট বালক বালিকাগণ মাথা ঝাড়া করিয়া রাখিতে পারে না ।

চক্ষু । আলোক পরিক্ষাররূপে দেখিতে পাওয়া যায় না ; চক্ষে চাপিয়া ধরার স্থায় বেদনা ; চক্ষু ঘুরাইলে বা ফিরাইলে চক্ষুর কোটরে ঘেঁষলিয়া যাওয়া বা মোচড়াটয়া পড়ার স্থায় বেদনা ; চক্ষু অস্থির এবং উহার আক্ষেপিক সঞ্চালন ; অপবাক্র এবং সক্র্যার সময় চক্ষে ভয়ানক চুন্ধানি ।

কর্ণ । • যে পার্শ্বে শয়ন করা যায়, দূরবর্তী স্থানে জয়চাক বাজিলে যেক্রপ হয়, সেই পার্শ্বের কর্ণে প্রাতঃকালে এবং বিছানায় শয়ন করিয়া থাকিলে সেক্রপ শুন্ শুন্ দন্ দন্ শব্দ হয়, বিছানা হইতে উঠিলেই বাহা দূরীভূত হয় ; কানের মধ্যে এবং উহার পশ্চাত্ভাগে ছিদ্র করার স্থায় বেদনা ।

নাসিকা । নাকের মধ্যে রক্তাধিক বা রক্তাবরোধের স্থায় অল্পভূত হয় ।

মুখ মণ্ডল । মুখন্ডল নীলের অভাষুক্ত এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে ওষ্ঠ নীলবর্ণ (কার্বো-বেজ) ; মুখন্ডল ফিকা বা শিটা, উদ্বেগযুক্ত এবং অত্যন্ত বিষমতার চিহ্নযুক্ত (আন্) ; মুখমণ্ডলের আক্ষেপিক বিকৃতি (সিকুটা) ।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য । মুখে তিক্তবাদ ; মুখে কেণা উঠা (সিকুটা, নেজা, লরোস) : মুখের মধ্যে শুদ্ধাভব । দাঁতে টানিয়া বা কসিয়া ধরার স্থায় বেদনা বাহা কপালের পার্শ্ব পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় ; মুখে মিষ্ট বা তামার স্বাদ । কোন প্রকারের তথল বস্তু গিলিবার সময় আহার বহা গলনালীতে গড়্ গড়্ শব্দ শুনিতে পাওয়া যায় ; গলাব মধ্যে ঘাটিয়া ধরার স্থায় প্রবল বেদনা ।

পাকস্থলী এবং উদর । অত্যন্ত বমনোদ্বেগ (অণ্টি-টার্ট্ ইপি-কাক) ; ক্ষুধাশূন্যতা ; ফিকা ; বায়বায় বমনের ডেপ্তা, চক্ষু বমন হয় না ; প্রবল বমন ; অনব্রাত উদর উঠা, ঠাণ্ডা জল খাইলে বমন নিবারণিত হয় ; পাকস্থলীর মধ্যে চাপা বোধ, স্পর্শন বা চড়াচড়াতে বাহার রুদ্ধ হয় ; পাকস্থলীতে অত্যন্ত চাপা বোধ এবং ভৎসঙ্গে সঙ্গে মধ্যে মধ্যে সঙ্কোচক বেদনা ; পাকস্থলী এবং উদরোদ্ধি প্রদেশে অত্যন্ত কষ্ট দায়ক বেদনা । উদর ঘাটিয়া ধরে শু উত্ত হয় এবং স্পর্শনে বেদনান্বিত হয় (একন্, বেল্, মার্ক্) ; উদর পৃষ্ঠদেশে পানে আকৃষ্ট হয় এবং উপ স্পর্শনে অত্যন্ত টাটার ; উদর প্রদেশস্থ পেশী জ্বলির আক্ষেপিক সঞ্চালন বা আন্দোলন ; সবিরাম শূন বেদনা ; উদরে কসিয়া ধরার স্থায় ব কণ্ডনবৎ বেদনা ; পেট ফাঁপা ।

মল । সবুজ বর্ণের কষ্টদায়ক মল ভেদ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পেটে কঠিনবৎ ভয়ানক বেদনা এবং কষ্টদায়ক কৌথপাড়া (মার্ক্); মল তরল, পরিমাণে অধিক এবং অতি প্রবল বেগে শ্রোতের দ্বার গৃহদ্বার দিয়া নির্গত হয়; গৃহ দ্বার দিয়া প্রচুর দূষিত বায়ু নিঃসরণ; ওলাউঠাতে ছেকড়া ছেকড়া গোলাবর্ণের দ্বার পদার্থ মিশ্রিত ধূসর বর্ণের মল ভেদ; জলবৎ তরল প্রবল ভেদ (আর্স, চায়না, পডোফ্), বমন, পিপাসা, পেট ফাঁপা, পায়ের ডিম এবং পেটে খিল ধরা, শিব চক্ষু; গ্রাসকালে শিশু বা ছোট বালক বালিকা গণের অত্যন্ত প্রবল উদরাময় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কের অসুখ ।

মূত্র বস্তু । রাত্রিতে অজানিত রূপে অশ্রোতে বা অনিচ্ছাপূর্বক বিছানায় প্রস্রাব করা (ঘুনের ঘোরে); মূত্র পরিমাণে অল্প বা একবারে মূত্রাবরোধ ।

জননেন্দ্রিয় । স্ত্রীলোকের রজঃস্রাবের সময় এবং উহার পূর্বে, অথবা রজঃস্রাবের পর অস্বাভূত খিল ধরার দ্বার অসহ্য প্রবল বেদনা বাহ্যিক পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় এবং যাহার দরুন বমনোদ্বেগ বা বমন হয় এবং কখন কখন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের আক্কেপ (Convulsions) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ চীৎকার করিয়া উঠা; ঘোনি দ্বারের আক্কেপ বা খেঁচনী; গর্ভাবস্থায় অঙ্গ প্রত্যঙ্গের আক্কেপ বা খেঁচনী বাহ্যিক দরুন আক্রান্ত অঙ্গের পেশীগুলি একবার সঙ্কুচিত হয় এবং একবার শিথিল হয় (Clonic Spasms); সন্তান প্রসবের সময় আক্কেপ; সন্তান প্রসবের পর পেটে অত্যন্ত কষ্ট দায়ক খিল ধরার দ্বার বা অস্বাভূত বেদনা; যে সকল স্ত্রীলোকের অনেকগুলি সন্তান হইয়াছে তাহাদিগের এই প্রকার বেদনা অধিক হইয়া থাকে; উদরে এই প্রকার খিল ধরার দরুন হাত পা ইত্যাদিতেও খিল ধরে ।

শ্বাস বস্তু । অনবরত স্বরভঙ্গ; এই স্বরভঙ্গ সময়ে সময়ে এত অধিক হয় যে উহার দরুন রোগী একটী শব্দও প্রয়োগ করিতে পারে না; কাশি এবং উহার দরুন নিশ্বাস গ্রন্থালের অত্যন্ত ব্যাঘাত জন্মে, অথবা কখন কখন একবারে শ্বাসরোধ হয়; অত্যন্ত দুর্বলকারক বা শ্রান্তি উৎপাদক কাশি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে নাক দিয়া রক্ত মিশ্রিত স্লেমা নির্গমন; বুকের অত্যন্ত

কষ্টদায়ক সঙ্কোচন, প্রধানতঃ জ্বলাদি পানের পর; কখন কখন বৃকের আক্ষেপের দরুণ মধ্যো মধ্যো শ্বাস বোধ হয়; বৃকে ষাটিয়া ধরার ভার অনুভূত হয় বাহার দরুণ শ্বাস প্রাশ্বাসেব ব্যাঘাত জন্মে এবং উহার দরুণ কখন কখন শ্বাস রোধ হইয়া রোগী কাঁপড় হওয়ার উপক্রম হয় (সিকুটা)।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, হাত, পা ইত্যাদি। সমুদয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গে খিল ধরা (Cramps) (সাল্ফ); অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দুর্বলতা। বাহু এবং হাতের ঝাঁকনি (সিকুটা); ডাইন হাত যেন ষাটিয়া ধরিবাছে এবং স্বাভাবিক অপেক্ষা লম্বা হইয়াছে একপ অমুহূত হয় এবং ইচ্ছাবত উক্ত হাত সঞ্চালন করার যেন রোগীর কোনও ক্ষমতা নাই একপ অমুহূত হয়। হাঁটুর সন্ধির দুর্বলতা এবং চলিবার সময় উচ্চাতে কদিয়া ধবার ভার অত্যন্ত কষ্ট দায়ক বেদনা বা বাতনা, বাহার দরুণ রোগী অত্যন্ত কষ্টে চলিতে পারে, অথবা চলিতে চলিতে তাহার হাঁটু ভাঙ্গিয়া পড়ে; পানের ডিমে (খোড়ায়) আক্ষেপ এবং খিল ধরা (সাল্ফ, বিরেট-আর্); পানের পাতার সন্ধিতে অত্যন্ত কষ্টদায়ক ভারিবোধ; ওলাউঠা বোগে পায়ে খিল ধরা।

ব্যান্হার। গায়ে কোন প্রকারের ফোটক এসিয়া যাওয়ার দরুণ অমুখ; মস্তিষ্কের অমুখের দরুণ আক্ষেপ (Convulsions); শিশুগণের দাঁত উঠার সময় মস্তিষ্কের অমুখ এবং আক্ষেপ (Convulsions); আক্ষেপ সম্বলিত অমুখ; খিল ধরা (বিশেষতঃ ওলাউঠা বোগে); আক্ষেপ (Convulsions); মৃগীদোগ; কোরিবা (Chorea); পক্ষাঘাত; উন্মত্ততা; হপিং কফ বা কাশি; আক্ষেপিক ঘুড়া কাশি; আক্ষেপিক হাঁপানি কাশি; সাংঘাতিক ওলাউঠা বা আসিয়াটিক কলারা; আক্ষেপিক শূল বেদনা; পাকস্থলী এবং অন্ত্রের প্রদাহ ইত্যাদি রোগে কুপ্রাম ব্যবহার্য।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ। স্বাভাবিক কল্পন এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে সমুদয় ইন্দ্রিয়ের অতিশক্ত চৈতন্য; মস্তিষ্কের অমুখে আক্ষেপ বা খেঁচনী বাহার দরুণ আক্রান্ত পেশীগুলি পর্যায়ক্রমে সঙ্কুচিত এবং শিথিল হয়; শিশুগণের দাঁত উঠার সময়ে আক্ষেপ (Convulsions); বোগী শিশু বা ছোট বালক বালিকা হইলে উপড় হইয়া শুইয়া থাকে এবং পাছা উঠাইয়া রাখে; বোতল হইতে জ্বলাদি ঢালিবার সময় যেরূপ শব্দ হয়

জলাদি গিলিবার সময় সেরূপ শব্দ হয়; ওলাউঠাতে পেট এবং পায়ের ভিমেই অধিক খিল ধবে; সামান্য আঘাত লাগিলে বা বমনের পরই অসুখের (আক্ষেপ ইত্যাদির) বৃদ্ধি; ঠাণ্ডা জল খাইলে অসুখের উপশম ইত্যাদি কুপ্রামের কতকগুলি প্রধান প্রাকৃতিক লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত। যে সন্ধ্যা পেশীর সাহায্যে হাত, পা প্রসারণ করা যায় ওলাউঠা বোগে সেই সকল পেশীতে গিল ধরিলে কুপ্রাম বিশেষ উপকারী।

সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ। আসিনিঙ্ক এবং প্রাচ্যামের কার্যের সঙ্গে কুপ্রামের কার্যের অনেক সাদৃশ্য আছে। কোন কোন বিষয়ে কুপ্রামের কার্যের সঙ্গে নাক্সবমিকা এবং সিকেল্ কণ্টামের কার্যের সাদৃশ্য আছে। আবার কোন কোন বিষয়ে কুপ্রামের কার্যের সঙ্গে বেলাডোনা, ক্যালেক-রিয়া কার্বোনিকা, চাণনা, ককিউলাম্, হিপার সাল্‌ফিউরিম্, পাল-নেটিল, ট্রামোনিয়াম্, সাল্‌ফাব এবং বিবেটাম্ আবারের কার্যের সাদৃশ্য আছে।

প্রতিষেধক ঔষধ। মরাম্, বেলাডোনা, কাম্ফার, ককিউলাম্, হিপার সাল্‌ফিউরিম্, নাক্সবমিকা, ইপিকাকিউএনা, মার্কিউরিয়াম্ কুপ্রামের প্রতিষেধক ঔষধ মধ্যে পরিগণিত।

ডাইলুশন বিচার। কুপ্রাম্ নোটেলিকামের ৬, ১২ এবং ৩০ ডাইলুশন সচরাচর ব্যবহার্য। ওলাউঠাতে ১২ ক্রম বিশেষ উপকারী। কোন কোন চিকিৎসক এই বোগে ৬ ডাঃ ব্যবহার করিয়া থাকেন। কিন্তু লেখক ১২ ডাইলুশন ব্যবহার করিয়াই যথোচিত ফল পাইয়া থাকেন। শিশুগণের আক্ষেপে কুপ্রাম্ নোটেলিকামের ৩ দশমিক ক্রমের গুঁড়া ১ গ্রেট্রণ মাত্রায় ব্যবহারে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। এই ঔষধের ১০০ এবং ২০০ ক্রমও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কুপ্রাম্ আসিটিকামের ৩য় এবং ৬ষ্ঠ দশমিকক্রমই সচরাচর অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার ১২ এবং ৩০ ডাইলুশনও অনেক চিকিৎসক ব্যবহার করিয়া থাকেন।

ডিজিটালিস্ পাপূ'রিয়া,—ডিজিট

(DIGITALIS PURPUREA,—DIGIT.)

ইউরোপের পশ্চিম এবং মধ্য দেশ এবং ইংলণ্ড ও আয়াব্লণ্ডের অনেকা-
নেক স্থানে এই গাছ জন্মে। বসন্ত কালে ইহার ফুল যখন প্রায় ৩ প্রফুল্লিত
হয়, তখন দুই মাসের ব্যবত যে গাছ জন্মিয়াছে, সে গাছ হইতে কাঁচা পাতা
সংগ্রহ করিয়া যথা নিয়মে ডাইলুট্ স্পিরিটে ইহার মূল আরোক প্রস্তুত
করিতে হয়।

সাধারণ ক্রিয়া। প্রথমতঃ নিউমোগ্যাস্ট্রিক (Pneumogastric)
এবং রক্ত সঞ্চালনের সহায়কাৰী (Vaso-motor) স্নায়ু দিয়া স্থম্পিণ্ড এবং
ধমনির পৈশিক পদার্থের উপর ডিজিটালিসের কার্য্য অতি প্রবল, বাহার
দ্রবণ রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়ার ত্বক্কলতা এবং স্থম্পিণ্ড ও নাড়ীর স্পন্দন অসম
(Intermittent) হইয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ, ইহা মস্তিষ্ক, মূত্র কোষ এবং
পরিপাক কার্য্য সম্বন্ধীয় যন্ত্রের কার্য্যের অনেক বৈলক্ষণ্য উৎপাদন করে।
নাড়ী অত্যন্ত মৃদুগতি বিশিষ্ট এবং অসম (Intermittent) হওয়া ডিজি-
টালিসের একটি প্রধান প্রকৃতি মধ্যে পরিগণিত।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মন। মনের অত্যন্ত উদ্বেগ (একন্, আন্, রাস্টন্); সর্বদা
ভয়েব আশঙ্কা, ভ্রান্তি পাকা এবং মনের অত্যন্ত অবসন্নতা, বাদ্য শুনিলে
যাণের দ্রুত্বে ভয় (সাবাইনা); কোন বিষয়ে চিন্তা করা অত্যন্ত কষ্টদায়ক এবং
স্মরণ শক্তির হ্রাস বা ত্বক্কলতা (হানাকার্ড, ক্রিভাজ, ল্যাক্, নাক্স-মর্ক,
নেট্রাম্-মিউর, ফস্-আস); ভাবব্যতীর জন্ম অত্যন্ত চিন্তা; কথ্য বর্ণিতে
অনিচ্ছা।

মস্তক। মাথায় গোলমেলে এবং ভারিবেধ; মাথাঘোরা এবং
উহার সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত চিন্তা, উদ্বেগ এবং অবসন্নতা (একন্); বসন্ত
হইতে দাঁড়াইলে মাথা ঘোরা (ব্রাই, সাল্‌ফ্) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে নাড়ী
অত্যন্ত মৃদুগতি বিশিষ্ট; গ্রীবাদেশস্থ পেশীর পক্ষাঘাত হইলে ঘেরূপ হয়,

বসিয়া থাকিলে বা চলিবার সময় মাথা পশ্চাৎদিকে সেক্রপ হেলিয়া পড়ে (আগারিকাস্); ঘুম আইসা আইসা সময়ে যেক্রপ হয়, মস্তিষ্কে হঠাৎ কেড়্ কেড়্ শব্দ হইয়া ভয় বা ওয়াব ভায় সেক্রপ হঠাৎ চমকিয়া উঠা; মাথা পূর্ণ থাকিলে যেক্রপ হয়, মাথায় সেক্রপ ভাবি এবং এলোমেলো বোধ; কপালে দপ্‌দপিয়া বেদনা (বেল্, চায়না); মাথাঘোরা এবং উঠার সঙ্গে সঙ্গে শরীরের কাঁপনী; কপাল এবং উঠাব দুই পার্শ্বে স্থলীবিধানের জায় অল্পভূত হয়; মাথা হেট কবিয়া উপড় হইলে মনে হয় যেন মস্তিষ্ক সমুখ পানে ঝুলিয়া পড়িয়াছে।

চক্ষু । চক্ষুর তাবা বিস্তৃত এবং উঠাতে স্পর্শ বা আলোক জ্ঞান থাকে না (বেল্, দিকটা, হায়োস্, ওশিয়ান্, ষ্ট্রামন); বস্তুগুলি সবুজ বা হবিদ্রাবর্ণ দেখায়; চক্ষু যোজক ঝিল্লা এবং চক্ষুর পাতার উপাঙ্গের মধ্যবর্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থির প্রদাহ (Inflammation of the Meibomian glands) (পাল্‌ন্, রাস্টোয়); প্রাহঃকালে পেট্টী বা কেতুনের দবন চক্ষুর পাতায় পাতায় লাগিয়া থাকে (ক্যাল্‌-কার্ল্, লাইকোপ্, মার্ক্, পাল্‌স্, সালফ্, সাইলিনি); চক্ষুর কেটিবাব মধ্যে দপ্‌দপানি; চক্ষে ঝাঝা দেখা; চক্ষুর সমুখে নানা প্রকারের রক্ত দেখা।

কর্ণ । জল সিক্ত করায় সময় কুটিয়া উঠিলে যেক্রপ হয় উভয় কানেই সেক্রপ যৌঁ সৌ শব্দ হয়।

মুখ মণ্ডল । মুখ মণ্ডল ফিকা বা শিটা, রুগ্ন এবং মৃতবৎ (আস্)।

পাকস্থলী । ক্রমশঃ শূন্যতা (আণ্টি-ক্লুড্, আস্, সাতিক্রোমেন্); অত্যন্ত পিপাসা (একন্ ব্রাইট্); ভয়ানক বমনোদ্যোগ (আণ্টি-লার্ভ্, হিপিকাক্, লোবিসিকা); বমন; পেত যেন পাড়বা যায়, যাহার দকণ রোগী মনে করে যেন সে মদিয়া বাইনেডে (টেবেকাম্); উদরোৰ্দ্ধ প্রদেশে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন এবং তাপ দিলে উৎপন্ন অত্যন্ত বেদনাক্রান্ত হয় এবং টাটায় (বেল্, ব্রাই, লাইকোপ্); মুখে মিষ্ট স্বাদ এবং মুখে লাগি উঠা; অত্যন্ত বমনোদ্যোগ, বমন দ্বারাও যাহা নিবারণিত হয় না; প্রাহঃকালে বমন; উদরস্থ আহার দ্রব্যাদি বমন, পাকস্থলীতে জ্বালাগ্নভব বাহা আহারবহা গলনালী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়; পাকস্থলীতে গিল ধরা।

মল । কোষ্ঠবদ্ধ । জলবৎ তরল ভেদ, মল সাদা বা ছাইয়া রঙ্গের ; দান্তের পর শীত বোধ ; কামল রোগের ভোগ সময়ে উদরাগ্নয় ।

মূত্রবন্ত্র । অনবরত মূত্র ত্যাগের ইচ্ছা এবং কোঁটার কোঁটার মূত্র ত্যাগ (আম্বু, এপিস্, কলোস্) ; রাত্রিতে বারম্বার মূত্র ত্যাগ (আম্বু, বোরাক্স, কেম্‌স্‌গ্রাম্, ফস্-আন্, সিপিয়া) ; মূত্র কাল্‌চে, ঘোলাঢিয়া এবং পরিমাণে অল্প (ক্যাফ্, চেলিডন্, সিনা) ; জ্বালা উৎপাদক মূত্র ত্যাগ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মূত্রাধারের গ্রীবাদেশে জ্বালাযুক্ত কর্তনবৎ প্রবল বেদনা ; মূত্রাধারের গ্রীবাদেশের প্রদাহ ।

পুষ্কর্যের জননেন্দ্রিয় । রাত্রিতে পুষ্কর্যেবোবে অনিচ্ছাপূর্বক বা অসাড় হাতু নির্গমন (পম্পদোব) ।

শ্বাস বন্ত্র । শ্বাস প্রশ্বাস অনিয়মিত (চিনিনাম্, জেল্‌স্), অত্যন্ত কষ্টকর এবং উহাব সঙ্গে সঙ্গে বারম্বার দীর্ঘ নিশ্বাস ; বুকের সমুদয় বস্তুরূপ একত্র জড়াইয়া গেলে যেরূপ হয়, বুকের মধ্যে সেরূপ কষ্টদায়ক আঁটা বোধ ; আক্কেপিক শুক কাশি, কাশিতে কাশিতে গলা দিয়া রক্ত বা রক্তের ছিট্‌ বিশিষ্ট শ্লেষ্মা নির্গমন (ফস্) ; বারম্বার দীর্ঘ নিশ্বাস টানিবার ইচ্ছা, কিন্তু নিশ্বাস প্রশ্বাসের সময় যেন বুকের মধ্যে কোন ব্যাঘাত জন্মে এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে শুক কাশি, বিশেষতঃ দীর্ঘ নিশ্বাসের সময় ; কাশি এবং গলা দিয়া নিষ্কৃত ময়দাদির স্থায় তরল শ্লেষ্মা নির্গমন ; বুকে ছাল উঠিয়া যাওয়ার স্থায় টাটানি ; চলিবার সময় এবং হেলান দিয়া শুইয়া থাকিলে শ্বাস কষ্ট ।

হৃৎপিণ্ড এবং নাড়ী । হৃৎপ্রদেশে অত্যন্ত কষ্টানুভব (ফাইসট্) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে হাতের অগ্রাংশে দুর্বল বোধ ; হৃৎপিণ্ড স্পন্দন না করিয়া যেন স্থগিত রহিয়াছে এরূপ অনুভূত হয় এবং উহাব সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত উদ্বেগ ; হৃৎপিণ্ডের কার্য অত্যন্ত দুর্বল (লাইকোপ্) ; হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন স্বাভাবিক অপেক্ষা বারে অধিক এবং অসম (Intermittent) (কোঁনিয়াম্, নেটাম্-মিউর, ক্যালী-কার্ক) এবং কখন কখন অনিয়মিত ; সামান্য নড়া চড়াতেই হৃৎস্পন্দনের উদ্রেক হয় ; রোগী মনে করে যেন তাহাকে কেহ একবার নাড়িলেই তাহার হৃৎপিণ্ডের কার্যাবরোধ হইবে ; হৃৎপিণ্ড বারম্বার স্থচী বিধানের স্থায় বেদনা । নাড়ী সূত্রবৎ সূক্ষ্ম (একন্), মুহুগতি বিশিষ্ট

এবং অসম (নেট্রাম্-মিউর), অনিয়মিত গতি বিশিষ্ট এবং ক্ষুদ্র; নাড়ী অত্যন্ত ক্ষুদ্র (আক্সিপিয়াম্, ক্যানাবিস্-ইণ্ড্, ওপিয়াম্, ফেরাম্)।

হাত, পা ইত্যাদি। এক হাত গরম এবং অপব হাত ঠাণ্ডা; বাম বাহুতে পক্ষাঘাতেব স্ৰাব্য অবশ এবং ভারি বোধ ও হাঁটুর চন্দলতা। পা ইত্যাদি নিম্ন শাখায় অত্যন্ত দুর্বলতা; হাঁটুর সন্ধিতে শোথের স্ৰাব্য স্ফীতি বা শোথ; দিনের বেলা পায়ের পাতার স্ফীতি এবং রাত্নিতে পায়ের পাতার স্ফীতি থাকে না; পা এবং হাঁটুতে অসাড় বা ক্রান্তি বোধ।

নিদ্রা। ঘুম ভাল হয় না এবং ঘুম হইলেও বোণী উঠার দরুন আপনাকে আপনি স্তম্ভ মনে করে না; নানা প্রকারের চিন্তার উদয় হইয়া ব্যর্থ হইয়া ঘুম ভাঙিয়া যায়।

জ্বর। গা অত্যন্ত ঠাণ্ডা; হাত পায়ের পাতা ঠাণ্ডা; ঠাণ্ডা হট্ টিয়া আঠা বস্ম (অস্, কাম্ফার : নাড়ী মুহ এবং অনিয়মিত স্পন্দন বিশিষ্ট; সামান্ত নড়া চড়াতেই মুহুগতি বিশিষ্ট নাড়ী চকল হয়, আভ্যন্তরিক স্ৰাব্য বোধ এবং বাহ্যিক উষ্ণত্ব; মরো মধ্যে গায় হঠাৎ দমকা উচ্চাভ্যন্তর।

বাবহার। স্ফপিত্ত বা বাহ্যিক রোগ; বক্ষশোথ (Hydrothorax); ক্ষুদ্রদের স্ফবায়ু উপনলের বিস্তৃতি (Emphysema); স্ফদ্রাব্যক ফিল্ম প্রদাহ (Pericarditis); স্ফপিত্ত বা ধমনির বিস্তৃতি বা স্ফাতি; নীল বোগ; শোথ বা শোথ স্ফলত রোগ স্ফল; উন্নয়; পাকস্থলী এবং বস্তুর অস্থব বা পিত্তজনিত অস্থব; কামল বোগ; গলা দিয়া রক্ত পড়া ইত্যাদি অস্থবে ডিজিটালিস্ ব্যবহার্য।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ। যে বোগেই হউক, স্ফপিত্ত আকাশ হইয়া নাড়ী স্পন্দন অনিয়মিত বা অসম হওয়া; অত্যন্ত আধাবক প্রদাহ বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরিক স্ফ বা অংশে শোথ; উষ্ণ স্ফ লক্ষণাদি বুদ্ধি; স্ফদ্রাব্য অবদর হইয়া পড়া; অত্যন্ত বলক্ষয় ইত্যাদি ডিজিটালিসের কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত। টেষ্ট (Teste) বস্তুর যে, স্ফলোক এবং পুরসের স্ফদ্রাব্য স্ফাতি থাকা ডিজিটালিসের একটা বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ। পেশীর উপর ডিজিটালিসের কার্য

আম্লিকা, আসিনিক এবং ফাইনস্টিগ্‌মার জায়। নিউমোগ্যাট্রিক স্বাস্থ্যর
১৩৫ ইহার কার্যের সঙ্গে টাটাং এমিটিক্, লোবিলিয়া এবং টেবেকামের
১৩৬ ইহার অনেক সাদৃশ্য আছে। মূত্র বহুর উপর ইহার কার্য অনেকটা
কল্টিকাম্ এবং সিলার জায়। জংপিণ্ডের উপর ইহার কার্যের সঙ্গে অণু
কোন ঔষধে^১ কার্যের সাদৃশ্য নাই বলিলেও বলা যাইতে পারে। তবে
জংপিণ্ডে ইহার কার্যের সঙ্গে আসিনিক্ এবং ক্যাল্‌মিয়ার কার্যের কতকটা
সাদৃশ্য আছে বলিলেও বলা যাইতে পারে।

প্রতিষেধক ভ্রমদ। ক্যাম্ফার, নাক্স, বনিকা এবং ওপিয়াম্
ডিজিটালিসের প্রতিষেধক ঔষধ মধ্যে পরিগণিত। ডিজিটালিস্ দ্বারা
নিষাক্ত হইলে সর্ব প্রকারের বেজিটেবেল্, আসিড্ (Vegetable acids),
বিনিগার (Vinegar), ক্যাম্ফার ইত্যাদি সেব্য।

ডাইলুশন বিচার। এই ঔষধের মূল আরোক এবং ১ম দশমিক
ক্রম সচরাচর ব্যবহার্য। অনেক চিকিৎসক ৩ এবং ৬ ক্রমও ব্যবহার করিয়া
থাকেন। তাঁহারা ৩ এবং ৬ ক্রম ব্যবহার করিয়া কি প্রকার ফল পাইয়া
থাকেন, সে সম্বন্ধ লেখক কিছুই জানেন না। লেখক স্বয়ং অনেক রোগীর
১৮ কংক্রিট মল আপোকে ২।৩ ফোটা মাত্রায় ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল
পাইয়া থাকেন। আবার আলোপ্যাথিক মতে চিকিৎসক মহাশয়গণ ইহার
৫ হইতে ১৫ ফোটা পর্যন্তও এক এক মাত্রায় ব্যবহার করিয়া থাকেন।
উহাতেও বোধ্যে কোন বিশেষ অনিষ্ট হইতে দেখা যায় না। এমতাবস্থায়
লেখক বিশ্বাস করেন যে ইহার মূল আরোক ২।৩ ফোটা মাত্রায় ব্যবহার
করিলে ১ম ক্রম অপেক্ষা অধিক উপকার দশিতে পারে।

ফেরাম্,-(লৌহ),-ফেরাম্

(FERRUM,—FERR.)

ফেরাম্ মেটেলিকাম্ (Ferrum Metallicum)

ফেরাম্ আসিটিকাম্ (Ferrum Aceticum) *

ফেরাম্ (লৌহ) অনেক প্রকারে প্রস্তুত হইয়া থাকে। যথা ফেরাম্ আসিটিকাম্ (Ferrum Aceticum); ফেরাম্ কার্বোনিকাম্ (Ferrum Carbonicum); ফেরাম্ আয়োডিয়াম্ (Ferrum Iodium); ফেরাম্ ম্যাগনেটিকাম্ (Ferrum Magneticum); ফেরাম্ মেটেলিকাম্ (Ferrum Metallicum); ফেরাম্ মিউরিয়াটিকাম্ (Ferrum Muraticum) এবং ফেরাম্ রিডাক্টাম্ (Ferrum Reductum)। ফেরাম্ আসিটিকাম্‌র ১ম দশমিক ক্রমের আরোক যথানিয়মে চূয়ান জলে প্রস্তুত হইয়া থাকে। ২য় এবং ৩য় দশমিক ক্রম ডাইলুট্ আকোহলে প্রস্তুত হয় এবং তৎপর অত্যন্ত ক্রমের আনোক রেক্টিফাইড্ স্পিরিটে প্রস্তুত হইয়া থাকে। কোন এক বিধিত হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয় হইতে পারকৃত লৌহের পাত ক্রয় করিয়া যথা নিয়মে জুগার অব্ মিক্‌র সঙ্গে মিশাইয়া ইহার ১ম হইতে ৬ষ্ঠ দশমিক বা ৩য় শততমিক ক্রমের গুঁড়া প্রস্তুত হইয়া থাকে। তৎপর যথা নিয়মে ইহার ৪র্থ এবং ৫ম শততমিক ক্রমে আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই প্রকার লৌহকে ফেরাম্ মেটেলিকাম্ বলে। ফেরাম্ আসিটিকাম্‌ই হুহু শরীরে অধিক পরীক্ষা করা হইয়াছিল। অতএব এই প্রকার ফেরাম্‌ই হোমিওপ্যাথিক মতে রোগ চিকিৎসায় অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রকৃত পক্ষে প্রায় সকল প্রকার লৌহের কার্যাই প্রায় এক শ্রেণীভুক্ত।

সাধারণ ক্রিয়া। রক্তের উপর ফেরাম্‌র কার্য এত প্রবল যে উহার দ্রবণ শরীরের সমুদয় অংশই অত্যন্ত তর্কণ হইয়া পড়ে এবং তদ্রূপ শরীরের পরিপোষণ কাণ্ডেরও অত্যন্ত ব্যাঘাত জন্মে। ইহা দ্বারা রক্তের জলীয় অংশ বৃদ্ধি হয়, আগ্‌লুমেণ্ট্ কনিয়া যায় এবং লাল কণার (Red corpuscles) সংখ্যাও কমে যাহার দ্রবণ শরীরের রক্তাৱতা (Anæmia) উৎপন্ন হইয়া থাকে। এজন্তই রক্তাৱতা রোগের চিকিৎসায় ফেরাম্ এত উপকারী।

ডাক্তার হিউজ্ (Dr. Hughes) বলেন যে, রক্তঃস্রাবের দোষ, অতিরিক্ত রক্তপ্রাণ, বা বায়ু, আলোক এবং যথাযোগ্য আহারের অভাব অথবা দুর্বলকারক অম্ল ইত্যাদি যে কোন কারণেই হউক না কেন, রক্তাশ্রিত শাশ্বৎ লৌহ এক সর্ব প্রাধান ঔষধ মধ্যে পরিগণিত। ডাক্তার হিউজ্ আরো বলেন যে চূণের (Lime) ভায় লৌহও শরীরের পরিপোষণার্থ একটি আবশ্যকীয় পদার্থ মধ্যে পরিগণিত। এই আবশ্যকীয় পদার্থ (লৌহ) আহার দ্রব্যের সঙ্গে অনবরত শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। আবার রক্তের লালকণার (Red-corpuscles) মধ্যেই অবস্থিতি করিয়া লৌহ ইহার কার্য করিয়া থাকে। আবার রক্তের লাল কণার ন্যূনতাই বক্তাশ্রিত (Anæmia) বলিয়া অনুমিত। অতএব অস্থির পরিপোষণের জন্য অস্থির সঙ্গে চূণের যে প্রকার সম্বন্ধ রহিয়াছে, রক্তের পরিপোষণের জন্যও রক্তের সঙ্গে যে লৌহের সে প্রকার সম্বন্ধ আছে তাহা অস্বীকার করা যাইতে পারে না। আবার রিবেল্ (Revel) পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে “রক্তাশ্রিত রক্তের মধ্যে লৌহের পরিমাণের কোনও পরিবর্তন দেখা যায় না। রক্তের লাল কণার সংখ্যা যতই কম হউক না কেন, রক্তের মধ্যে স্বেচ্ছ শরীরে যে পরিমাণ লৌহ আবশ্যক তাহা উহাতে বর্তমান থাকে এবং লৌহ থাকিলে রক্তের লাল কণার সংখ্যা যতই অধিক হউক না কেন শরীরে লৌহের পরিমাণ স্বাভাবিকই থাকে।” আবার ইহাও সত্য বটে যে, রক্তে লৌহের অল্পতা পরিপূরণ করার জন্য যত পরিমাণ লৌহ সেবন করান যায় উহার সমুদয় শরীরে সম্পূর্ণরূপে না শোষিয়া অনাবশ্যকীয় লৌহ মলের সঙ্গে নির্গত হইয়া যায়। যাহারা লৌহ খাইয়া থাকে তাহাদিগের মল পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই এই কথাটির সত্যাসত্য প্রমাণিত হইবে। উল্লিখিত মতগুলি পাঠ করিয়া ইহা বলা যাইতে পারে না যে লৌহ রক্তের এক আবশ্যকীয় পদার্থ স্বরূপ শরীরে শোষিয়া রোগ প্রারম্ভ করে! সুস্থ শরীরে অধিক মাত্রায় লৌহ সেবন করিলে যে রূপ লক্ষণাদি প্রকাশ পায় তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিলে ইহাই জানা যায় যে, অজ্ঞাত ঔষধের ভায় কেরামের কার্য্যও ঔষধের চালিত-শক্তি (Dynamic Agency) দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মন । মনের অত্যন্ত উদ্বিগ্ন এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পাকস্থলীর মধ্যে দর্পদপানি (পাল্‌স্); মতের সামান্য প্রতিবাদ করিলেই রোগী অত্যন্ত উত্তেজিত হয় (অরামু, ইগ্রেস্); সকল বিষয়েই রোগী (স্ত্রীলোক হইলে) উত্তেজিত বা অবসন্ন হয় (নাক্সবন্); মন অস্থির এবং গোলমালে হইয়া পড়ে, যাহার দক্ষণ রোগী স্থিরভাবে কোন বিষয়ে চিন্তা করিতে পারে না ।

মস্তক । মাথায় গোলমালে বোধ ; উপর হইতে নীচে •নামিবার সময় মাথা ঘোরা ; (ইহার বিপরীত অবস্থায় ক্যাক্-কার্ক্); জলের প্রবল স্রোতের দিকে তাকাইলে মাথাঘোরা (সাল্‌ক্); চলিবার সময় মাথা ঘোরা ; মাথায় রক্তাধিক্য ; মাথাব শিবা ক্ষীত এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মুখমণ্ডলে বারংবার দম্‌কা উঠানুভব (একন্, বেল্); রক্তাশ্রাবের পর শিরঃশীড়া ; কপালে অত্যন্ত বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পায়ের পাতা ঠাণ্ডা ; মাথায় হাতুড়ী মারার জায় বা দর্পদপিয়া বেদনা ; কপালের উন্নতংশে (Frontal eminences) চাপাবোধ, হাতদিয়া চাপিয়া ধরিলে বা বহির্বিদ্যুতে যাহার উপশম হয় ; মাথায়, কর্ণের পশ্চাত্তাং ভাগে সূচীবিধানের জায় বেদনা বা যাতনা কপাল পর্য্যন্ত বাড়া বিস্তৃত হয় ; মাথার বাম পার্শ্বে খোঁচা বিধার জায় বেদনা ; বামচক্ষু উপরিভাগে ঘাটিয়া ধরাব জায় বেদনা, হঠাৎ যাহার উদ্রেক হয় ; যাড় হইতে উর্দ্ধদিকে মাথা পর্য্যন্ত কনিয়া ধরাব জায় বেদনা বা যাতনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মাথার মধ্যে খোঁচা বিধার জায় বেদনা বা যাতনা ও উহাতে সোঁ সোঁ, গুন্ গুন্ শব্দ হওয়া ; মাথাব চুল পড়িয়া যায় (গ্রাক্, নাষ্ট্রিক্-আস্, দিপিয়া, সাল্‌ক্); স্পর্শনে মাথায় হাড় এবং চুলে বেদনা (চারনা, নার্ক্, মেজিরিয়াম্) ।

চক্ষু । চক্ষু আঁধার বা ঝাপ্সা দেখা ; চক্ষু জলপূর্ণ (ইউফ্রেন্); চক্ষু লালবর্ণ এবং উহাতে জ্বালাদগ্ন বেদনা বা যাতনা (আস্); চক্ষের সম্মুখে অন্ধকার দেখা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মাথা ঘোরা ; লিখিবার সময় বা পড়িবার সময় বেন সমুদয় অক্ষর একত্র মিশিয়া বা জড়াইয়া যায় ।

কর্ণ । ডাইন কানে টন্ টন্ শব্দ হয় ; কোন প্রকারের শব্দই কানে শুহ হয় না ।

নাসিকা । নাকদিয়া রক্তমিশ্রিত, পুঁথ সংযুক্ত, সবুজের আভাযুক্ত, চট্‌চটিয়া আঠা উগ্র ক্লেদ নির্গমন; নাকদিয়া রক্তপড়া; প্রাতঃকালে মাথা হেট করিয়া উপড় হইলে নাক দিয়া রক্ত পড়া; রক্তাক্ততা ধাতু বিশিষ্ট (Anæmic) রোগীর নাক দিয়া রক্ত পড়া ।

মুখমণ্ডল । মুখ মণ্ডল মৃতবৎ, মাটির রঙবিশিষ্ট (আর্স্); মুখ মণ্ডল ফিকা বা শিটা, সাদাটিয়া, ছাইয়া বা সবুজরঙ বিশিষ্ট, চক্ষু অচল এবং জেমনতিহীন ও গোলাকার নীলের রেখা দ্বারা পরিবেষ্টিত; মুখমণ্ডল আঙনের ছায়া লালবর্ণ (স্যাণ্ডিল) এবং শিরা গুলি মোটা; মুখমণ্ডল লালবর্ণ ও টলটলে এবং গাঁস আঙনে পোড়ার ছায়া জালাযুক্ত ।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য । কঠিন আহারীয় দ্রব্য শুষ্ক বোধ হয় এবং উহাতে কোন স্বাদই অনুভূত হয় না; ওষ্ঠ শিটা; গিলিবার সময় গলার মধ্যে চাপিয়া ধরাব ছায়া বা সফোচক বেদনা বা ব্যতনা; রক্তোৎকাশ ।

পাকস্থলী এবং উদর । অতিরিক্ত বা দুই ক্ষুধা (ব্রাই, আরোড্); ক্ষুধাশূন্যতা; সকল প্রকার আহার দ্রব্যেই অরুচি (অণ্টি-ক্রুড্, ইপিকাক্, নাস্, বম্, পাল্‌স্); আহারের পর উল্কার উঠা বা উদরস্থ আহার দ্রব্যাদি উঠিয়া পড়া (আর্স্, পাল্‌স্); আহারের পর বমনোদ্বেগ এবং উদরস্থ আহার দ্রব্যাদি বমন (আর্স্, পাল্‌স্); রাত্রি দুই প্রহরের পরই উদরস্থ আহার দ্রব্যাদি বমন অথবা প্রাতঃকালে আহারের পর উদরস্থ আহার দ্রব্যাদি বমন : উদরোদ্ধ প্রদেশ ফাঁপিয়া থাকে; আহারের পর পাকস্থলীতে চাপা-বোধ (ব্রাই, লাইকোপ্, নাস্, বম্); পাকস্থলীতে উষ্ণ এবং জ্বালামুখ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে প্লীহা-প্রদেশে বিলম্বের ছায়া ক্ষণিক বেদনা বা ব্যতনা। যকৃত প্রদেশ জাঁটা এবং পূর্ববোধ; যকৃতের বিবৃদ্ধি এবং চাপিলে উহাতে অত্যন্ত বেদনা বা টাটানি; সবিরাম অরোচ্য পর, বিশেষতঃ জ্বর পুাতন আকার ধারণ করিলে, প্লীহার বিবৃদ্ধি, উদর ক্ষীত এবং কঠিন হয় বটে, কিন্তু উহা উদরে দৃষিত বায়ু সঞ্চাব হেতু নহে; রাত্রিতে উদরে দৃষিত বায়ু সঞ্চাব হেতু শূল বেদনা বা পেটকাঁড়ানী; স্পর্শ করিলেই অস্ত্রের মধ্যে মোড়াইয়া পড়া বা ধোঁলিয়া যাওয়ার ছায়া বেদনা (মার্ক্), অথবা কোন প্রকারের রেচক ঔষধ সেবনের পর অস্ত্রে উক্ত প্রকারের বেদনা ।

মল । বারম্বার উদরাময়; মল জলবৎতরল (আম্, পডোক্, চায়না) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কখন কখন কৌথপাড়া, বা কৌথ পাড়া থাকে না এবং দান্তের সময় কখন পেটে বেদনা থাকে, কখন বা পেটে বেদনা থাকে না, কিন্তু উহার সঙ্গে সঙ্গে উদরে প্রায়ই দূষিত বায়ু সঞ্চিত হয় এবং আহার বা পানের পর উদরাময়ের বৃদ্ধি হয় (আলোজ্, কলোস্); চর্ঠাৎ জলবৎতরল, বেদনাহীন এবং গন্ধহীন উদরাময় (চায়না, পডোক্); উদরাময় এবং উদরস্থ অজীর্ণ আহার দ্রব্যাদির কণা বিশিষ্ট বেদনাহীন, অসাড়, আহারের সময়, বল ভেদ; কোষ্ঠবদ্ধ (আলাম্, ব্রাই, ক্যাক্-কার্ক্, নাক্স্, বম্, ওপিয়াম্, সালফ্); গুহোর মধ্যে স্তম্ভবৎ কুচি (মার্ক্, স্পাইজেল্, সিপিয়) ; ।

মূত্র যন্ত্র । বারম্বার মূত্র ত্যাগের ইচ্ছা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মূত্র নালীতে হুড়্-হুড়ী যাহা মূত্রাধারের গ্রীবা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়; যকৃত, বৃক এবং মূত্রকোষে বেদনা; অসাড় বা অনিচ্ছাপূর্বক মূত্রত্যাগ, বিশেষতঃ দিনের বেলা ।

জননেন্দ্রিয় । পুরুষেব রাহিতে অসাড় বা অনিচ্ছাপূর্বক শাত্ নির্গমন বা স্বপদোষ; শ্রবভঙ্গ; স্রীসহবাসেব অতিরিক্ত ইচ্ছা । স্রীলোকের নিয়মিত সময়ে অনেক পুত্র, বা বারম্বার অনেক দিন ব্যাপিয়া, প্রচুর রজঃস্রাব (চেলিডন্); জরায়ু হইতে অতিরিক্ত রক্তস্রাব, রক্ত কতক তরল এবং কতক থানি থানি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পেটে প্রসব বেদনার স্থান বেদনা এবং মুখমণ্ডলে অত্যন্ত উষ্ণাভাব (বেল্); পুরুষ সহবাসের ইচ্ছার হ্রাস এবং বন্ধ্যতা; যোনিদ্বার অত্যন্ত শুষ্ক বাহ্যিক দক্ষণ পুরুষ সহবাস অত্যন্ত কষ্টদায়ক হইয়া পড়ে; রজঃস্রাবের পূর্বে মাথায় চলকুটানের জ্বালা বেদনা, কানের মধ্যে টন্ টন্ শব্দ, জরায়ু হইতে লম্বা টুকরা টুকরা পক্ষীর জায় স্লেয়া নির্গমন; রজঃস্রাবের পর তিষ্ঠিরিয়া রোগের লক্ষণাদি প্রকাশ পায়; রজঃ-রোধের দক্ষণ তিষ্ঠিরিয়া রোগের লক্ষণাদি প্রকাশ পায়; ভ্রূণের স্থায় কষ্টহীন শ্বেতপ্রদর নিঃসরণ অথবা শ্বেতপ্রদর নিঃসরণের সঙ্গে সঙ্গে যোনি দ্বারে চুল-কানি, আলা এবং টাটানি ।

শ্বাস যন্ত্র । স্বরভঙ্গ, একবারে স্বরশূন্য বলিতে পারা যায় (কষ্ট্);

গলায় মধ্যে থুথুসে বোধ ; খাস কষ্ট এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে হাত দিয়া কোন বস্তু চাপিয়া রাখিলে বেদন হয়, বুকে সেরূপ কষ্টভাব (নাল্, বন্, ফস্) ; বুকের মধ্য দিয়া আড়া আড়ি বেদনা থাকার দরূপ খাস কষ্ট ; প্রাতঃকালে থুথু ভাঙ্গিয়া বিছানা হইতে উঠিলেই কাশিতে কাশিতে গলা দিয়া রক্ত পড়ে ; গলা দিয়া তরল, ফেণাযুক্ত, রক্তের ছিটযুক্ত, অল্প পরিমাণ শ্লেষ্মা নির্গমন ; অথবা গলা দিয়া পূর্ব সংযুক্ত, গচা গন্ধযুক্ত, সবুজের আভাযুক্ত, ফেণাবিশিষ্ট শ্লেষ্মা নির্গমন যাহা প্রাতঃকালে বৃদ্ধি হয় ; নড়িলে চড়িলে কাশির বৃদ্ধি ; আহ্বারের পর বায়ুনলের মধ্যে হৃদ্ হৃড়ীর দরূপ আক্ষেপিক কাশি ; নড়া চড়া এবং চলিবার সময়ই কেবল বুকে সঙ্কোচক গকমের খিল ধরা এবং কাশি ; কাশির আক্রমণ শেষ হওয়ার সময় খাস বোধ হয় ; শুষ্ক থুথুশে কাশি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গলা দিয়া রক্ত মিশ্রিত শ্লেষ্মা নির্গমন ; বক্ষস্থিতে চাপাবোধ এবং উহাৰ সঙ্গে সঙ্গে সর্দি এবং কাশি ; বাহ্যাদিগের হস্তমৈথুনের অত্যাস আছে তাহাদিগের প্রাতঃকালে এবং রাত্রিতে রক্তোৎকাশ ; যক্ষ্মাকাশিক্রান্ত রোগীর রক্তোৎকাশ ; অতিরিক্ত শারীরিক পরিশ্রম হেতু রক্তোৎকাশ ; উদরাময়, রক্তস্রাব ইত্যাদির পর রক্তোৎকাশ ; রক্তরোধের দরূপ রক্তোৎকাশ ; বুকের স্থানে স্থানে স্থান পরিবর্তনকারী বেদনা ; গলা দিয়া রক্ত মিশ্রিত শ্লেষ্মা নির্গমন (মিলিফোলিয়াম্) ; যে সকল লোকের সমাগ্র কারণেই মুখমণ্ডল আরক্ত হয় এবং নাক দিয়া রক্ত পড়ে, খাস কষ্ট এবং হৃৎস্পন্দন হয়, তাহাদিগের খাস যন্ত্রের অন্রুধ (একন্) ; প্রাতঃকালে কাশি, আহ্বাৰ করিলে বাহার উপশম হয় ; কাশিবার সময় বুকে স্থচীবিধানের স্থায় বেদনা ; আহ্বারের পর কাশি এবং কাশিতে কাশিতে উদরস্থ আহ্বার দ্রব্যাদি বমন ; রক্তোৎকাশি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে দুই বক্ষস্থির মধ্যবর্তী স্থানে বেদনা, আন্তে আন্তে চলিয়া বেড়াইলে বাহার উপশম হয় ; বুকে পূর্ণ এবং আঁটা বোধ ।

হৃৎপিণ্ড এবং নাড়ী । হৃৎপিণ্ডের কার্যের আধিক্য বা চাঞ্চল্য ; ক্রমাগত হৃৎপিণ্ডের অন্রুধ ; জীলোকের মৃত্তিকাপাতুরোগ (Chlorosis) ; সমুদয় বক্তবহা নাগীতে দপদপানি ; হৃৎপিণ্ডের উর্দ্ধাংশে কোমল (Bellows) শব্দ শুনিতে পাওয়া যায় ; নাড়ী ক্ষুদ্র এবং দুর্বল ; নাড়ী

মুহু গতি বিশিষ্ট (ডিজিট, ওপিয়াম) ; স্থলস্পন্দন, আন্তে আন্তে চলিলে
যাতার উপশম হয় ।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, হাত, পা ইত্যাদি । হাতের ক্ষীতি ; হাঁটুর
সন্ধি পর্য্যন্ত পায়ের ক্ষীতি (আস্, লেডাম্) ; রাত্রিতে বাহ এবং পক্ষে
ছিড়িয়া ফেলার ভ্রায় বেদনা ; বাম স্বন্ধের সন্ধিতে পক্ষাবাতের ভ্রায় বেদনা
বা যাতনা এবং তদ্রূপ বাহ সঞ্চালনে অশক্তি ; স্বন্ধের সন্ধিতে কসিয়া ধরা
বা ছিড়িয়া ফেলার ভ্রায় বেদনা । উরু বা কুচ্কির সন্ধিতে খোঁচা বিধা বা
ছিড়িয়া ফেলার ভ্রায় বেদনা বা যাতনা ; মোচ্ড়াইয়া পড়িলে বা খেঁচিলিয়া
গেলে বেক্রপ হয় আক্রান্ত স্থান স্পর্শ করিলে উহাতে সেক্রপ বেদনা অল্প-
ভূত হয় এবং এই বেদনা পায়ের টিবিয়া (Tibia) নামক অঙ্গ পর্য্যন্ত বিস্তৃত
হয় ; এই বেদনা সন্ধার সময় বিছানায় শয়নে বৃদ্ধি হয়, যাহার দরুণ রোগী
বিছানা হইতে উঠিয়া চলিয়া বেড়াইতে বাধ্য হয় (রাস্টেক্স্) ; পায়ে কসিয়া
ধরা ; পা শক্ত হয় বা উহা নোয়ান যায় না এবং উহাতে ভারি বোধ ;
রাত্রিতে কুচ্কি হইতে উরুদেশ পর্য্যন্ত ছিড়িয়া ফেলা বা হুল্ ফুটানের ভ্রায়
বেদনা, আন্তে আন্তে চলিয়া বেড়াইলে যাহার উপশম হয় ; পায়ের ডিমে
(পোড়ায়) অত্যন্ত কষ্টদায়ক খিল ধরা, বিশ্রাম কালীন, বিশেষতঃ রাত্রিতে,
যাহার বৃদ্ধি হব (সাল্ফ্) ; পায়ের পাতার তলা এবং আঙ্গুলে খিল ধরা
(সাল্ফ্) ; পায়ের পাতার শোথের ভ্রায় ক্ষীতি ।

জ্বর । প্রত্যেক দিন সন্ধার সময় শীত বোধ ; রসকয় হেতু জ্বর বা
হেক্টিক্ ফিবার (Hectic Fever) ; বারম্বার অল্পকাল স্থায়ী শীতবোধ এবং
শরীরের স্বাভাবিক সস্তাপের অভাব ; সন্ধ্যার জ্বর (কোইনাইনের অপ-
ব্যবহার জনিত অট্‌কান প্রবৃত্তন জ্বর) এবং উভার সঙ্গে সঙ্গে মথায় রক্তা-
ধিক্য বা রক্তাবরোধ, শিরার ক্ষীতি, উদরস্থ আহার দ্রব্যাদি বমন এবং
প্ৰীহাব ক্ষীতি, হাত পায়ের পাতার শোথ, উদরস্থ অক্ষীর্ণ আহার দ্রব্যাদির
কণাবিশিষ্ট উদরাময়, মুখমণ্ডল শিটা, সাপাটির বা হরিদ্রা বর্ণ, হাত, পা
ইত্যাদি শীর্ণ, কিন্তু পেটটা মোটা (ক্যাক্-কার্ল্), অনেকক্ষণ ধরিয়া প্রচুর
পরিমাণে চট্‌চটিয়া দ্রবনকারক ঘর্ম্ম ; ঘর্ম্ম লাগিয়া বিছানায় কাপড়ে হরিদ্রা
বর্ণের দাগ পড়ে ; ঘুমাইলে দুর্গন্ধবৃদ্ধ ঘর্ম্ম হয় ; ঘর্ম্মবহায় অল্পখের বৃদ্ধি ।

চৰ্ম্ম । চৰ্ম্ম শিটা বা ফিকা, হরিদ্রাবর্ণ, বা মলিন (মার্ক্), চূপে ঘাওয়ার স্থান শুষ্ক এবং কোমল (আরোড্) ।

নিদ্রা । রাত্রিতে অস্থির নিদ্রা বা ঘুম ভাল হয় না ; অত্যন্ত ক্লান্তি বোধের সহিত নিদ্রাবল্য এবং রাত্রিতে অস্থির নিদ্রা ; স্বপ্নের দরুণ ঘুমের ব্যাঘাত জন্মে ; প্রাতঃকালে অত্যন্ত শ্রান্তি বোধ ।

ব্যবহার । কোইনাইনের অপব্যবহার জনিত সবিরাম (পুরাতন আকারের) জ্বর বা অত্যন্ত অসুখ ; শোথ ; রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ ; রক্তশ্রাব ; অজীর্ণ ; রক্তাক্ততা ; মূত্রিকা পাণ্ডুরোগ (Chlorosis) ; শিরার ক্ষীতি বা বিস্তৃতি ; যক্ষ্মা কাশ ; হাঁপানি কাশি ; রক্তোৎকাশ ; মূত্রাধার প্রদাহ ; মূত্র কোষের ব্রাইট্‌স্ ডিজিজ্ (Bright's Disease) ; পক্ষাঘাত ; উদরস্থ অজীর্ণ আহার দ্রব্যের কণা সংযুক্ত তরল ভেদ (Diarrhoea Lienterica) ; যক্ষ্মাকাশাক্রান্ত রোগীর উদরাময় ; অস্ত্রের মধ্যে ক্রমি থাকার দরুণ পেটে বেদনা বা পেট কামড়ানি ; পুরাতন আকারের পালা জ্বর এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে প্লীহার বিবৃদ্ধি এবং কঠিনতা, শরীরের রক্তাক্ততা, শরীর শীর্ণ হওয়া, পেটটা ফুলা বা মোটা এবং হাত পায়ের পাতায় শোথের ন্যায় ক্ষীতি, চৰ্ম্ম শিটা, হরিদ্রা বা মলিন ; রক্তাদি শ্রাব হেতু রক্তাক্ততা ; খেত প্রদর ইত্যাদি অনুরূপে ফেরাম্ ব্যবহার্য্য ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । রোগী দুর্বল, অথচ তাহার মুখমণ্ডল আগুনের ছায় লালবর্ণ ; সামান্য পরিশ্রম, সামান্য বেদনা বা যন্ত্রণা কিম্বা মানসিক উত্তেজনা বা অবসন্নতাতেই মুখমণ্ডল লালবর্ণ হয় ; চোখা শরীর ; নানা প্রকারে রক্তশ্রাব হওয়ার ধাতু ; রোগী দুর্বল হইলেও আন্তে আন্তে চলিয়া বেড়াইলে অসুখাদির বৃদ্ধি ; অত্যন্ত জীর্ণ শীর্ণ ও শিটা হওয়া ; অত্যন্ত দুর্বলতা এবং বলক্ষয় এবং সহজেই অত্যন্ত ক্লান্ত হওয়া ; কোন নির্দিষ্ট সময়ে বেদনা বা যাতনাদির আক্রমণ ; রক্তশ্রাব হইলে রক্ত সহজেই জমিয়া যায় ; শীতে অসুখের বৃদ্ধি, রাত্রিতে, প্রাতঃকালে, আহার এবং পানের পর্ব, বিশ্রামকালীন, বিশেষতঃ স্থিরভাবে বসিয়া থাকিলে, গোলমালে, কথা বলিলে, উত্তাপে, নড়া চড়াতে অসুখের বৃদ্ধি ; সামান্যরূপে অঙ্গচালনা এবং নির্জনে থাকিলে অসুখের উপশম ; রোগী দুর্বল হইলেও তাহার মুখমণ্ডল সৰ্ব্বদা লালবর্ণ

থাকে ; রক্তাধিক্য ধাতু ইত্যাদি ফেরামের কতকগুলি বিশেষ ঔষধিক নিদিষ্ট লক্ষণ ।

সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ । রক্তের উপর ইহার কার্য অনেকটা মাস্কানিসের ছায় ; মস্তকের উপর ইহার কার্য বেলাডোনা, নাক্সবটিকা এবং কোইনাইনের কার্যের ছায় ; ফুস্কুসের উপর ইহার কার্য মিলি-ফোলিয়াম এবং আণিকার ছায় ; মূত্রাধারের উপর ইহার কার্য ক্যাছারাই-ডিস্, কোপেইবা এবং ইউপেটোরিয়াম্ পাপূরিয়ামের ছায় ; শুষ্ক এবং জরায়ুর উপর ইহার কার্য সাবাইনার ছায় । এতদ্ভিন্ন কোন কোন বিষয়ে ইহার কার্যের সঙ্গে আর্সিনিক্, ক্যাঙ্কেরিষা কার্বোনিকা, চায়না, জেল্-সি-মিয়াম্, হেলোনিয়াস্, ইপিকাকিউএনা, লাইকোপডিয়াম্, পাল্-সেটিলা এবং সাল্-ফাবের কার্যের সাদৃশ্য আছে ।

প্রতিষেধক ঔষধ । আর্সিনিক্, চায়না, হিপার সাল্-ফিউরিস্, ইপিকাকিউএনা, পাল্-সেটিলা, বিবেরটাম্ আব্রাম্ ইত্যাদি ফেরামের প্রতি-ষেধক ঔষধ মধ্যে পরিগণিত ।

ডাইলুশন বিচার । এই ঔষধের ডাইলুশন ব্যবহার সম্বন্ধে লেখক তাঁহার রোগীর চিকিৎসায় যাহা করিয়া থাকেন তাহাই এই স্থলে লিখিত হইতেছে । পুরাতন আকারের সবিরাম জ্বরে, যাহাতে প্রীহার বিবৃদ্ধি এবং কঠিনতা থাকে, শরীর শুকাইয়া চুন্দ্রিয়া যাওয়ার ছায় হয়, অথচ পেটটি মোটা থাকে এবং চক্ষের রক্তের চিহ্ন পাওয়া যায় না, হাত পায়ের পাতা শোথের ছায় ক্ষীত হয়, চর্ম্ম হরিদ্রা বর্ণ বা মলিন হয়, তাহাতে লেখক ফেরাম্ বেটেলিকামের ১ম দশমিক ক্রমের গুঁড়া ১ বা ২ গ্রেইন মাত্রায় প্রতিদিন ২ মাত্রা ব্যবস্থা করিয়া বিশেষ ফল পাইয়া থাকেন । রক্তাক্ততা, মূত্রিকা পাণ্ডু, যেত প্রদর, রক্তঃপ্রাব জনিত অস্থখে লেখক ফেরাম্ আর্সিটিকামের মূল আরোক ১২১০ ফোটা মাত্রায় ব্যবস্থা করিয়া থাকেন । শারীরিক পুষ্টির সহায়তা করার জন্য অথবা রক্তাক্ততার লেখক ফেরাম্ আর্সিটিকামের ১০১৫৫ ২০ এবং কখন কখন ৩০ কোঁটা মাত্রায় বা ফেরাম্ রিডাক্টামের (Ferrum Redactum) ১ম বা ২য় ক্রমের গুঁড়া ১ বা ২ গ্রেইন মাত্রায় ব্যবস্থা করিয়া বিশেষ ফল পাইয়া থাকেন । বলা কাশ এবং মূত্র বর্ষের অস্থখে ফেরাম্

মিউবিয়াটিকাম্ (পার্ ক্লোরাইড্ অব্ আয়রন্) ১০। ১২ ফোঁটা মাত্রায় ব্যবহারে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। রক্তপ্রাবের বৈলক্ষণ্য হেতু অস্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে রক্তাক্ততা এবং হাত পায়ের পাতাদিতে শোথ থাকিলে আয়ো-ডাইড্ অব্ আয়রন্ ১ম দশমিক ক্রমের গুঁড়া ১ বা ২ গ্রেইণ্ মাত্রায় সেবনে বিশেষ উপকার দর্শিতে দেখা যায়। পেটের অস্ত্রথে, যাহার দরুণ রোগীর উদরস্থ অঙ্গীর্ণ আহার দ্রব্যের কণাবিশিষ্ট তরল ভেদ হয়, ফেরাম্ আসিটিকান্ ১ম বা ৩য় দশমিক্ ডাইলুশন ১ বা ২ ফোঁটা মাত্রায় সেবনে বিশেষ উপকার দর্শে। অনেক চিকিৎসক এই ঔষধের ৬, ১২, ৩০ ইত্যাদি ডাইলুশনও ব্যবহার করিয়া থাকেন। তাঁহারা উহাদ্বারা কিরূপ ফল পাইয়া থাকেন সে সম্বন্ধে লেখক কিছুই বলিতে পারেন না। লৌহ অধিক মাত্রায় ব্যবহার না করিলে রোগ চিকিৎসায় বিশেষ ফল পাওয়ার সম্ভাবনা অতি কম, লেখক তাঁহার আপন চিকিৎসার ফল দেখিয়া এরূপ বিশ্বাস করেন।

গ্রাফাইটিস্‌,-(কাল সীসা),—গ্রাফ্

(GRAPHITES,—BLACK-LEAD,—PLUMBAGO,—GRAPH)

ছবি আঁকিবার জন্য বিলাতি পেনসিল্ প্রস্তুত হয় যে প্রকার সীসা ব্যবহৃত হইয়া থাকে, সে প্রকারের সীসা যথানিয়মে স্থগার অব্ মিকে নিশাইয়া ১ম হইতে ৩য় শততমিক বা ৬ষ্ঠ দশমিক ক্রম পর্যন্ত গুঁড়া প্রস্তুত হইয়া থাকে। ৩য় শততমিক বা ৬ষ্ঠ দশমিক ক্রমের গুঁড়া হইতে যথানিয়মে ৪র্থ এবং ততোধিক শততমিক ক্রমের আরো প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া। চর্ম, লিম্ফেটিক্ (Lymphatics), পরিপাক কার্য সম্বন্ধীয় যন্ত্র এবং জননেন্দ্রিয়ের উপর গ্রাফাইটিসের কার্য অতি প্রবল। চর্মের কল্কানি এবং খোসা বিশিষ্ট ক্ষুদ্র উৎপাদন করা এই ঔষধের একটি বিশেষ প্রাকৃতিক গুণ বা শক্তি মধ্যে পবিগণিত। স্ত্রীলোকের ডিম্বকোষ (Ovaries) এবং পুরুষের অণুকোষের উপরও ইহার বিশেষ কার্য দেখিতে পাওয়া যায়।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মন । সর্কদা হুংথ এবং নিরাশার ভাব (ইথেন্স, কন্স, নেট্রাম-মিউব) ; মৃত্যু ব্যতীত রোগী আর কোন বিষয়েই চিন্তা করে না (একন্স, অাস্) ; শোক প্রকাশ করার স্বভাব ; হুংথ প্রকাশ করা এবং কাঁদিবার স্বভাব (ইথেন্স, পাল্‌স) ; সর্কদা ভয়ের আশঙ্কা এবং উঠার সঙ্গে সঙ্গে কাঁদিবার ইচ্ছা (নেট্রাম-মিউব) ; সমুদয় বিষয়েই সন্দেহ, যাহার দৃশ্য কোন কার্য্য করিবে কি না সে বিষয়ে রোগী কিছুই স্থির করিতে পারে না ; অন্য মনকতা : সমুদয় বিষয়ই ভুলিয়া বাওয়া (আনা-কার্ড, ল্যাক্, নাক্স-মক্) ; সন্দেহ চমকিয়া উঠার স্বভাব ; কোনও কার্য্য করিতে অনিচ্ছা ; সহজেই বিরক্ত হওয়া এবং চটগা উঠা ।

মস্তক । মেদা করিলে যেকূপ হয়, প্রাতঃকালে ঘুম হইতে উঠিলেই মাথায সেরূপ অন্তত্ব হইয়া (চায়না, নায়্‌বন্স) ; মাথা হেট করিয়া উপুড় হইলে এবং উঠার পর সোজা হইলে মাথাযোরা (বেল) ; প্রাতঃকালে জাগিলেই মাথাযোরা এবং মাথায় গোলমালে বেদা ; প্রাতঃকালে জাগিলেই শিরঃপীড়া ; মাথায় বেদনা, যাহার দৃশ্য মনে হয় যেন মাথা অৰণ এবং ভাবি হইয়া বহিরাছে ; মাথায় বিশেষতঃ উঠার পশ্চাত্তানে, আঁটিবা ধবার ন্যায় বেদনা বা ব্যতনা ; বহুঃসংখ্যক সমস্ত শিরঃপীড়া এবং উঠার সঙ্গে সঙ্গে উল্কাব উঠা এবং বমনোদ্গম ; মাথায় চাপিয়া ধরার জায় বেদনা ; মাথাচুমানি ; মাথায় চুল পড়িয়া বাওয়া (নেট্রাম-মিউব, নাইটিক-অাস্, পিটোন্স, কন্স, সাল্‌ক্) ; মাথায় বিকচ (Pinxema) বাহাতে পুরু এবং বিস্তৃত বকমের খোলা বা চুমটী পড়ে, বাহোর দৃশ্য চুল জটার জায় একত্রিত হয় (বারোলা) এবং স্পর্শ করিলে বাহাতে বেদনা এবং টাটানির উদ্বেক হয় (মার্ক্, নেক্সিরিয়াম্, নাইটিক-অাস্, লাটিকাপ্, সোবিনাম্) ; মাথায় বাহোর বেদনায় জায় বেদনা বাহা এক পাংখেট অর্ধেক অন্তত্ব হয় এবং বাহা গ্রাসা এবং দাঁত পশাথ বিস্তৃত হয় ; ন্রাথার তিক উপরিভাগে জ্বালা-হুতব ; মাথায় হৃৎকম্প পূর্ব সুসংলত হুত্বী ।

চক্ষু । চক্ষু অস্বাভাবিক সহ হয় না ; চক্ষু লাল বর্ণ এবং চক্ষু দিয়া জল পড়া (একন্স, বৈল্, ইথেন্স, মার্ক্, সাল্‌ক্) ; চক্ষুর মধ্যে গরম, জ্বালা

এবং কাম্‌ডানীৰ জায় যাতনা (আস্, মার্ক্-কর); চক্ষে আলোক এক
 বারেই সহ্য হয় না (একন্, বেল্. মার্ক্); স্বর্ষ্যের আলোকে চক্ষের মধ্যে
 ছুগ্নী বিধানের জায় যাতনা অল্পভূত হয়; চক্ষু দিয়া জল পড়া (আস্, ইউ-
 ক্লেস্, মার্ক্-কবু); চক্ষুর পক্ষে (Eye-Lashes) শুকনা কেতুর পড়া; চক্ষুর
 পাতার দ্বার প্রদাহযুক্ত (মার্ক্-কর, সাল্ক); চক্ষুর বহির্দিকের কোণ প্রদাহ-
 যুক্ত; চক্ষুর পাতা উল্টিয়া পড়া; চক্ষে টাটানি (কটা); মাথা হেট করিয়া
 উপুড় হইলে সম্মুখের বস্ত্রগুলি কাল দেখায়; চক্ষুর কর্ণিমাতে (Cornea) ক্ষত
 বা ফোঁদার জায় কুসুড়ী; চক্ষুদ্বারা উগ্র জালা উপাদক তরল ক্রৈদ বা পুঁয়ের
 জায় ক্রৈদ নিঃসরণ; চক্ষুর পাতায় ভারি, শুক, চাপা এবং উষ্ণাত্তব (একন্);
 প্রাতঃকালে চক্ষুর পাতায় পাতায় লাগিয়া থাকে (আলাম্, লাইকোপ্,
 নেট্রাম্ মিউর, পাল্‌স্, সাল্ক্, জঙ্ক্); চক্ষুর নিম্নের পাতায় অজ্ঞানী বা
 চক্ষুগ্রন (Nyte) এবং উচ্চাতে কনিয়া ধরার ন্যায় বেদনা বা যাতনা (লাই-
 কোপ্, পাল্‌স্); চক্ষু পদাহ এবং তদ্রূপ চক্ষুর পাতা লাল বর্ণ এবং ক্ষীত ।

কর্ণ । মাড় সঞ্চালন করার সময় কানে কেড়্ কেড়্ শব্দ
 হওয়া (ব্যারাইটা); কানের মধ্যে গুন্ গুন্, সৌ সৌ এবং কেড়্
 কেড়্ শব্দ হওয়া (চায়না); বধিরতা বা কানে কম শুনা এবং উচ্চর সঙ্গে
 সঙ্গে কানের মধ্যে গুক্ বোধ; কানের মধ্যে হুতী বিধানের জায় যাতনা
 অল্পভূত হয় (কোনায়াম্, কালী-কাস্, পাল্‌স্); কানের মধ্যে অর্জি
 বোধ; কান হইতে তরল মিশ্রিত, জলবৎ তরল, ছগন্ধাত্ত, চট্‌চট্‌য়া আঠা
 পুঁয় নির্গমন (অরাম্, বোবিষ্টা, হিপ্-সাল্‌ফ্); কানের পশ্চাৎ ভাগে ছাল
 উঠিয়া যাওয়ার জায় ক্ষত এবং উচ্চা দিয়া কল্‌তান পড়া (ক্যাঙ্ক্-কাস্,
 হিপ্-সাল্‌ফ্, পিট্রোল্), এই ক্ষত গ্রীবা এবং গাল পর্যন্তও বিস্তৃত হয়;
 কণের নিম্নভাগস্থিত গ্রহির ক্ষীত; একটী বড় গোলার ন্যায় বস্ত্র লাগিয়া
 থাকিলে ঘেরূপ হয়, কানের পশ্চাৎভাগে সেরূপ অল্পভূত হয়; ছই কণের
 পট্‌হই যেন একটী সাদা পদার্থ দ্বারা আবৃত, কিন্তু উচ্চাতে ছিন্ন হয় নাই;
 কানের মধ্যে বহির্ভাগ লালবর্ণ এবং উচ্চাতে ছাল উঠিয়া যাওয়ার জায়
 দেখায়; কানের মধ্যে হিম্‌হিম্‌ শব্দ হওয়া; কানের মধ্যে বন্দুকের শব্দের
 জায় প্রতিধ্বনি হওয়া ।

নাসিকা। নাকের সকল প্রকারের গন্ধই লাগে বা সহ্য হয় না (একন্, আগারিকাস্, অরাম্, বেল্, কল্চ, হিপ্-সাল্ফ, লাইকোপ্); রোগী ফুলের ভাল গন্ধও সহ্য করিতে পারে না; নাকের মধ্যে ক্ষত এবং বেদনাতুচ্ছ (মার্ক্, নাইট্রিক্-অ্যাস্); নাকের মধ্যে এবং উহার উপরে শুষ্ক খোসা বিশিষ্ট ক্ষত এবং নাসারিক্কের মধ্যে ফাটানুচ্ছ ঘা (আলাম্, আণ্টি-ক্লুড্, অরাম্, ক্যালী-বাইক্লম্, নাইট্রিক্-অ্যাস্, পাল্‌স্); নাক দিয়া রক্ত মিশ্রিত শ্লেষ্মা নির্গমন (হিপ্-সাল্ফ); নাকের মধ্যে দ্রবীভূত পুঁথির সঞ্চার (থুজা); নাকের মধ্যে শুষ্কানুভব (বেল্, ক্যালী-বাই); নাসিকার ক্ষতি।

মুখ মণ্ডল। মুখমণ্ডল নলিন বা শিটা (অ্যাস্, ক্যাম্পোবেজ্); নাকের জাল লাগিয়া থাকিলে সেকপ হয়, মুখমণ্ডলে সকল সেকপ অনুভূত হয় (আলাম্, ব্যাবাইটা-কার্ক, বোবাক্স, ক্যালেন্ড্); অত্যন্ত ঠাণ্ডা লাগিলে সেকপ হয়, ওঁস এবং নাক সেকপ ফাটে এবং টাটাই বা চড়্ চড়্ করে (আণ্টি-ক্লুড্, অরাম্); মুখ মণ্ডলে চূর্ণানিবৃত্ত এবং চুইলে ঘালা হইতে কল্‌তানি নির্গত হয় (হিপ্-সাল্ফ, লাইকোপ্); মুখ মণ্ডলের বিদগ্ধের হ্রায় (Erysipelatous) প্রদাহ এবং ক্ষতি (রাস টক্); মুখ মণ্ডলে কল্‌তানিবৃত্ত বিকচ (Rozema), বিশেষতঃ টুটী এবং ওঁর্টের চতুষ্পাশ্বে (ক্যাক্-কম্, লাইকোপ্); হ্রাস্তির নিম্নস্থিত গ্রন্থির ক্ষতি, বাহ্য প্লামেন অত্যন্ত বেদনাতুচ্ছ হয় বা টাটায়।

মুখ গহ্বর এবং গলার মধ্যে। দন্তশূল, কোন প্রকারের ঠাণ্ডা দ্রব্য পান করিলেই যাহার অধিক উদ্বেক হয় (আণ্টি-ক্লুড্, হাইফিস্, সাল্ফ); নান্দ ক্ষীত (বেল্, মার্ক্, অরাম্); গঠেব কোণে ফুসুড়ী (আণ্টি-ক্লুড্, লাইকোপ্, ম্যাক্সোইন); প্রাতঃকালে মুখ অতিরিক্ত পরিমাণে লাল উঠা; হিল্লের নীচে এবং অগ্রভাগে জ্বালা উৎপাদক দোষ পড়া (মার্ক্, নাইট্রিক্-অ্যাস্); মুখোত্তর দ্বাদ (অ্যাস্, রাই, পাল্‌স্) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে টক্ উদ্যার উঠা (চারনা, নাপ্-বম্, সাল্ফ)। ডেলার হ্রায় কোন একটি বস্তু লাগিয়া থাকিলে সেকপ হয়, কোন দ্রব্য গিলিবার সময় গলার মধ্যে সেকপ অনুভূত হয় (বেল্, ল্যাক্); চোক গিলিবার সময় আহার বহা গলনালীর মধ্যে স্ফোচনের হ্রায় অনুভূত হওয়ার দক্ষণ উর্ক উঠে।

পাকস্থলী এবং উদর । সকল প্রকারের মাছ মাংসেই অরুচি (আলাম্‌, আর্বিকা, কার্কো-বেজ্‌, পাল্‌স্‌) ; লোস্তা দ্রব্যে অরুচি ; মিষ্ট দ্রব্যে অত্যন্ত অরুচি এবং উহাতে বমনের উদ্রেক হয় ; উদরস্থ আহার দ্রব্যাদির স্বাদি বিশিষ্ট বায়ুদ্বার উদগার উঠা (আন্টি ক্রুড্‌, কার্কো-আনিমেল্‌, ক্যাক্‌-কার্ক্‌, ফস্‌, পাল্‌স্‌, চাগনা) ; বৃক্‌ জালা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে উগ্রগন্ধযুক্ত উদগার উঠা ; আহারের পর হিকা ; উদগার উঠার উপক্রম হয়, কিন্তু উদগার উঠে না ; বমনোদ্যোগ, প্রাতঃকালেই বাহার অধিক উদ্রেক হয় (ক্যাক্‌-কার্ক্‌, নাক্স্‌-বম্‌) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে দুর্বলতা এবং শরীর কম্পন, রজঃ স্রাবের সময় বমনোদ্যোগ ; উদরস্থ সমুদয় আহার দ্রব্যাদি বমন (ইপিকাক্‌) ; টক স্বাদ বিশিষ্ট পদার্থ বমন ; পাকস্থলীতে চাপাবোধ ; গা বমী বমী করা বা পেট গুলিয়া বা মোচড়াইয়া উঠা ; পেট কামড়ানী বা পাকস্থলীতে সন্ধোচক বেদনা ; পাকস্থলীতে দূষিত বায়ু ব সঞ্চার ; কোন নির্দিষ্ট সময়ে পাক-স্থলীতে বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে আহারের পরই উদরস্থ আহার দ্রব্যাদি বমন ; পাকস্থলীর পুৰাতন প্রদাহ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পিপাসা, বিশেষতঃ মদ্য পানে অত্যাচারের পর ; পাকস্থলীর পুৰাতন শ্লেষ্মিক রোগ এবং তদ্রূপ বারম্বার উদগার উঠা ; পাকস্থলীতে জ্বালাভব, বাহার দরুণ ক্ষুধার উদ্রেক হয় । বাম হাইপোকণ্ড্রিয়ামে (Hypochondrium) জ্বালাভব ; উদর অত্যন্ত ক্ষীণ এবং কঠিন (আস্‌, ব্যারাইটা, ক্যাক্‌-কার্ক্‌, মার্ক্‌) ; দূষিত বায়ু বৃদ্ধ হইলে যেকপ হয়, উদরে সেরূপ পূর্ণ বোধ (কার্কো-বেজ্‌) ; গুলিয়ার দিয়া প্রচুর পরিমাণে অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত দূষিতবায়ু নিঃসরণ (আলোজ্‌, ব্রাই, কল্‌চ্‌) ; রোগী কোনরূপে আঁটিয়া কাপড় পরিতে পারে না (কার্কো-বেজ্‌, ক্যাক্‌-কার্ক্‌, ল্যাক্‌) ; কুচকির গ্রন্থির ক্ষীণি (ক্যাক্‌-কার্ক্‌, মাক্‌) ; কুচকিতে দাঁদের ত্রায় ফুসুড়া ; উদরে গৌঁ গৌঁ শব্দ হওয়া ।

মল এবং মলদ্বার । মল সরুনেড়, গোলাকার, স্ত্রবৎ কুমির ত্রায়, কাল্‌চে, উদরস্থ অজীর্ণ আহার দ্রব্যের কণাবিশিষ্ট, অত্যন্ত অসহ্য দুর্গন্ধযুক্ত ; মলের সঙ্গে অধিক পরিমাণে সাদা শ্লেষ্মার ত্রায় পদার্থ থাকে ; মল মোটা, বড় নেড় এবং হতার ত্রায় শ্লেষ্মা দ্বারা জড়িত ; মল কঠিন এবং বারম্বার

বাহ্যের বেগ ও মল যেন গুহ দ্বারে দৃঢ় ভাবে লাগিয়া থাকে ; মলত্যাগের পর গুহদ্বারে স্লেয়া লাগিয়া থাকে (আন্টি-ক্লুড্) ; গুহদ্বারে চুলকানি (আলাম্, আর্স্, সিনা, ক্যাম্, সাল্ফ্) ; মলত্যাগের পর গুহ দ্বার ধোয়া-ইলে বা মুছিলে গুহদ্বারে স্থলীবিধানের দ্বার বেদনা, জ্বালা বা টাটাকি ; অর্শের বলী সম্বলিত গুহ বাহির হইয়া পড়া (পক্ষাঘাতের দ্বার) : গুহে অর্শের বলী এবং উহাতে ছাল উঠিয়া যাওয়ার দরুন অত্যন্ত জ্বালা অধুত হয় ; গুহদ্বারে কাটা, বাহার দরুন মলত্যাগের সময় গুহদ্বারে কঠিনবৎ প্রবল বেদনার উদ্রেক হয় এবং তৎপর অনেককণ পর্য্যন্ত গুহদ্বারের সঙ্কোচন এবং কন্কনানি ; কোষ্ঠবদ্ধ ; মল লম্বা কঠিন, গুটিলে এবং স্থলবৎ স্লেয়াতে মিশ্রিত ; মল তরল এবং উদরস্থ অজীর্ণ আহার দ্রবোর কথা বিশিষ্ট ।

মূত্র যন্ত । বারম্বার মূত্র ত্যাগেব ইচ্ছা, কিন্তু বেগ দিলে একবারে অতি অল্প পরিমাণ মূত্র নির্গত হয় (একন্, এপিস্, ক্যাস্, কালোস্, ডিজিট্) ; বারম্বার মূত্রত্যাগ (এপিস্, আর্জেন্ট-মেট্, সিপা, কন্-জান্) ; রাত্রিতে অনিচ্ছা পূরক বা অন্যদে মূত্র নির্গমন বা মূত্রের বোরে বিছানার প্রস্রাব করা (অণিকা, ক্যাস্, কুপ্রান্, পালস্) ; মূত্রনাশী সঙ্কচিত হইলে যেক্রপ হয়, মূত্র সেক্রপ অত্যন্ত সরুদ্বারে নির্গত হয় ; মূত্র ঘোলাটিয়া (চেলি-ডন, সিনা, ডি'জিট্) এবং উহার নীচে সাদা (ক্যাক্স-কাক্স্, ক্যাস্, কালোস্), অথবা লালচে তলানী পড়ে (বেল্, কার্কো-বেজ্, ক্রিয়াজ্, সিপিবা) ।

জননেদ্রিয় । পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগের আশ্রক চর্শ্ব (Prepuce) এবং অণ্ডকোষের শোথের দ্বারা ক্ষতি ; জ্বীয়হবাসের অতিরিক্ত হচ্ছা (আগারি-কাস্, ব্যাটাইটা-কাস্) ; পুরুষাঙ্গ অত্যন্ত প্রবল বেগে খাড়া হয় ; জ্বীয়হ-বাসে ধাতু নির্গত হয় না ; অণ্ডকোষদ্বারে চুলকানি এবং কণ্-তর্পণ বিশিষ্ট কুস্মুদী (হিপ্-নাল্ফ্, রাস্টিজ্) । শ্বেত প্রদর এবং শুক্লবর্ণ বোনিদ্বার দিয়া প্রচুর পরিমাণে তরল, সাদা স্লেয়া নির্গমন এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কোমবে চর্মলবোণ ; প্রথম রজঃস্রাব গোণে হয় (পাল্ফ্) ; দ্বিতীয় ব্রাহ্ম শ্বেত প্রদর, পাকিয়া পাকিয়া, প্রবলবেগে বাহ্য নির্গত হয় ; নিয়মিত সন্দের অনেক পর, আত অল্প পরিমাণ কঁকা রজঃস্রাব (পাল্ফ্) ; বোনিদ্বারে ছাল উঠিয়া

যাওয়ার ভায় জালা এবং টাটানি ; বাম ভিষকোষের অত্যন্ত বেদনামুক্ত ক্ষীতি ; রজঃস্রাবের সময় উদরোদ্ধি প্রদেশে বেদনা, যাহার দরুণ মনে হয় যেন উদরস্থিত বস্ত্রাদি ছিড়িয়া থগু থগু হইবে ; ঘোনির দিকে ভয়ানক কষ্টদায়ক চাপবোধ ; রজঃবোধ এবং উচ্চার সঙ্গে সঙ্গে হাত পারে ভারি-বোধ ; রজঃস্রাব আরম্ভ হওয়ার পূর্বে ঘোনিতে অত্যন্ত চুল্কানি (ক্যালেন্ট, অক্টোইট্) ; স্তনের বোঁটায় অত্যন্ত টাটানি (কাইটোল্) ; গর্ভাবস্থায় বা রজঃস্রাবের সময় প্রাতঃকালে বমন বা বমনোদ্বেগ (ক্যালী-কার্ক্, নাস্ক-স্ক্, পাল্, সিপিরা) ; স্তনে কোড়াদি অস্ত্র দ্বারা কাটিয়া দিলে কাটা স্থানে অত্যন্ত কঠিন দাগ থাকে ।

শ্বাস যন্ত্র । গলার মধ্যে টাঁচিয়া ফেলার ভায় যাতনা অনুভূত হয় ; বুকের মধ্যে ছাল উঠিয়া যাওয়ার ভায় জালা বা টাটানি ; রায়ে কাশি, দীর্ঘ নিশ্বাস টানিলে যাহার উদ্রেক হয় ; বুকে আঁটাবোধ,—হাঁপানি ; হৃৎস্পন্দন বা হৃৎপ্রদেশে দপ্‌দপানি ।

ঘাড় এবং পৃষ্ঠ দেশ । শয়ন করিলে অথবা ঘাড় বাঁকা করিবার সময় গ্রীবার পার্শ্ব হইতে দৃক পর্য্যন্ত গ্রন্থির ক্ষীতি এবং উহাতে বেদনা, যাহার দরুণ মনে হয় যেন ঘাড় শক্ত হইয়াছে বা উহা কসিয়া ধরিয়াছে ; ঘাড় ছিড়িয়া ফেলার ভায় বা কর্তনবৎ বেদনা ; ঘাড় শক্ত হয় বা উহা নোরান যায় না ; খেঁচলিয়া গেলে বা মোচড়াইয়া পড়িলে ঘেঁকণ হয়, কোমরে নেক্রপ বেদনা বা যাতনা ।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, হাত, পা ইত্যাদি । সমুদয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গে পক্ষা-বাতের ভায় দুর্বলতা এবং অবশ বোধ, যাহার দরুণ অনেক সময় উহা অসাড় হইয়া পড়ে । বাম হস্তে ছিড়িয়া ফেলা বা বাটিয়া ধরার ভায় বেদনা বা যাতনা ; হাতের চর্ম্ম কঠিন এবং উহার স্থানে স্থানে ফাটিয়া যায় (টিপ্-সাম্) ; হাতের আঙ্গুলের সন্ধিতে বাতের ন্যায় ক্ষীতি ; হাতের আঙ্গুলের ফাঁকে ছাল উঠিয়া যায় এবং উহাতে কল্‌তানির স্ফোরণ হয় ; দাঁদ হইলে ঘেঁকণ হয় াতের আঙ্গুলের নথ নেক্রপ পুঙ্ক হয় ; হাঁটু এবং কুচ্কির সন্ধির ভাজে ভাজে ছাল উঠিয়া যাওয়ার ভায় ক্ষত হয় ; পায়ের আঙ্গুলের ফাঁকে ছাল উঠিয়া যাওয়ার ভায় ক্ষত এবং উহাতে জালা এবং

চিড়িক মারা (মার্ক) ; ইটুর পশ্চাৎভাগের গর্ভের স্থায় স্থানে দাঁদের স্থায় ক্ষুদ্রী ; উক্তে অবশবোধ এবং উহা শক্ হয় বা উহা নোয়ান বাব না ; পায়ের অস্থিরতা, অর্থাৎ উহা অনেকক্ষণ একভাবে রাখিতে পারা যায়না ; পায়ের ডিমে (খোড়ার) খিল ধরা (কান্দ-কার্ক, কান্দাব, ফেরাম, নাস্ক-বম্) ; ক্ষুদ্র সন্ধিবাতে যেরূপ হয়, পায়ের পাতা এবং পায়ের আঙ্গুলে ছিড়িয়া ফেলার স্থায় সেরূপ বেদনা বা যাতনা ; পা এবং পায়ের পাতার ক্ষতি ; পায়ের গোড়ানীতে (গুড়মুড়াতে) জালা এবং হুড়-হুড়ী ; পায়ের আঙ্গুলের নথ পুরু এবং আবড় খাবড় (আণ্ডি কুড়) ; বাকো করার সময় ইটুর কটি-নতা ; কুট্ কিতে দাঁদের স্থায় ক্ষুদ্রী ।

চর্ম্ম । শরীরের স্থানে স্থানে চুলকানি বিশিষ্ট একত্রিত ক্ষুদ্রী এবং উহা হইতে ক্ষতকবক, জলবৎ তবল, চট্ চট্খা আঠা কল্কানি পড়া (ক্রিমেষ্ট, পিটোন্, রাস্টেক) ; শরীরের অনেক স্থানে চুলকানি (রাস্টেক, কট, সাল্ক) ; শরীরের স্থানে স্থানে জাল উঠিয়া যাইয়া (শিশু-গণেরই অধিক) হা হয় (হায়োস, ইথোস) ; চর্ম্ম অশুভ, বাহার দরুণ সামান্য আঘাত লাগিলেই আঘাতপ্রাপ্ত স্থানে ক্ষত হয় (বোরাক্, হিপ-সাল্ক, সাইলিনিস, সাল্ক) ; পুরাতন ঘা এবং উহা চট্টে তর্জিক মুক্ত পূর্ব পড়া (কপের-বজ), উহাতে ম্যাস তর্জিক (Proud-Flesh) হয়, উহা চুলকায় এবং কুট্ কুট্ করে (সাইলিনিস) ; চর্ম্ম শুষ্ক এবং সহজে ফাটিয়া যায় ; ঘা শুকাইয়া উঠতে পুরু এবং কঠিন দাগ পাকে : গ্রাহর ক্ষতি এবং কঠিনতা ; বেগল, কুচ্চি, গ্রীবা এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সন্ধি চানড়ার ভাঙে ভাঙে হাল উঠিয়া দণ্ডরায় স্থায় ক্ষত ; চানড়ায় সামান্য আঘাত লাগিলেই ঘা হইয়া উঠতে পূর্ব হয় ।

জ্বর । প্রত্যেকালে বিজানায় শীত বোধ ; সামান্য নড়াচড়াতেই ঘর্ম্ম হয় ; দ্ব্য টক তর্জিক (সাইলিনিস) ।

নিদ্রা । রাত্রিতে মনের অত্যন্ত আন্দোলন এবং ঘুমের ঘোরে ভ্রমাক বস দেখা (আর্) ; দিনের বেলা নিদ্রাবল্য ।

ব্যবহার । চর্ম্মরোগ ; বিসর্প (Erysipelas) ; ক্ষত বা ঘা ; বাধার ক্ষতনা চুলকানি বিশিষ্ট ক্ষুদ্রী ; বিকট (Eczema) ; শরীরের স্থানে

স্থানে চামড়ার ভাজে ভাজে ছাল উঠিয়া যাওয়ার ভয় ক্ষত ; গণ্ডমালা জনিত অশুখ ; চক্ষুপ্রদাহ ; চক্ষুর পাতার ব্রণ (Stye) ; সর্দি ; চুল পড়িয়া যাওয়া ; দন্তশূল ; অজীর্ণ রোগ ; পাকস্থলীতে বেদনা ; শূল-বেদনা ; উদরাময় ; কোষ্ঠবদ্ধ ; ফিতাব ভায় কৃমি (Tape-worm) ; ধ্বজভঙ্গ ; অণ্ডকোষ প্রদাহ এবং প্রতিকোষাধারের শোথ বা ক্ষতি ; রক্তঃরোধ ; প্রথমবার রক্তঃশ্রাব গোণে আরম্ভ হওয়া ; বাধকের বেদনা ; শ্বেতপ্রদর ; স্তনের বোটার বেদনা বা টাটানি ; ত্রিষকোষ প্রদাহ ; ত্রিষকোষের প্রদাহ এবং উহার কঠিনতা ; খিলধরা ; বা শুকাইয়া গেলে ঘায়ের স্থানে কঠিন দাগ থাকা ; গ্রন্থির ক্ষতি এবং কঠিনতা ; মাথায় বা ; অর্শ রোগ বা অর্শ রোগ জনিত অশুখ ; মূত্রমণ্ডলস্থ পক্ষাঘাত ; শিশুগণের গায় স্থানে স্থানে ছাল উঠার ভয় ক্ষত ; হাত, পায়ের আঙ্গুলের নখ দাদ ইত্যাদির দক্ষণ পুরু এবং আবড় খাৰড় হওয়া ইত্যাদি অশুখে গ্রাফাইটিস্ ব্যবহার্য্য ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । যে সকল জীলোকের মোটা হওয়ায় বাতু, তাহাদিগের পক্ষে বিশেষ উপকারী ; সহজে সর্দি লাগার বাতু ; গায় ঠাণ্ডা বাতাস সহ্য হর না ; গোণে রক্তঃশ্রাব হওয়ার বাতু ; সমুদয় শরীরে ছুৰ্কল এবং অবসন্ন বোধ ; চঠাং বলক্ষয় ; সমুদয় শরীরেই রক্তের মদো দন্দদশনি ; বা শুকাইবার পরও ঘায়ের দাগে আলাবুদ্ধ বেদনা এবং উহার কঠিনতা ; রাত্রিতে, প্রাতঃকালে, ঠাণ্ডা লাগিলে, রক্তঃশ্রাবের সময় এবং উহার পর, রক্তঃরোধ হইলে অথবা চলিয়া বেড়াইতে আরম্ভ করার সময় অশুখাদির বৃদ্ধি ; উল্লার উঠিলে এবং বহির্বাযুতে বেড়াইলে অশুখের উপশম ইত্যাদি গ্রাফাইটিসের কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক নির্দিষ্ট লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত ।

সমুত্তণবিশিষ্ট ঔষধ । গ্রাফাইটিসের কার্য্যের সঙ্গে পাল্‌সে-টিল, আসিনিক, আলুমিনা এবং প্লাষ্টানের কার্য্যের অনেক সাদৃশ্য আছে । এতদ্ভিন্ন কোন কোন বিষয়ে ইহার কার্য্যের সঙ্গে ক্যাফেরিয়া কার্কো-নিকা, কার্কো বেজিটেবিলিস্, হিপার সাল্‌ফিউরিস্, ক্যালী ট্রাইক্রমিকাম্, লাইকোপডিয়াম্, মাকিউরিয়াম্, নাইট্রিক্ আসিড্, ফফরাস্, লিগিয়া, সাইলিসিয়া এবং সাল্‌ফারের কার্য্যের সাদৃশ্য আছে ।

প্রতিষেধক ঔষধ । একোনাইট্, আসিনিঙ্ক্, নাক্স্ বমিকা, গ্রাফাইটিসের প্রতিষেধক ঔষধ মধ্যে পরিগণিত ।

ডাইলুশন বিচার । ৬ এবং ১২ ডাইলুশনই সচরাচর অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে । ৩০ ডাইলুশনও ব্যবহৃত হয় । অনেক ঔষিক্ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক এই ঔষধের ১, ২ এবং তৃতীয় ক্রমের শুঁড়া ২১৩ গ্রেইণ মাত্রায় ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল পাইয়া থাকেন । আবার অনেক চিকিৎসককে ২০০ ক্রম ব্যবহার করিয়াও বিশেষ ফল পাইতে দেখা যায় । লেখক এই ঔষধের ৬ষ্ঠ ক্রমের আরোকই সচরাচর অধিক ব্যবহার করিয়া থাকেন । তিনি কখন কখন ১২ ক্রমও ব্যবহার করিয়া থাকেন । চর্ম্ম রোগে তিনি ২য় এবং ৩য় এবং কখন কখন ৬ষ্ঠ দশমিক ক্রমের শুঁড়া, ১ বা ২ গ্রেইণ মাত্রায় ব্যবস্থা করিয়া বিশেষ ফল পাইয়া থাকেন ।

হিপার সাল্ফিউরিস্,—হিপ্-সাল্ফ্

(HEPAR SULPHURIS,—HEP.-SULPH.)

যত পরিমাণ বিষ্ণকের পরিষ্কৃত পোদা, উহাতে তত পরিমাণ গন্ধকের মিহিশুঁড়া মিশ্রিত করিয়া উহা ধাতু দ্রব্য দ্রবকরণোপযোগী একটি মুক্তিকা নির্মিত পাত্রে (Crucible) লইয়া পাত্রটীর মুখ একপ ভাবে বদ্ধ করিবে যেন উহার মধ্যে বাতাস প্রবেশ করিতে না পাবে । তৎপরে এইরূপে মুখবদ্ধ করা পাত্রটি জলন্ত আগুনের উত্তাপে অন্ততঃ ১০ মিনিট কাল রাখিবা, তৎপরে উক্ত পাত্রটি আগুনের উত্তাপ হইতে সরাইয়া রাখিবে । পাত্রটি ভালরূপে ঠাণ্ডা হইলে, উহার গদ্য হইতে উক্ত প্রকারে প্রস্তুত করা পদার্থ বাহির করিয়া একটি কাচের ষ্টপার্ড (Stoppered) বস্তুনি লিখিতে মুখ ভালরূপে বদ্ধ করিয়া রাখিবে । এই প্রকার প্রস্তুত করা পদার্থের নাম হিপার সাল্ফিউরিস্ । এই পদার্থকে হিপার সাল্ফিউরিস্ ক্যালকেরিভাম্ (Hepar Sulphuris Calcareum) বলিয়া থাকে । এই পদার্থে সুগার অব মিক্ মিশাইয়া যথানিয়মে ইহার ৩য় শততমিক বা ৬ষ্ঠ দশমিক ক্রম পর্য্যন্ত শুঁড়া প্রস্তুত হইয়া থাকে । ৩য় শততমিক

বা ৬ষ্ঠ দশমিক ক্রমের গুঁড়া হইতে যথানিয়মে ৪র্থ শততমিক ক্রমের আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে ।

সাধারণ ক্রিয়া । লিম্ফেটিক্ গ্রন্থি (Lymphatic glands), চর্ম, এবং শ্বাস যন্ত্রের শ্লেষ্মিক বিস্তার উপরই এই ঔষধের কার্য্য অধিক প্রবল দেখিতে পাওয়া যায় । ইহা দ্বারা গ্রন্থিগুলি বর্দ্ধিতাবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং উহাতে পূর্ব উৎপন্ন হইয়া থাকে । ইহা চর্মের উপর ক্ষত, বিকচের জ্বায ফুসুড়ী (Eczematous eruptions) উৎপাদন করিয়া চর্ম অসুস্থ করিয়া ফেলে । ইহা শ্বাসযন্ত্রের শ্লেষ্মিক বিস্তারিত অতিরিক্ত পরিমাণে স্লেয়া উৎপাদন করে । এই স্লেয়ার প্রকৃতি প্রায়ই ফুঁড়ীর জ্বায দেখিতে পাওয়া যায় । পূর্ব উৎপাদন করা এই ঔষধের একটি বিশেষ প্রকৃতি বা শক্তি মধ্যে পরিগণিত ।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মন । সহজেই অত্যন্ত চটিয়া যাওয়া বা মনের অতিরিক্ত উত্তেজনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে তাড়াতাড়ি কথা বলা ; স্বরণশক্তির অত্যন্ত হ্রাস বা দুর্বলতা (অনাকার্ড, ক্রিয়াজ, ল্যাক্, নেট্রাম্-মিউর, নাক্স-মক্) ; সন্ধ্যার সময় মনের অত্যন্ত উদ্বেগ ; সর্বদা দুঃখিত ও বিমর্ষভাবে থাকা এবং সহজে কাঁদিয়া ফেলার স্বভাব ।

মস্তক । নিদ্রাবল্য হইয়া চক্ষু বুজিলেই মাথাঘোরা ; মাথায় বাটরা ধরার জ্বায বেদনা বা যাতনা ; নাসিকার ঠিক উপরিভাগে কসিয়া ধরার জ্বায বেদনা বা যাতনা (ইথেস্, ক্যালী-বাই) ; একখানি চৌচ বিধিলে বা কাঁটা স্লামিয়া বাধিলে সেকপ হয়, মস্তিষ্কের এক অর্দ্ধাংশে সেকপ চাপিয়া ধরার জ্বায অনবরত বেদনা ; ত্রণ হইলে সেকপ হয়, কপালে সেকপ কনকনানি ; মাথার পশ্চাৎভাগের বহির্দেশে চাপিয়া ধরার জ্বায বেদনা বাহা ক্রমে ক্রমে ঘাড়, গলায় মদ্য এবং স্বকৃষ্টি পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় ; মাথা এবং গ্রীবাংশে ত্রণ, স্পর্শনে বাহা অত্যন্ত টাটার বা বেদনাবুক্ত হয় ; মাথায় কলতানি বিশিষ্ট ফুসুড়ী বাহা অত্যন্ত টাটায় ; মাথায় অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত কলতানি বিশিষ্ট ফুসুড়ী, প্রাতঃকালে ঘুম হইতে উঠিলে বাহা অত্যন্ত চুল-কায এবং চুলকাইলে আলা করে বা টাটায় (গ্রাফ, মার্ক্, নাইট্রিক্-আস্,

সাল্ফ); মাথার স্থানে স্থানে শুটলীর ছায় ক্ষীতি বাহা স্পর্শনে অত্যন্ত টাটায়; মাথার চুল পড়িয়া যায় (গ্রাফ্, নাইট্রিক্-অ্যাস্, ফস্); গাড়ীতে চাপিয়া বেড়ানোর সময় বা মাথা ঝাকিলে মাথাঘোরা; মাথা ঝাকিলে মাথাধরা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মাথাঘোরা; কপালের ডাইন পার্বে ছিদ্র করার ছায় বেদনা; প্রত্যেক দিন প্রাতঃকালে নাসিকার মূলে ছিদ্র করার ছায় বেদনা বা বাতনা; মাথা বিম্ বিম্ করা।

চক্ষু । চক্ষু এবং চক্ষুর পাতার প্রদাহ বাহা স্পর্শনে টাটায়; চক্ষু দিয়া জল পড়া; উজ্জল আলোকে এবং চক্ষু সঞ্চালনে চক্ষুর কন্কনানি; বালি প্রবেশ করিলে যেরূপ হয়, চক্ষুর মধ্যে সেরূপ চাপাবোধ(আস্, কষ্ট, সাল্ফ); রাত্রিতে চক্ষুর পাতার পাতায় লাগিয়া থাকে(গ্রাফ্, নাইকোপ্, মার্ক্, পাল্ফ); চক্ষে কঠিন শ্লেষ্মার সঞ্চার; প্রাতঃকালে চক্ষু আক্ষেপিক ভাবে বুজিয়া পড়ে(মার্ক্); চক্ষুর বহির্দিকের কোণে জ্বালানু বা চিড়িক মাংস ছায় বেদনা; চক্ষুর গোলকে চাপিয়া ধরার ছায় বেদনা বা বাতনা; মোচড়াইয়া গড়িলে বা খেঁচনিয়া গেলে যেরূপ হয়, চক্ষুর গোলকে সেরূপ বেদনা অনুভূত হয়; চক্ষুর কর্ণিয়াতে (Cornea) ক্ষত হয় এবং দাগ পড়ে (মার্ক্, নাইট্রিক্-অ্যাস্, সাইলিসি); প্রদীপ জ্বালিলে চক্ষে অস্পষ্ট দেখায়; তেলিয়া বসি অবস্থা হইতে টাড়াইবার সময় চক্ষে আঘাত দেয়ায়; চক্ষুর কোটরের উপরিভাগের হাড়ে ছিদ্র করার ছায় বেদনা; বিসর্পের প্রদাহের ছায় চক্ষু প্রদাহ; চক্ষে সমুদয় বস্তুই দাগ দেখায়; বস্তুগুলি স্বাভাবিক অপেক্ষা অনেক বড় দেখায়।

কর্ণ । কর্ণের মধ্যে চুলানি(বারাইটা-কাস্, সাল্ফ, সাইলিসি); কান দিয়া দুর্গন্ধযুক্ত পূর্ব নির্গমন(অরাস্, বোবিষ্টা, গ্রাফ্, মার্ক); কানের উপর এবং পশ্চাত্তাগে মরা চন্দের ছায় উঠা(সোরিনাম্); কানের মধ্যে ফোঁস্ ফোঁস্, শুন্ শুন্ শব্দ এবং উঠাতে দগ্ধপানি ও উহার সঙ্গে সঙ্গে কানে কন শুনা।

নাসিকা । শ্বাসশক্তির অতিরিক্ত চেতনা, বাহার দরুণ সামান্য গন্ধও নাকে লাগে বা সজ্জ হইয়া না (অগারিকাশ, বেল, কফিয়া, কল্চ্, নাইকোপ্, গ্রাফ্); নদি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে নাসিকার প্রদাহযুক্ত ক্ষীতি,

যাহার দ্রবণ ত্রণের ত্রায় বেদনার উদ্রেক হয় (বেল্); নাকদিয়া রক্তসংযুক্ত হর্গন্ধযুক্ত স্লেখা নির্গমন (গ্রাক্, থুজা); স্পর্শনে নাকের হাড় বেদনার উদ্রেক হয় (আলান্, অরাম্, ব্রাই, মার্ক্, নাইট্রিক্-আস্)।

• মুখ মণ্ডল । মুখ মণ্ডল হরিদ্রাবর্ণ (চেলিডন্, সিপিয়া, নেট্রাম্-মিউর); মুখমণ্ডল উষ্ণ এবং লালবর্ণ; গালের বিসর্পের ত্রায় ক্ষতি (বেল্-গ্রাক্, ল্যাক্, রাস্ টাক্স); স্পর্শ করিলে মুখমণ্ডলের হাড় বেদনা (কার্বো-বেজ্, ক্যাল্ট্রি-বাই); ওষ্ঠ, টুটি এবং গ্রীবাতে ত্রণ যাহা স্পর্শ করিলে অত্যন্ত বেদনায়ুক্ত হয় বা টাটায়; উপরের ওষ্ঠের অত্যন্ত ক্ষতি (এপিদ্, বেল্, ক্যাক্ কার্ক্) এবং স্পর্শনে উহাতে অত্যন্ত বেদনা; মুখ মণ্ডলে ফোকার ত্রায় কুকড়ী বিশিষ্ট বিসর্প বা ইবিসিপেলাস্ এবং উহা দ্রবণ আক্রান্ত স্থানে কুটকুটানি; ওষ্ঠের কোণে ক্ষত।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য । হা করিলে বা কোন প্রকার ঠাণ্ডা দ্রব্য খাইলে দন্তশূল; মুখে অত্যন্ত তর্গন্ধ (অর্গিকা, আয়োড্, ক্রিয়াজ্, নাইট্রিক্-আস্, নাক্স-বম্); মুখের মধ্য এবং মাড়িতে ক্ষত (বোরাক্স্, হেলি-বোরাস্, আয়োড্) এবং ঘায়ের চতুর্দিকে চর্ম্মির ত্রায় পদার্থের নকার (মার্ক্); মুখে তিক্ত স্বাদ (আস্, ব্রাই, নাক্স-বম্, পাল্‌স্); গলার মধ্যের পশ্চাত্তাগে তিক্ত বোধ, কিন্তু আহার দ্রব্যে স্বাভাবিক স্বাদই থাকে; মুখগহ্বর এবং মাড়িতে অত্যন্ত বেদনা এবং সামান্য স্পর্শ করিলেই উহা হইতে রক্ত পড়ে; দন্তশূল, উষ্ণ বরে এবং দাঁতে দাঁতে চাপিয়া ধরিলে যাহার বৃদ্ধি হয়। গলার মধ্যের সন্ধোচন এবং উহাতে চাপিয়া ধরান ত্রায় যাতনা অল্প-ভূত হয়; গলার মধ্যে চাঁচিয়া ফেলাব ত্রায় অলাভব; গলার মধ্য পূর্বাধিকানের ত্রায় যাতনা অল্পভূত হয় বাহ্য করণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় (বেল্, ক্যাল্ট্রি-বাই) এবং যাহা গিলিবার সময় অধিক হয় (ব্রাই); মাছের কাঁটা বিপরীত থাকিলে যেক্রপ হয়, গলার মধ্যে যেক্রপ যাতনা অল্পভূত হয় (ক্যাল্ট্রি-কার্ক্), অথবা কাঠের চোড় লাগিয়া থাকিলে যেক্রপ হয়, গিলিবার সময় গলার মধ্য যেক্রপ অল্পভূত হয় (আলান্, আর্জেন্ট্-নাইট্রি, নাইট্রিক্-আস্); গলার মধ্য ডেলার ত্রায় কোন পদার্থ লাগিয়া রহিয়াছে অথবা গলার মধ্য ফুলিয়াছে, গিলিবার সময় এক্রপ অল্পভূত হয় (ব্যায়াইটা-কার্ক্,

ক্যালো-বাই) ; টন্সিল্ প্রদাহ (Tonsillitis) এবং উহাতে পুঁথ হওয়ার উপক্রম হওয়া।

পাকস্থলী এবং উদর। বিনিগার (Vinegar) খাওয়ার অত্যন্ত ইচ্ছা (আবিস্-কান্, সিপিয়া); টক এবং ঝাল স্বাদ বিশিষ্ট দ্রব্য খাওয়ার ইচ্ছা (একন্, আন্টি-টার্ট, চায়না, কস্, বিরেট্-আব্); আহাবে, বিশেষতঃ চর্শি-যুক্ত দ্রব্যে অকচি (পাল্‌ম্); আহারের পর উদগার উঠা; তুলিয়া পড়িলে ঘেরূপ হয়, চলিবার সময় পাকস্থলীতে সেকূপ বেদনা বা ব্যতনা; প্রত্যেক দিন প্রাতঃকালে বমন; পাকস্থলী কাঁপে, যাহার দরুণ উপশম পাওয়ার আশায় রোগী কোনবের কাপড় তন্নতলে কবিতা দিতে বাধ্য হয় (ল্যাক্, লাইকোপ্); অঙ্গল হইলে সেকূপ হয়, পাকস্থলীতে সেকূপ চর্শগবৎ বেদনা এবং গলা দিয়া অঙ্গল উঠা; সামান্য পনিমাণ আহাব দ্রব্য উদগত হইলেই পাকস্থলীতে চাপা বোধ; পূর্দাক্ষে অত্যন্ত ক্ষণা বোধ (সাব্‌ক্); পাকস্থলীতে জ্বালাহুভব। উদবে, নাভিৰ চতুঃপাশ্ববতী স্থানে, অক্‌ড্রিয়া ধবার হ্রাস বা সংজ্ঞাচক বেদনা, থাকিয়া থাকিয়া গ্রাহ্য উদ্ভূত হয় (কলোন্) এবং উহান সঙ্গে সঙ্গে বমনোদগে এবং গালে উদ্ভূত হুভব; উদব ক্ষীণ এবং বিস্তৃত হয় (আন্টি-ফুড্, চায়না, কান্); উদরে গড়্ গড়্, কল্ কল্ শব্দ হয় (আগাবিকাশ্, আলোজ্, লাইকোপ্, মাল্‌ক্); চলিবার সময়, কাশিবার সময়, নিশ্বাস প্রশ্বাসে এবং স্পর্শ কারলে যকৃত প্রদেশে হৃদী-বিধানের হ্রাস বেদনা বা ব্যতনা; কৃচ্‌কির এগ্রির ক্ষীণি (বাগী) এবং উহাতে পুঁথ হওয়া।

মল এবং মল দ্বার। মল কঠিন নহে বটে, কিন্তু উচ্চ অতি কষ্টে গুহ্য দ্বারে দিয়া নির্গত হয় (কার্কো-বেল্, চায়না); টক গন্ধযুক্ত মলভাগ (পডোন্, কন্); সবুজ বা কাদার দণ্ড বিশিষ্ট মলভাগ (বেল্, ক্যাক্-কার্ক্, পডোন্, মিরিকা); গুহ্য দ্বারে অর্শের বসা; গুহ্যে জ্বালাহুভব।

মূত্র গত। মূত্রনাগার মূত্র লালবর্ণ এবং প্রদাহযুক্ত (ক্যানাবিস্-সার্ট্); মূত্রাধারের দুর্গন্ধতা; অসাড় বা অনিচ্ছাপূৰ্ব্বক মূত্র নির্গমন (কষ্ট্, সিপিয়া); মূত্রভাগে বায়বাত জন্মে, যাহার দরুণ মূত্রভাগের সমস্ত রোগী কতকক্ষণ বসিয়া থাকিতে বাধ্য হয় (থাকিয়া থাকিয়া মূত্র নির্গত হয়,-

কোনায়াম্, ক্রিমेटিস্); মূত্র ত্যাগের সময় মূত্রাধারে সঞ্চিত সমুদয় মূত্র একবারে নির্গত হয় না; মূত্র একদ্বারে নির্গত না হইয়া কেঁটায় কেঁটায় নির্গত হয়; মূত্র কালচে লালবর্ণ, দুধের স্থায়, রক্ত মিশ্রিত, উগ্র জ্বালা উৎপাদক এবং ক্ষতকারক, যাহার দরুণ পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগের আবরক চৰ্ম্মে (Prepuce) ক্ষত হয়; মূত্র ফিকা এবং পরিস্কার; কোন পাত্রে ধরিয়া রাখিলে মূত্র গাঢ় এবং ঘোলাটিয়া হয় এবং উহার নীচে সাদা তলানি পড়ে (ক্যাক্স-কার্কি, কল্‌চ, আক্); মূত্রকোষে ক্ষত; মূত্রনালী দিয়া পুঁয়ের স্থায় শ্লেষ্মা নির্গমন এবং মূত্র ত্যাগের সময় মূত্রনালীতে জ্বালাত্বব।

জননেন্দ্রিয়। পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগের আবরক চৰ্ম্মে গরমীর ঘাঘের স্থায় বা (মাক্, নাইট্রিক্-অস্, ফাইটোল্); পুরুষাঙ্গ, অণুবোধ্যাধার এবং উরুর চৰ্ম্মের ভাঙ্গে ভাঙ্গে ছান উঠিয়া যাওয়ার স্থায় কল্‌তানি বিশিষ্ট ক্ষত (গ্রাফ্, রাস্টঙ্ক্), মূত্র বা কঠিন মলত্যাগের পর ধাতু নিঃসরণ। জরায়ু এবং স্তনে জ্বালাত্ব ও হল ফুটানের স্থায় বেদনা বা বাতনা সহ দুর্গন্ধযুক্ত ক্ষত; নিয়মিত সময়ের অনেক পর এবং অল্প পরিমাণে রজঃস্রাবের মধ্যবর্তী সময়ে জরায়ু হইতে রক্তস্রাব।

শ্বাস যন্ত্র। শ্বাস কঠি; কঠনালী এবং বৃক্কের দুর্বলতা। যাহার দরুণ রোগী উচ্চৈঃস্বরে কথা বলিতে পারে না (পাল্‌স্, স্পঞ্জ, ষ্টানাম্); শ্বরতঙ্গ বিশিষ্ট শুক কাশি (বেল্, নাক্স-বম্); কর্কশ এবং খেউ খেউ শব্দ বিশিষ্ট গভীর কাশি (স্পঞ্জ); গায়ের কাপড় ফেলিলে বা শরীরের কোন অংশে ঠাণ্ডা লাগিলে কাশির উদ্রেক হয় (বাস্টঙ্ক্); ঠাণ্ডা আহাব বা পানীয় দ্রব্য খাইলে কাশির উদ্রেক; শ্বাস প্রশ্বাসে আঁটা বোধের দরুণ কাশির উদ্রেক; গলার মধ্যে হুড়হুড়ীর দরুণ কাশি (ফস্, কমেস্, সান্সুনেরিয়া, সিপিয়া); ঠাণ্ডা বাতাস লাগিলে, ঝালিলে বা কথা বলিলে কাশির উদ্রেক (চায়না, নাক্স-বম্, ফস্); কাশিতে কাশিতে বমন (আন্টি-টার্ট্, ইপি-কাক্); সন্ধ্যার সময় থাকিয়া থাকিয়া কাশির আক্রমণ; ঘুড়ী এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে ঘড়্, ঘড়্, সাঁই সাঁই শব্দ বিশিষ্ট কর্কশ কাশি; শুষ্ক ঠাণ্ডা বাতাস লাগিয়া ঘুড়ী (একন্, স্পঞ্জ) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কঠনালীর নিম্নভাগের ক্ষতি, ঠাণ্ডা বাতাস বা জল লাগিলে ঘাঘা অত্যন্ত টাটায় বা বেদনায়ুক্ত

হয়; বৃকের মধ্যে অত্যন্ত চট্‌চটয়া আঠা শ্লেষ্মার সঞ্চার, বৃকের মধ্যে টাটানি; বৃক অত্যন্ত দুর্বল, বাহ্যার দক্ষণ রোগী কথা বলিতে পারে না; ঘুঙী; ঘড়, ঘড় শব্দ বিশিষ্ট কাশি বাহ্যার দক্ষণ রোগী বারম্বার কাঁপড় হওয়ার উপক্রম হয় এবং যাহা হইতে অব্যাহতি পাওয়ার আশায় রোগী শয়নাবস্থা হইতে উঠিয়া মাথা বা ঘাড় পশ্চাৎ দিকে বাঁকা করে; নিশ্বাস প্রশ্বাস কষ্টকর এবং সাঁই সাঁই শব্দ বিশিষ্ট। অসম্পন্ন।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, হাত, পা ইত্যাদি। সমুদয় অঙ্গে কঁসিয়া ধরার জ্বায় বেদনা বা বাতনা। বোগলের গ্রন্থির ক্ষীতি এবং উহাতে পুঁথ হওয়া (সাইলিসি); থেংলিয়া গেলে সেকপ হয়, বাহ্যর হাড়ে সেকপ বেদনা; হাতের চর্ম ফাটাবৃত্ত, খস্‌খসে এন্ড শুক (আন্. গ্রাফ); আঙ্গুল হারার (Whitlow) প্রণয়নাবস্থায় আঙ্গুলে সেকপ দপ্‌ দপ্‌ করে বা চিড়িক মারে, আঙ্গুলে সেকপ বাতনা; চলিবাব সময় কুচকি বা উকর সন্ধিতে গোচড়াইয়া পড়'ব জ্বায় বেদনা বা টাটানি (আশিকা); উকু এবং হাটুতে গোচড়াইয়া পড়ার জ্বায় বেদনা; হাঁটু, পায়ের পাতাব সন্ধি এবং পায়ের পাতা ফাট (আন্, এপিদ্, ডিজিট); পায়ের পাতা ফাটাবৃত্ত; পায়ের রক্তাঙ্গুণীতে চিড়িক মারা; কুচকিব সন্ধিতে বেদনা এবং উহাতে পুঁথ উৎপন্ন হওয়ার উপক্রম হওয়া।

চর্ম। চর্ম অল্পত, এমন কি, সামান্য আঘাত লাগিলেও আঘাত প্রাপ্ত স্থান পাকিয়া উহাতে পুঁথ উৎপন্ন হয় (বোরাক্স, ক্যান্, গ্রাফ, সাইলিসি); গায় কুঙ্গুড়ী বাহির হয় যাহা চাপিলে অত্যন্ত বেদনাবৃত্ত হয় এবং টাটায়; বিকচ (Eczema) যাহা নতুন নতুন ভগ্নের আকারে শরীরের স্থানে স্থানে বিস্তৃত হয়; সামান্য আঘাত লাগিলেই দ্রুত অত্যন্ত বেদনাবৃত্ত হয় এবং টাটার ও উহা হইতে সহজে রক্তপড়ে (অসাকিটিডা, মার্, মাল্); কতের প্রান্ত বা ধার আঘাতবৃত্ত হয় এবং উহাতে ছল ফুটানের জ্বায় বাতনা অধিকৃত হয়; কত হইতে কতকারক, পচা চর্মকৃত্ত কেন নিঃসরণ; প্রধান কতের চর্মদিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভগ্নের জ্বায় কুঙ্গুড়ী প্রকাশ পায়; চর্ম হারিজাবর্ণ (কামল রোগের জ্বায়) এবং নূর লাল বর্ণ।

নিদ্রা। শেষবেলা বা সন্ধ্যার সময় অত্যন্ত নিদ্রাবল্য; রাজি ছই

প্রহরের পর না না প্রকারের অতিরিক্ত চিন্তার দরুণ ঘুম হয় না; স্বপ্নে আশ্রয় দেখিয়া মনের অত্যন্ত উদ্বেগ বা চট্‌কটানি ।

জ্বর । বাহির্বাযুতে শীতবোধ; রাত্রিতে জ্বরের শীতলাবস্থায় যন্ত্রণা-দির বৃদ্ধি; সন্দিগ্ধ অবস্থায় জ্বর; সহজেই, এমন কি সামান্য নড়াচড়াতেও, ঘর্ম্ম হয় (ক্যাক্কু-কার্ক, ফস্, সাইলিসি, সিপিয়া); প্রচুব পরিমাণে টক দুর্গন্ধযুক্ত ঘর্ম্ম (আগিকা, আস্, কার্কো-আনিমেল্, সাইলিসি); রাত্রিতে ঘর্ম্ম (কার্ক-কার্ক, চায়না, ফস, ফস্-আন্, সাইলিসি); শরীর হইতে অনবরত দুর্গন্ধ বাহির হওয়া; পর্য্যায়ক্রমে শীত এবং উষ্ণাত্ত্ব এবং উষ্ণার সঙ্গে সঙ্গে আলোক দর্শনে অনিচ্ছা; সবিরাম-জ্বর; প্রথমতঃ রাত্রি ৮টার সময় শীত, তৎপরে মপাসা এবং উষ্ণার প্রায় এক ঘণ্টা পর জ্বর হয় ও তদ্রূপ ঘুমের ব্যাঘাত জর্জরিত শীতলাবস্থায় এবং উষ্ণার পূর্বে গায় চুলকানি বিশিষ্ট আমবাত বাহির হয়, পাঠাণ্ডা চট্‌চটিয়া আঠা দুর্গন্ধযুক্ত ঘর্ম্ম ।

ব্যবহার । পারার অপব্যবহার জনিত অসুখ; গ্রন্থির প্রদাহ এবং পাকিয়া উঠাতে পুঁথ হওয়া; রণ; ক্ষত; কোড়া এবং সকল প্রকারের পুঁথ সম্বলিত অসুখ; বিকচ (Eczema); শুকনা খোস; চর্ম্মের অসুস্থাবস্থা; মাথায় শুকনা কুসুড়ী; গায় কল্‌তানি বিশিষ্ট কুসুড়ী; বিসর্প বা টর্নিসিপেলাস্; শরীরের স্থানে স্থানে ছাল উঠিয়া যাওয়ার দরুণ ক্ষত; সন্ধিজনিত অসুখ; চক্ষু প্রদাহ; দৃষ্টিশক্তি হ্রাস; বায়ুনল প্রদাহ; কণ্ঠনালী প্রদাহ; টনসিলি প্রদাহ (Tonsillitis), উদরাময়; স্বপ্নে প্রস্রাব করা; আমাশয়; অজীর্ণ রোগ; গরমীর ব্যারাম জনিত পরবর্তী পীড়া (Secondary-Syphilis); পুরাতন আকাবের প্রমেহ বোগ (Gleet); গরমীর ব্যারাম বা পারার অপব্যবহার জনিত গায় চক্রাকাবেব পুঁথ বা কল্‌তানি সম্বলিত কুসুড়ী; মাথায় ঘা; কান দিয়া পুঁথ পড়া; কর্ণিয়াতে (Cornea) ক্ষত; গুণমালা জনিত বাগী; নাক ও কান দিয়া গাঢ় পুঁথ পড়া ইত্যাদি অসুখে হিপার সাল্ফিউরিস্ ব্যবহার্য্য ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । যে সকল বোগে আক্রান্ত স্থানে পুঁথ হইবেই হইবে তাহাতে উপকারী; দিবা রাত্রি অবিশ্রান্ত ঘর্ম্ম, বাহার দরুণ অসুখের কোনও উপশম হয় না; রোগী গায়ের কাপড় ফেলিতে

চাহে না এবং সর্বদা গরম কাপড় পরিয়া থাকিতে চাহে ; সামান্য বেদনা
ঘটনাতেই মুচ্ছা হয় ; বহির্বাযু সহ হয় না ; অস্থি পোকায ধরা (Caries) ;
রাত্রিতে, প্রাতঃকালে, ঠাণ্ডাবাতাসে, আক্রান্ত অঙ্গ স্পর্শ করিলে, ঘুমের
অবস্থায়, গিলিবার সময়, আক্রান্ত পার্শ্ব শয়ন করিলে অশ্রুধের বৃদ্ধি, এবং
উষ্ণ প্রয়োগ বা গরম কাপড়াদি দিয়া শরীর ঢাকিয়া রাখিলে অশ্রুধের উপশম
ইত্যাদি হিপার সাল্‌ফিউরিসের কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ। হিপার সাল্‌ফিউরিসেব সঙ্গে সাল্‌ফার,
ক্যাকেরিয়া, মার্কিউরিয়াস্, ক্যানী-বাইক্রমিকামের কার্যের অনেক
সাদৃশ্য আছে।

প্রতিষেধক ঔষধ। বিনিগার (Vin^{ig}ar), বেলোডোন, ক্যামো-
মিল, সাইলিসিয়া, হিপার সাল্‌ফিউরিসের প্রতিষেধক ঔষধ।

ডাইলুশন বিচার। ৬. ১২ এবং ৩ ডাইলুশনই সচরাচর ব্যবহৃত
হইয়া থাকে। কোন কোন চিকিৎসক ১০০ এবং ২০০ ডাইলুশনও ব্যবহার
করিয়া থাকেন। ডাক্তার হিউজের নতে ১ম, ২য়, ৩য় দশমিক ক্রমের
গুঁড়া বিশেষ উপকারী। ৬ষ্ঠ ডাইলুশনই লেখক সচরাচর অধিক ব্যবহার
করিয়া থাকেন। কোড়ানি পাকাইবার জন্য এই ঔষধের ২য় এবং ৩য়
দশমিক ক্রমের গুঁড়া, ১ গ্রেইণ্‌ নাত্রায় ব্যবহার করিয়া অনেক সময়
আশাতিরিক্ত ফল পাওয়া যায়।

ইগ্নেসিয়া আমারা,—ইগ্নেস্।

(IGNATIA AMARA,—IGNAT.)

ইষ্ট্‌ টিওন্স এবং ফিলিপাইন্‌ দ্বীপ সমূহে এই গাছ জন্মে। ইহাতে
ষ্ট্রিকনিয়ার অংশ থাকার দরুন ইহাকে ষ্ট্রিক্‌নাস্‌ ইগ্নেসিয়াও বলিয়া
থাকে। নাক্সমিক্স এবং ইগ্নেসিয়া এক জাতীয় গাছ। কিন্তু নাক্স-
মিক্সে, ইগ্নেসিয়া অপেক্ষা ষ্ট্রিকনিয়া নামক সারের অংশ কম আছে।
অতএব রোগ চিকিৎসায় উক্ত উভয় ঔষধের কার্যের তারতম্য আছে।
ইগ্নেসিয়ার সিমের ভ্রায় ফলের বিচি দিয়া যথা নিয়মে ২০° ডিগ্রী ওবার প্রকৃ-

স্পিরিটে ইহার মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে । অধ্যাপক বোর্ণের মতে এই ঔষধের গুঁড়া, আরোক অপেক্ষা অধিক উপকারী ।

সাধারণ ক্রিয়া । মস্তিষ্কের গ্রীবার নিকটস্থ মেডালা অবল্‌স্কেটা নীমক অংশ এবং কসের্কা সঞ্চায় স্নায়বিক মণ্ডলীর উপর ইহার কার্যকর অত্যন্ত প্রবল । স্নায়ু শরীরে উদরস্থ হইলে ইহা প্রথমতঃ ধনুষ্কাকারের গ্রাম আক্ষেপ বা খেঁচনি ও স্থান কষ্ট উৎপাদন করে এবং তদ্বর্ণ রোগীর মৃত্যুও হইতে পারে । তৎপর সমুদয় স্নায়বিক মণ্ডলা বিকৃতরূপে উত্তেজিত হইয়া থাকে, বাহ্যর দক্ষণ জ্ঞানোৎপাদক স্নায়ু (Sensory nerves) এবং বিশেষ বিশেষ ইন্দ্রিয়ের অতিরিক্ত চেতনা দেখিতে পাওয়া যায়, বাহ্যর দক্ষণ বাহ্যিক বিষয়ে রোগীর শারীরিক এবং মানসিক জ্ঞানের অতিরিক্ত চেতনা এবং উত্তেজনা দেখিতে পাওয়া যায় । অতএব কাষের সামঞ্জস্যের ক্ষমতা বিকৃত হয় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে শরীরের নানা স্থানের স্পন্দন এবং আক্ষেপ, অথবা উহার সঙ্গে সঙ্গে পর্যায়ক্রমে উক্ত স্নায়বিক মণ্ডলের জড়তা এবং অবসন্নতাও দেখিতে পাওয়া যায় । সমুদয় বিষয়েই সহজে উত্তেজিত হওয়ার স্বভাব এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে চাপ, গুপ্ত বা অপ্রকাশ্য শোকের ভাব এবং অনবরত কাল্পনিক যন্ত্রণাদির বিষয়ে চিন্তা উৎপাদন করা ইম্পেসিয়ার বিশেষ প্রকৃতি বা শক্তি মধ্যে পরিগণিত । .

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মন । নিজ্জনে থাকার ইচ্ছা (কার্কো-আনিমেল্, হায়োস্, রাস্-টঙ্ক্); মনের অবস্থা সকল সময় এক রকম থাকে না; অর্থাৎ এখন ঠাট্টা চাতুরী এবং হাসি, আবার উহার পরক্ষণই বিষমভাব ও ক্রন্দন (একন্, অরাম্, নাক্স-মফ্, ফস্); অত্যন্ত গুরুতর দুঃখ করিলে ঘেরূপ হয়, মনে সেরূপ ভাব বা চিন্তা (ককিউল্যাস্, বিরেট্-মাদ্); সহজে উত্তেজিত হওয়ার স্বভাব; কোন গহিত কায্য না করিলেও মনে হয় যেন অত্যন্ত গহিত কায্য করা হইয়াছে (দাট্‌গিন্দি), সামান্য দোষারোপ বা প্রতিবাদ করিলেই উত্তেজিত এবং রাগান্বিত হওয়া (অরাম্, ব্রাই, ফেরাম্, নাক্স-বম্); সর্বদা ভয়ানক এবং ভীত (একন্, অরাম্, বেল্, চায়না, ফস্); অস্থি

স্বভাব, অধৈর্য্য এবং অস্থির প্রতিজ্ঞা (ব্যারাইটা-কার্ক); সর্বদা নিস্তব্ধ এবং ছুঃখিত বা বিমর্ষভাবে থাকা (নাক্স-বন্ড, পাল্‌স); রাগ এবং তৎপর ছুঃখিত হইয়া নিস্তব্ধ ভাব : মন গুপ্ত বা অপ্রকাশ্য শোক পূর্ণ (সিমিসিক), যাহার দরুণ মনে হয় যেন উহা হইতে আর অব্যাহতি নাই ; সৰ্বদা লালনিক বস্ত্রণ। বিষয়ে চিন্তা (নেজা) ; যাহাকে বা যে দ্রব্য অত্যন্ত ভাল বাসে যার, তাহার অভাবে অত্যন্ত শোক ; সমুদয় বিষয়েই বৈরাগ্য বা অনন্যোগ ; কথা বলিতে অনিচ্ছা ।

মস্তক । মস্তিষ্কের উপরিভাগ কোন প্রকারের কঠিন পদার্থ দিয়া চাপিলে যেদ্রুপ হয়, মাথার সেকপ বেদনা বা যাতনা ; মারিলে বা মোচড়াইয়া পড়িলে দ্রুপ হয়, প্রাতঃকালে ঘুম ভাঙ্গিলেই মাথার সেকপ বেদনা (নাক্স-বন্ড) এবং বিছানা হইতে উঠিলেই দাঁতে চূর্ণ করাব জ্বালা বেদনা এবং তৎপর ব্যাধি বেদনা ; বেদনাদিগ বিবন ভাবিলেই বেদনার বৃদ্ধি (ক্যাম) ; ছিঁড়িলে উঠিতে মাথার ব্যাকনিব জ্বালা বেদনা, চক্ষু মেলিয়া উপর দিকে তাকাইলে যাহার বৃদ্ধি হয় ; কপালের ভাইন অন্ধাংশে চাপিয়া ধরার জ্বালা বেদনা যাহা চক্ষু পশ্চাত্ত অক্রমণ করে ; কপাল এবং নাসিকার মূলে চাপিয়া ধরার জ্বালা বেদনা (ক্যামো-বাট, ডিপ্-সাল্‌ক্) যাহার দরুণ রোগী তাহার মাথা সমুখ পানে বাকানো করিয়া থাকিতে পারে না ; মাথা বেদনার পর বমন ; এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্ব পশ্চাত্ত মাথার নড়া দিয়া যেন একটা কাটা মারিয়া রাখিয়াছে মাথার একপ অমুভূত হয় (আগারিকাল্, অনা-কার্ক, আর্স, কলম্বা) অক্রান্ত পার্শ্বে চাপিয়া শয়ন কাবলে যাহার উপশম হয় ; কাশি, তানাক বা মদ খাইয়া শরপীড়া প্রাতঃকালে, চক্ষু সূরাইলে, মাথা হেট করিয়া উপড় হইলে এবং গেলমাগলে যাহার ব্যাক হয়, এবং শয়ন বা বসার ভাব পরিবর্তন করিলে বা অক্রান্ত পার্শ্বে চাপিয়া শয়ন করিলে যাহার উপশম হয় ; মাথার মধ্যে যেন গঠ হইয়াছে একপ অমুভূত হয় ; মাথার ভারিবেদ ; কপালে ছিঁড়িয়া ফেলার জ্বালা বেদনা, চিত হইয়া শয়ন করিলে যাহার উপশম হয় ; মাথার পশ্চাত্তভাগে দপ্পদিয়া বেদনা, ভামাক থাইলে বা তানাকের গন্ধ সোঁকিলে যাহার বৃদ্ধি হয় ।

চক্ষু । চক্ষু অগোচক লাগে বা সহ হয় না (একন্, বেগ, মার্ক,

সাল্‌ফ্‌); চক্ষুর সম্মুখে যেন একবার্কা রেখার তায় ধড়্‌ফড়্‌ করে (সাই-ক্রেমেন, লাইকোপ্‌); বালির কণা লাগিয়া থাকিলে যেরূপ হয়, চক্ষের মধ্যে সেরূপ চাপা বোধ (আস্‌, কষ্ট্‌, ফাইটোল্‌, সাল্‌ফ্‌); চক্ষে জালাল্লভব এবং চক্ষু দিয়া ফল পড়া (আস্‌, ইউফ্রেস্‌); চক্ষু এবং চক্ষুর পাতার আক্ষেপিক স্পন্দন বা সঞ্চালন (আগারিকাশ্‌)।

কর্ণ । কান চুলকায় ।

মূৰ্খ মণ্ডল । মুখ মণ্ডলের পেশীর আক্ষেপিক স্পন্দন (আগারিকাশ্‌, আন্টি-টার্ট্‌, সিকুটা, ষ্ট্রামিন্‌); ওষ্ঠ শুষ্ক, কাটায়ুক্ত এবং উহা হইতে সহজে বক্ত পড়ে; ঘা হইলে যেরূপ হয়, নিম্ন ওষ্ঠের মধ্যাংশে সেরূপ বেদনা বা যাতনা।

মুখগহ্বর ও গলার মধ্য । ওষ্ঠের কোণের স্পন্দন (ওপিয়াম্‌); আক্ষেপের দরুণ মাড়িতে মাড়িতে লাগিয়া আঁটিয়া থাকে (সিকুটা হায়োস্‌, লবৌস্‌, নাক্স-বম্‌); মুখে টক স্বাদ বিশিষ্ট লাল উঠে; চিবাইবার সময় বা কণা বলিবাব সময় গালের মধ্যে সহজে কানড় পড়ে (নাইট্রিক্‌-আস্‌); মুখে টক স্বাদ (ক্যাক্‌-কার্‌, চারনা, নাইট্রিক্‌-আস্‌, নাক্স-বম্‌, সিপিয়াম্‌); দাঁতের সম্মুখ ভাগে ছিদ্র করায় জ্বাল বেদনা, কাফি বা তামাক খাইলে যাতার বৃদ্ধি হয়; ভাস্কিবা যথু যথু হইলে সেরূপ হয়, দাঁতে সেরূপ বেদনা বা যাতনা; মুখে ফেলা উঠে। গলাব মধ্যে ডেলার জায় কোন পদার্থ লাগিয়া রহিয়াছে সন্দেহ একরূপ অল্পভূত হয়, গিলিবার সময় বাহা অল্পভূত হয় না; গলার মধ্যে স্থচী বিধানের জায় বেদনা যথা কণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় এবং যাহা গিলিবার আভ্যন্তরিক কালেই কেবল অল্পভূত হয়; গিলিবার সময় উক্ত বেদনা অল্পভূত হয় না বা কম অল্পভূত হয়; কোন প্রকারের কঠিন দ্রব্যাদি গিলিবার সময় উক্ত বেদনাদির উপশম হয়; হস্তাহির নিম্নস্থিত গ্রন্থিতে বেদনা।

পাকস্থলী এবং উদর । তামাকু, গবম আহার জ্বা, হৃৎ এবং মংশ্রে অকচি; উদ্যারে গলা দিয়া তিক্ত স্বাদ বিশিষ্ট জল উঠে; হিকা; আহারের পর হিকা (ব্রাই, হায়োস্‌); জলাদি পানের পর হিকা; তামাকু খাওয়ার পর হিকা; পেটে খালি বোধ (সিমিসিফ্‌, হাইড্রাষ্ট্‌, পিট্রোল্‌)

সিপিয়া, মাল্ফ); পাকস্থলী দুর্বল এবং পড়িয়া যাওয়া বা নেতার জ্বর বলিয়া অনুভূত হয় (পেটে পিঠে যেন লাগিয়া যায়) (হাইড্রাট্রি, সিপিয়া); পাকস্থলীর মধ্যে এবং প্রাণীর স্থানে চাপা বোধ । নানি প্রদেশে কসিয়া ধরার জ্বর বা চিন্টিনে বেদনা; উদরের দুই পার্শ্বে পূর্ণ এবং কসিয়া ধরার জ্বর বাতনা; উদরের মধ্যে দপ্‌দপানি; উদরে গড়্‌গড়্‌, কল্‌কল শব্দ হয়; শূল বেদনা, বাহার দরুণ প্রথমতঃ পেট কামড়ায় এবং তৎপর উদরের পার্শ্বে স্থচী বিধানেন জ্বর বাতনা অনুভূত হয় ।

মল এবং মলদ্বার । মল ত্যাগের সময় সামান্য বেগ দিলেই শুষ্ক দ্বার বাহির হইয়া পড়ে (পডোক্); অন্ধ অশ রোগে (Blind-Piles) যেক্রপ হয়, শুষ্ক সেক্রপ সঙ্কেতক বেদনা বা টাটানি; মলত্যাগের ২।১ ঘণ্টা পর এইরূপ বেদনা হয়; শুষ্ক দ্বার হইতে শুষ্ক উপরভাগ পদাশ্রয় স্থানবিধানেন জ্বর বেদনা বা বাতনা; স্রবৎ ক্রমি থাকিলে যেক্রপ হয়, শুষ্ক দ্বারে যেক্রপ চুকাণি বা কোন প্রাণী হামা দিয়া যাওয়ায় জ্বর শুষ্কস্থলী; শুষ্ক চাপিয়া ধরার জ্বর অতি প্রবল বেদনা; মলত্যাগের পর শুষ্ক দ্বারে সঙ্কেতক বেদনা এবং টাটানি (নেট্রাম্‌নিউব); বারম্বার বাহ্যের বেগ, কিন্তু বেগ দিলে মল নির্গত হয় না; মল নোটা এবং লম্বা নরম নেড হওয়া সত্ত্বেও উহা অতি কষ্টে নির্গত হয় (ক্যাক্সো-বেজ্, চায়না); মলত্যাগের সময় এবং উহার পর শুষ্কদ্বার দিয়া বক্র পড়া; অশ বেগ, এবং প্রত্যেক দ্বার মলত্যাগের সময় বলীগুলি বাহির হইয়া পড়ে; বলাগুলি বেদনাগুক্ত হয় বা টাটায় এবং উহাতে ছাল উঠিয়া যাওয়ার জ্বর অনুভূত হয়; মল তরল হইলেই বক্র পড়ে এবং জলো ময়ুগা ব্যক্তি হয় ।

মূত্র বস্তু । বারম্বার প্রচুর পরিমাণে জলবৎ মূত্র নিগমন (কন্‌-আস) ।

জনিমেন্সিয়া । মলত্যাগের সময় পুরুবাস্ত্র খাড়া হয়; পুরুবাস্ত্রে ক্ষত হওয়ার জ্বর বেদনা বা টাটানি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পুরুবাস্ত্রের অগ্র ভাগের আবরক চন্দ্রের ধারে চুলীকানি; স্রাববাসের উচ্চা একবারেই থাকে না । নিদ্রিত সময়ের অনেক পূর্বে অথ পবিনানে, কাল্‌চ, দুর্গন্ধযুক্ত, পুণ্ড্রা থানা রক্তস্রাব (আমন্‌কাম্, ক্রোকাশ্, বাইক্রমেন, গাটিনা), রক্ত-

প্রাণের সময় অলসবোধ, অনেক সময় মূর্ছার ভাব এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পাকস্থলী ও উদরে আক্ষেপিক বেদনা; জরায়ুতে খিল ধরা বা উহাতে কর্তনবৎ বা স্থচী বিধানের স্থায় বেদনা; জরায়ুতে প্রসববেদনার স্থায় বেদনা এবং তৎপর পুঁথি মিশ্রিত ক্ষতকারক স্বেত প্রদর নিঃসরণ।

শ্বাস যন্ত্র । কণ্ঠনালী এবং বায়ুনের মধ্যে সঙ্কোচনের স্থায় অল্পভূত হয় (আর্স্, ইপিলাক্); ঘূমেরঘোরে নাক ডাকে বা বুকের মধ্যে গোঁ গোঁ শব্দ হয়; দীর্ঘ নিশ্বাস টানিবার চেষ্টা (ল্যাক্); বারম্বার দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ (কাক্-ফ্, সিকল্); শুষ্ক আক্ষেপিক কাশি (ড্রিসিরা, হারোস্); গভীর আক্ষেপিক কাশি, প্রধানতঃ সন্ধ্যার সময়, গলকের ধূম প্রবেশ করিলে বেক্রপ হয়, গলার মধ্যে সেকপ অল্পভূত হইবা বাহার উদ্রেক হয় (আর্স্, চায়না, লাইকোপ্); অথবা গলার মধ্যে ধূম প্রবেশ করিয়া কাশির উদ্রেক; যত অধিক কাল কাশি হয়, কাশির উত্তরনা তত অধিক বৃদ্ধি হয়; চলিতে চলিতে যত বর্ষাধিকারতাবে খাড়া হওয়া যায়, তত বারই কাশির উদ্রেক হয়; প্রত্যেকবার কাশির আক্রমণের পর নিদ্রাবল্যা (আন্টি-ক্লুড্); বুকের আক্ষেপিক সঙ্কোচন (অস্‌ফিটিডা, লবোস্); হৃৎস্পন্দন এবং হৃৎপ্রদেশে স্থচী বিধানের স্থায় যাতনা (একন্, আর্স্, অস্‌ফিটিডা)।

ঘাড় এবং পৃষ্ঠদেশ । খাড় শক্ত হয় বা উহা নোরান যায় না (ক্যালী-কাক্, ল্যাক্, রাস্‌টক্); গুলি দ্বারের ঠিক উপরি ভাগে বেদনা (চীত হইয়া শয়ন করিলেও); প্রাতঃকালে উক্ত স্থানে বেদনা।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, হাত পা, ইত্যাদি । ঘুম আইসা আইসা সময় অঙ্গের হঠাৎ ঝাকনি; স্বক্, কুচ্‌কিব সন্ধি এবং হাঁটু'ব সন্ধিতে মোঁচড়াইয়া পড়া বা সন্ধি সরিয়া পড়া বা স্থান-ভ্রষ্ট (Dislocation) হওয়ার স্থায় বেদনা বা যাতনা; বাহু এবং পায়ে'র আক্ষেপিক ঝাকনি (ট্রোমন্); অঙ্গ প্রত্যঙ্গে কোন প্রাণী হামা দিয়া যাওয়ার স্থায় হুড়্‌হুড়ী এবং বিজি ধরার স্থায় অল্পভূত হওয়া। স্বক্ এবং বাহুর উক্ত ভাগস্থিত ডেন্টয়েড্‌ পেশীর (Deltoid muscle) স্পন্দন স্পন্দন; অতিরিক্ত সঞ্চালনের পর বা মোঁচড়াইয়া পড়িলে বেক্রপ হয়, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পশ্চাৎ দিকে ঝাকা করার সময় বাহুর সন্ধিতে সেক্রপ বেদনা; একটা নেজ্‌টী ইঁদুর হামা দিয়া বাইলে বেক্রপ হয়, বাহুর চর্ম্মের নীচে সেক্রপ

অল্পভূত হয়, বিশেষতঃ সন্ধ্যার সময়, বিছানায় শয়ন করিলে; পায়ের গোড়ালী (গোড়-মুতীতে) এবং পায়ের ডিমে (খোড়ায়) ছিঁড়িয়া ফেলার জ্বাৰ বেদনা, যাহার দৰুণ মনে হয় যেন অজ্ঞান্ত স্থান গুলি কেহ ছুরি দিয়া কাটিতেছে; দাঁড়াইলে, চলিলে অথবা পেশী সঞ্চালনে উক্ত বেদনার বৃদ্ধি ৷ বসি অবস্থা হইতে দাঁড়াইবার সময় হাঁটুর সন্ধি এবং পায়ের পাতার সন্ধিতে শক্ত বোধ; চলিবার সময় হাঁটুর সন্ধিতে কেড়্ কেড়্ শব্দ হয়; পায়ের পাতায় ভারি বোধ ৷

নিদ্রা । বারম্বার প্রবল বেগে চাইতোলা; অস্থির নিদ্রা বা ঘুম ভাল হয় না, অথবা ঘুম হইলেও সন্ধ্যাকালে ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়; সমুদয় রাত্রিতেই এক বিষয়ে স্বপ্ন দেখা; রাত্রিতে বোবায় ধরা (Night-mare); ঘুমের ঘোরে কৌথানী বা কোকানী; ঘুম হওয়া হওয়া সময়ে তষ্ঠাৎ চন্দিকা উঠা ৷

জ্বর । অত্যন্ত প্রবল শীত কম্প এবং উত্তাপ সঙ্কে সঙ্কে মুখমণ্ডল লালবর্ণ হয়; শীত, শরীরের পশ্চাৎভাগেই বাহ্যে অধিক জ্বলন্ত হয় এবং বাহ্যিক প্রয়োগে বাহ্য উপশম হয় (আস, ক্যালো-কার্ক) : শীতলাবস্থায় পিপাসা এবং বাহ্যিক উত্তাপ লওয়াই ইচ্ছা; উষ্ণাবস্থায় বাহ্যিক উত্তাপ একবারেই সহ্য হয় না এবং পিপাসা এক বারেই থাকে না; অপবাক্কে সমুদয় শরীর উষ্ণ, কিন্তু পিপাসা একবারেই থাকে না (পাল্‌স্); বাহ্যিক উষ্ণানুভব এবং উত্তাপ সঙ্কে সঙ্কে শরীর লাল বর্ণ হয়, কিন্তু আভ্যন্তরিক উত্তাপ একবারেই অল্পভূত হয় না; হাঁটু উষ্ণ এবং নাক ঠাণ্ডা; নখ মণ্ডলের এক পার্শ্বে জ্বালাযুক্ত উষ্ণানুভব; সামান্য পরিমাণে, অথবা কেবল মুখ মণ্ডলেই ঘর্ম্ম হয়; সবিরাম-জ্বর; জ্বরের সময় সমুদয় শরীর চুলকায় এবং পায় আনবাতের জ্বাৰ কুস্কড়ি বাহির হয় ৷

চর্ম্ম । গা চুলকায়; সামান্য চুলকাইলেই চুলকানী নিবারণিত হয়; শরীরের স্থানে স্থানে ছাগ উঠিয়া বাইরা খা হয় (গ্রাক্, হাইড্রাট্, লাইকোপ্) ৷

ব্যবহার । মনের কষ্ট, পারাপ সংবাদ পাইয়া, শোক, দুঃখ এবং অপ্রকৃত্ত মানসিক দগ্ধতা জনিত অস্থখ; অস্ত্রের প্রেমে বৈমুখ বা নৈরাশ হওয়া জনিত অস্থখ (হায়োস্, কন্-আস্); সর্ব্বদা নিস্তরুভাবে থাকা;

হিষ্টিরিয়া (বাহার আক্রমণ বা ক্রিটের সময় পেট ফাঁপে এবং শ্বাস রোধ হয়) ; আক্ষেপ ; খিলধরা ; আক্ষেপ এবং সমুদয় প্রকারের আক্ষেপিক অন্থঃ ; মুগী-রোগ ; অনিচ্ছাপূর্বক পেশী স্পন্দন বা কোরিয়া (Chorea) ; পক্ষাঘাত ; শ্বাস-শূল ; স্নায়বিক শিরঃপীড়া ; পাকস্থলীতে বেদনা বা শূল ; অর্শরোগ ; গুহ এবং গুহদ্বার বাহিণ্ণ হইয়া পড়া ; স্নায়বিক অজীর্ণরোগ ; সবিরাম এবং স্নায়বিক জ্বর ; আক্ষেপিক কাশি ; হিষ্টিরিয়া আক্রান্ত জীলোকের সকল প্রকারের অন্থঃ ; পণ্ডমালা জনিত ঢকু প্রশ্ন এবং তদ্রূপ ঢকে আলোক অসহ্য হওয়া ; পুৰাতন সন্ধি ; হিষ্টিরিয়া আক্রান্ত জীলোকের দন্তশূল ; শিশুগণের কঠে দাঁত উঠার দরুন আক্ষেপ ; হিষ্টিরিয়া আক্রান্ত রোগীর শূল-বেদনা ; ক্রমি ; কঠকর রক্তস্রাব এবং বাধকের বেদনা ; অরাত্তে খিল ধরা ; শিশু-গণের শরীরের সন্ধির চামড়ার ভাজে ভাজে ছাল উঠিয়া যাওয়ার হ্রায় ক্ষত হওয়া ইত্যাদি অন্থঃ ইমেসিয়া ব্যবহার্য্য। ইহা জীলোক, শিশু ও ছোট বালক বালিকাগণের রোগে বিশেষ উপকারী ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । হিষ্টিরিয়া আক্রান্ত চটা স্বভাব বিশিষ্ট ধাতু ; শরীরের স্থানে স্থানে আক্ষেপিক স্পন্দন, বিশেষতঃ ভয় বা শোক পাইয়া ; হিষ্টিরিয়া জনিত আক্ষেপ ; একবার আক্ষেপ এবং উহার পরক্ষণই শ্বাস কষ্ট ; সামান্য বেদনা যন্ত্রণাও প্রবল বলিয়া অনুভব করা ; রাজিতে বারম্বার পাশ পরিবর্তন করা ; স্নায়বিক এবং সহজেই হিষ্টিরিয়া দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার ধাতু ; শান্ত প্রকৃতি বিশিষ্ট জীলোক এবং সহজে চটিয়া যাওয়ার স্বভাব ; আত্মকালে ঘুম ভাঙ্গিবার পরই, সন্ধার সময় শয়ন করিলে, মধ্যাহ্নে আহ্বারের পর, সামান্য স্পর্শনে, তামাকু, কাকি এবং মদ খাইলে অন্থঃের বৃদ্ধি, এবং চীত হইয়া বা আক্রান্ত বা বেদনাযুক্ত পার্শ্বে শয়ন করিলে, পাশ পরিবর্তন অথবা প্রবল প্রচাপনে অন্থঃের উপশম ইত্যাদি ইমেসিয়ার কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ । ইমেসিয়ার কার্য্যের সঙ্গে ক্যামোমিলা, ককিয়া, নাক্স বর্মকা এবং ষ্ট্রোমোনিয়ানের কার্য্যের অনেক সাদৃশ্য আছে । এত-দূর কোন কোন বিষয়ে ইহার কার্য্যের সঙ্গে অশিনিঙ্ক, ককিউলাস্, হায়ো-শায়েরমাস্, ইপিকাকিউএনা, নাক্স মফাটা, পাল্সেটিলার কার্য্যের সাদৃশ্য আছে ।

প্রতিষেধক ঔষধ। আর্গিকা, ক্যামোরিলা, ক্যাম্ফার, ককিউ-
লাস্, কফিয়া, নাক্স-বমিকা, পাল্‌সেটোলা ইত্যাদি ইথেনিসিয়ার প্রতিষেধক
ঔষধ মধ্যে পরিগণিত। অধিক মাত্রায় ইথেনিসিয়া দ্বারা বিবাক্ত হইলে
রোগীকে কাকি ধাওয়াইন উচিত।

ডাইলুশন বিচার। এই ঔষধের ৩০ ক্রমই হানিয়ান সচরাচর
ব্যবহার করিতেন। ৬ এবং ১২ ডাইলুশন আমরা সচরাচর ব্যবহার করিয়া
থাকি। কোন কোন চিকিৎসক এই ঔষধের ১ম, ২য় এবং ৩য় ডাইলু-
শনও ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল পাইয়া থাকেন। আবার কেহ কেহ ইহার
দশমিক ক্রমের গুঁড়া, ১ গ্রেইন্ মাত্রায়, ব্যবহার করিয়া ভাল ফল পাইয়া
থাকেন। ডাক্তার হিউজ বলেন যে উল্লিখিত সমুদয় ক্রমই উপকারী।

আয়োডিয়াম্,—আয়োডিন্,—আয়োড্।

(Iodum.—Iodine,—Iod)

কোন এক বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয় হইতে আদিত আয়ো-
ডিন্ ক্রয় করিয়া উহার ১ ভাগ, ২ ভাগ বেকটিকাউড্ স্পিৰিটে (১ গ্রেইন্
আদিত আয়োডিন্ এবং ২ ফোঁটা বেকটিকাউড্ স্পিৰিটে একটি টপার্ড্
(Stoppered) শিশিতে লইয়া, নিশাইয়া ১ম দশমিক ক্রমের আদোক প্রস্তুত
হইয়া থাকে। ইহার মূল আদোক প্রস্তুত হয় না। ইহার ১ম, ২য় এবং ৩য়
ক্রম কাচের টপার্ড্ শিশিতে রাখা উচিত।

সাধারণ ক্রিয়া। গ্যাংলিয়োনিক্ (Ganglionic) স্নায়ুতন্ত্রের
উপর আয়োডিনের কার্য অতি প্রবল। উক্ত স্নায়ুতন্ত্রের মধ্য দিয়া
ইহা গ্রন্থি এবং রেখা নিঃসারক কিল্লীগুলি প্রবলরূপে আক্রমণ করিয়া
থাকে, বাহ্যিক দক্ষণ আক্রান্ত গ্রন্থি এবং রেখা নিঃসারক কিল্লী দুর্বল এবং
অবসর হইয়া পড়ে, উহারিণের উৎপাদন এবং কার্য করার শক্তির বিকৃতি
বা হ্রাস হয় ও আক্রান্ত অংশের আয়তনের হ্রাস (Atrophy) বা কখন কখন
উহার সম্পূর্ণ বিনাশও হইয়া থাকে। গ্রন্থির উপর উক্ত প্রকারে কার্যের

দ্রবণ কখন কখন আক্রান্ত গ্রন্থির উৎপাদন এবং কার্য্য করার শক্তি হ্রাস হওয়ায় উহাতে চর্বির অতিরিক্ত বিবৃদ্ধি হইয়া আক্রান্ত গ্রন্থি বিকৃত হইয়া পড়ে । আয়োডিন্ দ্বারা বিষাক্ত হইলে যে সকল কারণে গ্রন্থির হ্রাস (Atrophy) হয়, সে সকল কারণেই আবার উহার চর্বিযুক্ত বিবৃদ্ধি হইয়া থাকে । উক্ত প্রকার কার্য্য গ্রীবাদেশের সম্মুখস্থ থাইরয়েড্ গ্রন্থির (Thyroid gland) উপরই সচরাচর সর্বাধিক অধিক দেখিতে পাওয়া যায় । এতদ্বিন্ন মেসেন্টারিক্ গ্রন্থি (Mesenteric glands), স্তন, ডিম্বকোষ (Ovaries), অণ্ডকোষ ইত্যাদি গ্রন্থির উপরও আয়োডিনের উক্ত প্রকারের কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায় । অতএব আয়োডিন্ দ্বারা বিষাক্ত হইলে গলগণ্ড (Goitre) মেসেন্টারিক্ গ্রন্থির প্রদাহ এবং উহার ক্ষয় (Tubercles Mesenterica), স্তনের গ্রন্থি প্রদাহ, ডিম্বকোষ প্রদাহ এবং উহার বিবৃদ্ধি, অণ্ডকোষ প্রদাহ ইত্যাদি রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে । দ্রব প্রকারের মৈত্রিক কিল্লী আছে তন্মধ্যে স্বাস্থ্যবস্তুর কিল্লীর উপরই আয়োডিনের কার্য্য অধিক প্রবল বলিয়া অনুমিত । শরীরের সামান্যিক বা হানিক ক্ষয় করা আয়োডিনের একটা বিশেষ গুণ বা শক্তি মধ্যে পরিগণিত ।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মন । সর্দঙ্গা হৃৎপিণ্ড এবং নিস্তব্ধভাবে থাকার ভাব (নেট্রাম্-মিউর, পাল্‌স্) ; মনের অত্যন্ত অবসন্নতা এবং কাদিবার স্বভাব ; স্মারক বা মানসিক অত্যন্ত উজ্জনা (চায়না, কফিয়া) ।

মস্তক । প্রাতঃকালে মাথা কিম্ কিম্ করা ; মাথাঘোরা ; মাথা এবং সমুদয় শরীরে দপ্পদপানি (পাল্‌স্, সিপিটা) ; হৃৎপ্রদেশে ধড়-ফড়ান এবং মূৰ্ছা ; বস বা শয়নাবস্থ হইতে উঠার পর (ব্রাই), অথবা সামান্য শারীরিক পারিশ্রমের পর বসিলে বা শয়ন করিলে বাহ্যর বৃদ্ধি হয় ; কপালের বাম পার্শ্বের উপরিভাগে অত্যন্ত প্রথর বেদনা ; প্রত্যেক বার নড়াচড়াতে মাথায় দপ্পদপানি ; গরম বাতাসে শিরঃপীড়ার উদ্রেক বা শিরঃপীড়ার বৃদ্ধি ; মাথায় রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কে দপ্পদপানি ।

চক্ষু । চক্ষুর খোঁতাংশ মলিন হরিদ্রা বর্ণ (চারনা, ক্যাম্ফার, চেলিডন, প্লাস্) ; চক্ষুর গোলক যেন বহির্দিকে বাহির হইয়া পড়ে ; ছাল উঠিয়া গেলে যেরূপ হয়, চক্ষে সেরূপ বেদনা বা যাতনা ; চক্ষুর পাতার শোধের ভাষা স্বীতি ।

কর্ণ । কানে বজ্জ্ব শব্দ হওয়া এবং কানে কম শ্রবণ ।

মুখমণ্ডল । মুখমণ্ডল ফিকা বা শিটা হরিদ্রার আভ্যন্তর (আর্জেট-নাইট্রিক, হিপ-সালফ, নিপিট্রা), অথবা সবুজের আভ্যন্তর ; মুখকৃতি ফেকাশে এবং অত্যন্ত উদ্বেগমুক্ত ; ৬ই নীলবর্ণ এবং ভাসান শিরাদুলির স্বীতি ; হস্তান্তির নিম্নস্থিত গ্রন্থি (Sub-maxillary glands) স্বীতি (অরাম, ব্যারাইটা-কাল্, কাকিউলাস্, মাইলিয়াস) ।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য । মাড়ি দিয়া বন্ধ পড়া (কার্বো-বেজ্, মার্ক্, নাইট্রিক-অ্যাস্) ; মাড়ির কোমলতা : প্রাতঃকালে দাঁত ধোয়া দ্বারা আবৃত থাকে : মুখে কা (বোবোয়, হেলিবোবোয়, মার্ক্) ; মুখে তুর্গক (আর্গিকা) ; মুখে প্রচুর লাল উষ্ণ (মার্ক্) ; পানির অপব্যবহারের পর মুখে লাল উঠা (চারনা, নাইট্রিক-অ্যাস) ; ভজ্জ্বা গড়ে লেপযুক্ত । গলার মধ্যের সংশ্লেষন দ্বারা দক্ষ কোমলতা শিরাবার ব্যাঘাত জন্মে (বেল্, হায়োস্, থ্রোম) ; গলার মাধ্য ফক এবং উত্তাপ মূলে মূলে প্রবাহেশস্ত গ্রন্থির স্বীতি ; আহার বহা গলনমাত্র প্রবাহ এবং ফক ; গলার মধ্যে বেদনা বা টাটানি, যাচার দক্ষ কোমল হওয়া প্রিন্তে অত্যন্ত কষ্ট অনুভূত হয় ।

পাকস্থলী এবং উদর । হঠ বা অস্থিরিত্ত ক্রিয়া দ্বারা কোন মতেই নিবারণিত হয় না (বাগী) ; বমনোদ্বেগ : আহাৰ কবিলে বমনের পুনরাব্রমণ ; অপাক জনক দ্রব্য গ্রহণের পূর্বক মনো ; পাক্যক্রমের আচরণের পর পেট কন্ কন্ করে ; মূত্র দিয়া কন্ উঠা, বিশেষতঃ অপাক জনক দ্রব্য গ্রহণের পর । উদরের দান পাশ কর্তন এর মাঝে চাপিলে বেদনার উল্লেখ হয় ; উদরে স্বীতি এবং বিস্তৃত হয় (আর্জি কাল্, জাক, হিপ-সালফ) ; উদরে দুলিত বায়ু কন্ কন্ করে (কার্বো-বেজ্, লাই-কোপ) ; কৃষ্ণকির প্রবাহ প্রবাহ এবং স্বীতি (বাগী) (ক্যাক্-কার্ক, ক্রিমেটিস্, মার্ক) ।

মল । পর্যায়ক্রমে উদরাময় এবং কোষ্ঠবদ্ধ (আন্টি-ক্লড, সিমি-সিক্, নাক্স-বম্) ; মল সাদাটিয়া, ফেণায়ুক্ত শ্লেষ্মা ; কোষ্ঠবদ্ধ ।

মূত্রে যন্ত্র । প্রচুব পরিমাণে বারম্বার মূত্রতাগ (এপিস্, আর্জেন্ট-কেট্, সিপা) ; মূত্রাবরোধ ; রাত্রিতে অনিচ্ছাপূর্বক বা অসাড়ে মূত্র নির্গমন (স্বপ্নে) ।

জননেন্দ্রিয় । পুরুষের অণুকোষ এবং অণুকোষাধারের স্বীকৃতি এবং কঠিনতা (একন্, অর্জেন্ট-নাইটি, কোনায়াম্) ; স্ত্রীসহবাসের ইচ্ছার বৃদ্ধি । স্ত্রীলোকের জরায়ু এবং ডিম্বকোষের স্বীকৃতি এবং কঠিনতা (কোনা-য়াম্) ; স্তন ক্লিষ্টা পড়ে এবং তল্ তলে বা কোনল হয় ; কোন কোন বার নিয়মিত সময়ের অনেক পূর্বে, এবং কোন কোন বার নিয়মিত সময়ের অনেক পদ, পজারাব হয় : জরায়ু হঠাৎ অতিরিক্ত রক্তস্রাব (Metrorrhagia), প্রত্যেক বার মলতাগের সময় বাগার বন্ধ হয় ; উগ্র, অগা উৎপাদক এবং ক্ষতকারণ স্বৈত প্রদর বাহ্য লাগিয়া ক্ষত হয় ; প্রত্যেকবার রক্তস্রাবের সময় যেত প্রবরের বৃদ্ধি ।

শ্বাস যন্ত্র । স্ববভঙ্গ (একন্, হিপ-সাল্ফ্, ফস্) ; কণ্ঠনালীতে বেদনা এবং উদার সঙ্গ সঙ্গে কাশির টান্ধা ; শ্বাসপ্রশ্বাসে আঁটাবোধ ; শ্বাস প্রশ্বাস, বিশেষতঃ নিশ্বাসে অত্যন্ত কষ্টবোধ ; সপন্দা বুড়ী কাশি (Membranous Croup) (ডোমিন্, ক্যানো-বাই) এবং উদার সঙ্গে সঙ্গে শ্বাস প্রশ্বাসে দাঁই দাঁই এবং কড়াতে কাঠ চিরার শব্দের হ্রাস শব্দ হওয়া ; খেউ খেউ শব্দ বিশিষ্ট শুক কাশি (স্পঞ্জ) ; নোঙ্গী (শিঙ) হাত দিয়া গলা চাপিয়া ধরে (একন্) ; বায়ুনলের উপবিভাগের স্বল্প মুখের শোথ ; শুক কাশি এবং উদার সঙ্গে সঙ্গে বুকের মধ্যে হৃচাবধানের হ্রাস বেদনা বা যাতনা ও অগাভাব ; কাশি এবং গলাদিয়া প্রচুর পরিমাণে শ্লেষ্মা নির্গমন, অনেক সময় শ্লেষ্মার সঙ্গে রক্তের ছিট থাকে : বুকে ডাঙ্গল বোধ (হীনাম্) ; বুকে ছুরী ধিধানের হ্রাস প্রথম বেদনা ; বায়ুনল এবং দুফুসে রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ ও উদার দরুণ রক্তস্রাবের ধাক্কা ; দুফুসের বন্ধতবৎ কঠিনতা (Hepatitis) দুফুসের উদ্ধাংশেই বাহ্য অধিক হয় এবং উহা কখন কখন অতি নীল শীঘ্র বৃদ্ধি হয় ; বুকের মধ্যে অত্যন্ত আঁটা বোধ ; প্রাতঃকালে কাশি ।

জ্বংপিণ্ড এবং নাড়ী । অত্যন্ত প্রবল জ্বংস্পন্দন, সামান্ত শারীরিক পরিশ্রমেই বাহার বৃদ্ধি হয় ; জ্বংস্পন্দনে অনবরত ভারিবোধ এবং অত্যন্ত কষ্টানুভব (ক্যাক্টাস্, লিলিয়াম্ টাইগ্রি) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত প্রথর বা তীক্ষ্ণ বেদনা যাহা স্থানে স্থানে সরিয়া বেড়ায় ; জ্বংস্পন্দনে অত্যন্ত উষ্ণেগ, বাহার দৃঢ় রোগী বারম্বার পাশ পরিবর্তন করিতে বাধ্য হয় (একন্, রাস্টক্, আস্) ।

গ্রীবা । গলগণ্ড (Goitre) এবং উহার অত্যন্ত কঠিনতা, গ্রীবাদেশস্থ গ্রন্থির ক্ষীণি এবং কঠিনতা (ব্যাবাইটা-কার্ক্, ক্যাক্-ক্যাক্, ক্রিরাঙ্ক্) ।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গ । হাত পায়ের পাতার পেশীর অগ্রভাগের (Tendons) স্পন্দন ; অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কাণাম ; দাম কলুইয়ের সন্ধিতে ছিঁড়িয়া ফেলার স্থায় বেদনা (আস্, ফেরাম্), পায়ের পাতার শোথের ভার ক্ষাতি ; পায়ের পাতায় উগ্র, ক্ষতকারক ঘর্ম্ম ।

চর্ম্ম । চর্ম্ম মলিন হরিদ্রাবর্ণ, আর্দ্র এবং চট্‌চটিয়া আসা (কেবাম্, মার্ক্) ; চর্ম্ম শুষ্ক এবং জ্বংস্পন্দে ।

ব্যবহার । পিত্তর অস্বাভাব্য জনিত অস্থখ ; গণ্ডমালা জনিত অস্থখ ; প্রস্থব বিবৃদ্ধি এবং কঠিনতা ; গ্রন্থি স্বভাবিক অপেক্ষা ছোট বা সঙ্কুচিত হওয়া বা উহার ক্ষয় বা হ্রাস ; মুখ দিয়া বাল উঠা ; অজীর্ণ ; সপন্দা ঘূংড়ী কাণি (Membranous 'roup) ; অপ্রকোষধারের প্রদাহ এবং শোথ (Hydrocele) ; গলগণ্ড ; গ্রীবাকের ভিক্ষকোষের ক্ষীণি, কঠিনতা এবং উহার শোথ ; ফোড়া ; অস্থি অসম্পূর্ণ বিকাশ তেহু অস্থখ (Rachitic Affections) : বাতজনিত অস্থখ ; গণ্ডমালা জনিত চক্ষু এবং কণপ্রদাহ ; অন্ত্রক্ষয় বা টোবস্ মেসেন্টেরিকা (Tubes Mesenterica) ; শ্বেত প্রদর ; কণ্ঠনালীর পুরাতন প্রদাহ (Chronic Laryngitis) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গলার মধ্যে ক্ষত ; পুরাতন সন্ধি ; হাঁপস্কন্ধ ; হাঁটুর সন্ধির প্রদাহবৃত্ত ক্ষীণি : শিবা-পীড়া ইত্যাদি অস্থখে আয়োড়িন্ ব্যবহার্য্য ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । অত্যন্ত পেশীক্ষয় বা জীর্ণ শীর্ণ হওয়া ; গ্রন্থির ক্ষাতি এবং উহার কঠিনতা ; রাত্রিতে প্রচুর ঘর্ম্ম হওয়া ; অত্যন্ত জ্বলক্ষয় ; রাত্রিতে অস্থিতে বেদনা, গণ্ডমালা ধাতু, বৃদ্ধ বয়স ; সন্ধির অস্থখ

এবং উহাতে রাত্রিযোগে বেদনার উজ্জেক ; প্রবল অর ; অস্থিরতা ; শিশুশাস ; দগ্ধশিষা শিরশীড়া ; গাল চক্রাকারে লালবর্ণ হওয়া ; কোন বিষয়েই মন থাকে না ; রাত্রিতে, অপরাহ্নে, চলিয়া বা গাড়ী ঘোড়ার চাপিয়া বঁড়াইলে, চাঞ্চ দিলে, উষ্ণ প্রয়োগে, বিছানায় উঠিয়া বসিলে অস্থিরতা বৃদ্ধি ; ঠাণ্ডাত্তে, ঘুমের পর, আহারের পর অস্থিরতার উপশম ইত্যাদি আয়োডিনের কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক নির্দিষ্ট লক্ষণ ।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ । আয়ুর্জি, ব্রোমিন, কষ্টিকাম, কোনা-য়াম, ডিজিটালিস, হিপার সাল্‌ফিউরিস, ক্যালী বাইকমিকাম, মার্কিউরি-য়াম, ফস্‌ফরাস, স্পিজিয়া, সাল্‌ফার ইত্যাদি ঔষধের কার্যের সঙ্গে আয়োডিনের কার্যের সাদৃশ্য আছে ।

প্রতিষেধক ঔষধ । আন্টিমোনিয়াম টার্টারিকাম, ক্যান্‌ফার, চিনিয়াম সাল্‌ফ, কফিয়া, হিপার সাল্‌ফার, ফস্‌ফরাস, স্পিজিয়া, সাল্‌ফার ইত্যাদি আয়োডিনের প্রতিষেধক ঔষধ মধ্যে পরিগণিত । অধিক মাত্রায় আয়োডিন্‌ দ্বারা বিষাক্ত হইলে ময়দা জলে বিশাইয়া রোগীকে খাওয়াইবে ।

ডাইলুশন বিচার । ৩য় এবং ৬ষ্ঠ শততমিক ক্রমই সচরাচর অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে । কোন কোন চিকিৎসক এই ঔষধের ৩০ ক্রমও ব্যবহার করিয়া থাকেন । বয়সী, অগুরুব এবং অগুরুবাবারের প্রলাহ, শোথ এবং কঠিনতা এবং গলগণ্ডে এই ঔষধের ২য় দশমিক ক্রমের আরোহ আক্রান্ত স্থানে প্রতিদিন প্রাতে এবং বৈকালে তুলীদ্বারা লেপিয়া দিলে বিশেষ উপকার দর্শিতে দেখা যায় । কড্‌লিবার অএল (Cod-liver oil) আয়োডিনের অংশ থাকা হেতু গওনালা জ্বলিত অস্থিরতা উহা ৪।৫ কোঁটা মাত্রায় বিশেষ উপকারী । যক্ষাকশ, অস্থিকর বা টেবিস্‌ মেলেন্টে-রিকা, টন্‌সিলের প্রলাহ, ক্ষীতি এবং কঠিনতা ইত্যাদিতে কড্‌লিবার অএল বিশেষ উপকারী । অতএব অগ্রাভ্য ঔষধের সঙ্গে সঙ্গে উক্ত রোগসমূহে কড্‌লিবার অএল ব্যবস্থা করিলে বিশেষ ফল পাওয়ার সম্ভাবনা, রোগ চিকিৎসার ফল দেখিয়া লেখক একুপ বিশ্বাস করেন ।

ইপিকাকিউএনা,—ইপিকাক্ ।

(IPFCAGUANHA, — IPEC.)

এই গাছের মূল বা শিকড় দিয়া যথা নিয়মে ২০° ডিগ্রী ওয়ার প্রাক্ স্পিরিটে ইহার মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে । ইহার মূলা কোন এক বিষমত হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয় হইতে ক্রয় করা উচিত । ইহার গুঁড়াও প্রস্তুত হইয়া ঔষধার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

সাধারণ ক্রিয়া । বেগাম্ বা নিউমেগাস্ট্রিক্ নার্ভ (Pneumogastric nerve) শাখা প্রশাখার উপর ইহার কার্য অত্যন্ত প্রবল, যাহার দরুণ বক্ষ এবং পাকস্থলীতে আকস্মিক উত্তেজনার উদ্বেক হইয়া ইপানি কাশি এবং বমনোদ্বেষণ বা বমনেব উদ্বেক হইয়া থাকে । শ্বাস বন্ধ এবং পরিপাক কার্যসম্বন্ধীয় যন্ত্রাদির রৈম্মিক ক্রিয়া উত্তেজিত করিয়া ইহা উক্ত যন্ত্রাদির স্বেচ্ছা জনিত রোগ উৎপাদন করে এবং উক্ত উপায়ে রৈম্মিক ক্রিয়ার উত্তেজনা উৎপাদন করার দরুণ রৈম্মিক ক্রিয়া হইতে রক্ত-স্রাবও হইতে দেখা যায় ।

সাধারণ প্রাকৃতির লক্ষণ ।

মন । সর্বদা চিড়্, চিড়্, করা, খিট্, খিট্, করা (ব্রাই, ক্যাম্) এবং অধৈর্য্য হওয়া ; সর্বদা বিমর্ষভাবে থাকা এবং সকলকেই তৃণা করার স্বভাব ; রাগ, হুঃখ, বৈব্রক্তি হেতু মনের অন্তর্ভ ।

মস্তক । খেঁচলিরা গেলে বা মোচড়াইয়া পড়িলে যেরূপ হয়, মাথার সমুদয় হাড় এবং জিহ্বার মূল পর্য্যন্ত, সেক্ষপ বেদনা ও উহার সঙ্গে সঙ্গে বমনোদ্বেষণ ; একপেপে (আধ্, কপালিয়া) মাথা বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বমনোদ্বেষণ এবং বমন ; চলিবার সময় বা ঘুরিলে মাথাঘোরা ।

নাসিকা । সর্দি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে স্বেচ্ছা দ্বারা নাসারন্ধ্র বন্ধ হইয়া থাকা এবং বমনোদ্বেষণ ; নাক দিয়া উজ্জ্বল লালবর্ণ রক্ত পড়া (ডাক্) ।

চক্ষু । চক্ষুর তারি বিস্তৃত, চক্ষু প্রদাহযুক্ত এবং লালবর্ণ ; চক্ষুর আভার কাঁপনি, চক্ষুর বহির্দিকের কোণে কঠিন কেতুরের সঞ্চয় ।

মুখ মণ্ডল । মুখ মণ্ডল শিটা, শোথের ছায় টল্ টলে অপবা বসিয়া থাকে; চক্ষু নীলের রেখা দ্বারা পরিবেষ্টিত (চারনা, সিকেল্ সাল্ফ্); নিদিষ্ট সময়ে চক্ষুর কোটরের উপর এবং নিম্ন ভাগস্থিত স্নায়ুশূল এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে চক্ষে আলোক সহ না হওয়া, চক্ষু দিয়া জল পড়া, চক্ষুর পাতায় চিড়িক্ মারা এবং আঘাত করা; মেলেরিয়া জনিত মুখ মণ্ডলস্থ স্নায়ুশূল ।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য । যথেষ্ট প্রচুর লাল উঠা (চারনা, মার্ক্) যাহার দরুণ রোগী বাতস্রাব ঢোক গিলিতে বাধা হয়। গলার মধ্যের আক্ষেপ এবং সংকোচন। মুখে কোন স্বাদ থাকে না এবং জিহ্বা গাঢ় সাদা লেপযুক্ত ।

পাকস্থলী এবং উদর । সমুদয় প্রকার আহার দ্রব্যেই অকৃতি (আন্টিক্রুড্, ককিউলান্); স্নায়ু এবং মিষ্ট দ্রব্য খাইবার ইচ্ছা; কঠিন উল্কার উঠা (ফুল্, মার্ক্); অত্যন্ত কষ্টদায়ক বমনোদ্বেগ, বমনের ইচ্ছা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পাকস্থলীতে নানী প্রকারের যাতনা; অন-বরত বা ক্রমাগত বমনোদ্বেগ : উদরস্থ আহার দ্রব্যাদি বমন; পিত্তযুক্ত তিক্ত তরল পদার্থ বমন : ভিজা গর্দের ছায় তরল সবুজ স্লেয়া বমন; মাথা হেট্ করিয়া উপড় হইলেই বমন; রক্ত বমন; আক্সাইডরাব ছায় তরল পদার্থ বমন; বমন, পিপাসা, ঘন্থ এবং মুখে তর্পক; বমন এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পেট ফাঁপা ও উহার বিস্তৃতি; বমনের পব নিদ্রার ইচ্ছা; অপাক কারক আহার দ্রব্য, বরফ দ্বারা ঠাণ্ডা কবা দ্রব্যাদি খাইয়া পাকস্থলীতে স্লেয়ার সঞ্চার; শিথিল হইয়া কুণিয়া পাড়লে ঘেঁষা হয়, পাকস্থলীতে সেক্ষণ কষ্টাত্তব (টেবেকাম্)। উদরের ছায়া পাশ্ব এবং পাকস্থলীর মধ্যে চিন্টিনে বেদনা (বেল্); পেটকামড়ান, যাহার দরুণ মনে হয় যেন কেহ আঙ্গুল দিয়া অল্প চাপিতেছে, বিশ্রাম কামান বা স্থিরভাবে থাকিলে যাহার উপশম হয় এবং নড়াচড়াতে যাহার বৃদ্ধি হয় (বেল্); প্রত্যেক বার নড়া-চড়াতেই উদরে কষ্টনবৎ বেদনার উদ্রেক হয় যাহা বার পার্থ হইতে ডাইন পার্শ্বে বিস্তৃত হয়।

মল । উদরাময়; মল যেন পচা এবং ঘাসের রসের ছায় সবুজবর্ণ

(আগারিকাশ), এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বমনোদ্বেষণ ও শূলবেদনা বা পেটকামড়ানি ; বারবার সবুজের আভাযুক্ত শ্বেদা ভেদ (এপিস্, আর্জেন্ট-নাইটি, অস্, কেল্, পালস্) ; রক্ত ভেদ, রক্ত উজ্জ্বল লালবর্ণ (ইউকেলিপটাস্), এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে শুষ্কভাবে জ্বালা ও কতকগুলি বেদনা বা ব্যতনা ; শরৎকালীর উদরাময় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে নাড়ি প্রদেশে কামড়ানী ; আমাশয়ের ত্রাণ ভেদ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কষ্টদায়ক কোথপাড়া ।

মূত্রযন্ত্র । রক্তপ্রস্রাব, (ক্যাষ্টে, মিলিকল্, নাইটিক্-ল্যাম্) ; মূত্র ঘোলাটিয়া এবং উহার নীচে ইটের গুঁড়ির ত্রাণ তলানি পড়ে ।

জননেন্দ্রিয় । জরায়ু হইতে রক্তস্রাব (একন্, ইরিকারগ, হামা-মেলিস্, মিলিকল্, সিকেল্), রক্ত উজ্জ্বল লালবর্ণ, পরিমাণে অধিক, চাপ্, চাপ্, থানী থানী, এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বমনোদ্বেষণ, শ্বাস প্রস্রাসে বৃদ্ধি ভাবি ও আঁটাবোধ এবং নাড়ি হইতে জরায়ু পর্যন্ত স্থচীবিধানের ত্রাণ বেদনা বা ব্যতনা ; নিয়মিত সময়ের অনেক পূর্বে অধূমিক্ত পরিমাণে রক্তস্রাব, রক্ত উজ্জ্বল লালবর্ণ ।

শ্বাস যন্ত্র । শ্বাসপ্রস্রাসে বায়ুনলের মধ্যে সাঁই সাঁই ঘড়্, ঘড়্, শব্দ হয় (আর্জেন্ট-ট্যাট্, ফস্, টেনাম্) ; বৃকের মধ্যে অতিরিক্ত পরিমাণে শ্বেদার সঞ্চয়, কিন্তু কাশিলে শ্বেদা নির্গত হয় না (আর্জেন্ট-ট্যাট্) ; শ্বাসরোধক কাশি, গলার মধ্যে সঙ্কোচন বা উহাতে সড়্, সড়্, দ্রব দ্রব যাহার উল্লেখ হয় এবং কখন কখন কাশিতে কাশিতে শ্বেদা বমন ; শ্বাসকষ্ট এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে ক্রম অগ্রপ্রদেশে সাঁই সাঁই শব্দ এবং ভারিবোধ ও অত্যন্ত উদ্বেষণ ; গলা এবং বৃকের মধ্যে অত্যন্ত আঁটাবোধ ও উহার সঙ্গে সঙ্গে শ্বাস প্রস্রাস ঘন ঘন এবং শ্বাসপ্রস্রাসে সাঁই সাঁই শব্দ হয় ; রোগী ঘরের জানালায় নিকট বাইরা দায়া সেবন করিতে চাহে ; মুখনওল শিটা ; সামান্য নড়াচড়াতে সহ্যকারি বৃদ্ধি ; রোগী কাঁপড় হওয়ার উপক্রম হয় ; হাঁপানি কাশি (অস্) ; শ্বাস দ্বারা ধূলা টানিলে দেকপ হয়, পূর্বাঙ্কে বৃকের মধ্যে দেকপ আঁটাবোধ এবং শ্বাসপ্রস্রাস ঘন ঘন ; কণ্ঠনাসীর উপরিভাগ হইতে বায়ুনলীর নিম্নভাগ পর্যন্ত অংশের সড়্, সড়্, দ্রব দ্রব কাশির উল্লেখ ; কাশির দ্রব বমনের ইচ্ছা হয়, কিন্তু বমনোদ্বেষণ থাকে না ; শ্বাসরোধক কাশি,

ঘাহার দক্ষণ রোগী (শিশু) একবারে শক্ত হয় এবং তাহার ওষ্ঠ নীলবর্ণ হয় (কোরেল্-কব); ছপিং কাশি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে নাক দিয়া মুখ দিয়া রক্ত-পড়া, বমন, শ্বাসরোধ, সমুদয় শরীর শিঠা বা নীলবর্ণ হইবা রোগীর শরীর একবারে শক্ত হয়; কাশি এবং গলা দিয়া রক্ত উঠা; রক্তোৎকাশ; সামান্য শারীরিক পরিশ্রমেই রক্তোৎকাশ ।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ । এক হাত ঠাণ্ডা এবং অপর হাত উষ্ণ; হাড়ে থেঁতলিয়া মাওয়া বা মোচুড়াইয়া পড়ায় স্থায় বেদনা বা ব্যতনা ।

জ্বর । পৃষ্ঠদেশে বেদনা, শীতলাবস্থা অল্পকাল স্থায়ী, উষ্ণাবস্থা অধিক কাল স্থায়ী; সচরাচর উষ্ণাবস্থায় পিপাসা; শিরঃপীড়া, বমনোদেগ ও কাশি এবং তৎপর ঘর্ম; বাস্তবিক শীতবোধ এবং আভ্যন্তরিক উষ্ণামুভব; সবিরাম অব্বে বমন বা বমনোদেগ অস্বাভাবিক লক্ষণ অপেক্ষা প্রবল; কোইনাইনের অপব্যবহার জনিত আট্‌কান জ্বর; অনিয়মিত গতিবিশিষ্ট জ্বরের প্রথমাবস্থায় বমনোদেগ অত্যন্ত প্রবল; যে প্রকার জ্বরে শীতলাবস্থা, উষ্ণাবস্থা এবং ঘর্মাবস্থা এবং সামুখিক শিরঃপীড়া থাকে । শীত হয় বটে, কিন্তু রোগী সামান্য উত্তাপও সহ করিতে পারে না; অপরাহ্ন ও ঘটিকার সময় হঠাৎ শরীর উষ্ণ হয়, কিন্তু পিপাসা থাকে না ।

ব্যবহার । বমন বা বমন সম্বলিত সকল প্রকারের অসুখ; ইপানি কাশি; ঘুংড়ী কাশি; ছপিং কব বা কাশি; বায়ুনলগ্রন্থি সহ-লিত ইপানি কাশি (Bronchitic Asthma); সকল প্রকারের রক্তস্রাব; নাসিকা হইতে রক্তস্রাব; রক্তভেদ; রক্তবমন; রক্তোৎকাশ; জরায়ু হইতে রক্তস্রাব (Metrorrhagia); অতিরিক্ত বা প্রচুর রক্তস্রাব; বায়ুনল এবং বায়ু উপনল প্রদাহ (শিশুগণের পক্ষে বিশেষ উপকারী); উদরাময়; সবিরাম-জ্বর; কোইনাইনের অপব্যবহার জনিত আট্‌কান জ্বর; রক্তা-শায়; শিশুগণের উদরাময়; আক্কেপিক কাশি; বৃকে খিল ধরাইত্যাदि অসুখে ইপিকাকিউএনা ব্যবহার্য ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । অত্যন্ত দুর্বলতা এবং সকল প্রকার আহার জ্ববোই অকচি; সমুদয় প্রকারের অসুখেই বমন বা বমনোদেগ; শরীরের সমুদয় যন্ত্র হইতে রক্তস্রাব; নির্গত রক্ত উজ্জ্বল দীপবর্ণ; শরীর

করিয়া থাকিলে, প্রাতঃকালে, সন্ধ্যার সময়, গায় আত্ম'বাতাস বা দক্ষিণ বাতাস লাগিলে অস্থির বৃদ্ধ ইত্যাদি ইপিফ্যাকউএনার কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত । যে কোন যন্ত্র হইতে ইউক না কেন, রক্তশ্রাবে রক্ত উচ্ছল লাগ বণ ইওয়া ইপিফ্যাকের একটা বিশেষ প্রাকৃতিক নিদ্রিষ্ট লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত ।

সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ । ইপিফ্যাকউএনার কার্যের সঙ্গে আণ্টি-মোনিয়াম টাটারিকাম্ এবং অসিনিকের কার্যের বিশেষ সাদৃশ্য আছে । এতদ্ভিন্ন কোন কোন বিষয় ইঞ্জীর কার্যের সঙ্গে বেলাডোনা, ডাইওনিয়া, ক্যাকেরিয়া কার্জোমিকা, ক্যামোনিয়া, চায়না, কুগ্রাম্, নাক্সবমিকা, কফরাস্, সিপিয়া, সালফার, টেবেকাম্ এবং বিবেরট্রাম্ আল্‌বামের সাদৃশ্য আছে ।

প্রতিষেধক ঔষধ । অ্যাপকা, অ্যাসিনিক্, চায়না, নাক্সবমিকা এবং টেবেকাম্ ইপিফ্যাকউএনার প্রতিষেধক ঔষধ মধ্যে পরিগণিত ।

ডাইলুশন বিচার । ১ম হইতে ৬ষ্ঠ ক্রমট সচরাচর অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে । শিশুগণের চিকিৎসায় ১২ এবং ৩০ ডাইলুশনই লেখক সচরাচর অধিক ব্যবহার করিয়া থাকেন । ইপানি কাশিতে ১ম এবং ৩য় দশমিক ক্রম বিশেষ উপকারী । বায়ুনল প্রদাহ বা শিশুগণের বায়ু উপনল অথবা কৈশিক বায়ুনল প্রদাহ (Capillary-Bronchitis), ১২ ডাইলুশন ব্যবহার করিয়া অধিক বিশেষ ফল পাইয়া থাকেন । শিশুগণের বমন বা বমনোদ্বোগে ৩০ ক্রম ব্যবহারে বিশেষ উপকার দর্শ । কোন কোন চিকিৎসক ১ম এবং ৩য় দশমিক ক্রমের প্রত্যেক মাত্রায় ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল পাইয়া থাকেন । ডাক্তার ডিউক্ বলেন যে সন্মুখ রোগেই ১ম এবং ৩য় দশমিক ক্রমের শুভ্রা এবং ১ম দশমিক ক্রমের আরেক ব্যবহার করিয়া তিন দ্বিগুণ ফল পাইয়া থাকেন ।

ক্যালী বাইক্রমিকাম্,—বাইক্রমেট্ অব্ পটাস্,

—ক্যালী-বাই

(KALI BICHROMICUM,—BICHROMATE OF POTASH,

—KALI BI.)

কোন এক বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয় হইতে আদত বাইক্রমেট্ অব্ পটাস্ ক্রয় করিয়া উহার একভাগ, ২০ ভাগ চূয়ান জল (অর্থাৎ ১ গ্রেইণ্ বাইক্রমেট্ অব্ পটাস্, ২০ ফোঁটা চূয়ান জল একটা ষ্টপার্ড্ (Stoppered) শিশিতে) লইয়া একত্রে মিশাইয়া ইহার আরোক প্রস্তুত করিবে। এই আরোক যে শিশিতে রাখিবে সেই শিশির গায়ে লেবেলের মধ্যে ক্যালী বাইক্রমিকাম্ ২. বলিয়া লিখিতে হইবে। ইহার প্রথম শতভাগিক ক্রম চূয়ান জলে প্রস্তুত হয়; ৫ ভাগ রেকটিকাইড্ স্পিরিট, ৯৫ ভাগ চূয়ান জলে মিশাইয়া উহা দ্বারা যথানিয়মে ৩য় দশমিক হইতে ৩য় শতভাগিক ক্রম পর্য্যন্ত প্রস্তুত করিতে হয়। ৭ম দশমিক এবং ৪র্থ শতভাগিক ক্রমের আরোক যথানিয়মে ডাইলুট্ স্পিরিটে প্রস্তুত হইয়া থাকে। তৎপর সমুদয় ক্রমই রেকটিকাইড্ স্পিরিটে প্রস্তুত হইয়া থাকে। যথানিয়মে অগার অব্ মিঙ্কের সঙ্গে মিশাইয়া ইহার গুঁড়াও প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া।। সমুদয় শৈল্পিক কিল্লীর উপরই ইহার কার্য্য অতি প্রবল। কিন্তু শ্বাস যন্ত্র এবং পরিপাক কার্য্য সম্বন্ধীয় যন্ত্রের শৈল্পিক কিল্লীর উপরই ইহার কার্য্য অধিক প্রবল দেখিতে পাওয়া যায়; জ্বায়ুর শৈল্পিক কিল্লীর উপরও ইহার কার্য্য আছে বটে, কিন্তু শ্বাস যন্ত্রের উপরের কার্য্যের ত্রায় তত প্রবল নহে; ইহা দ্বারা উক্ত শৈল্পিক কিল্লীর শ্লেষ্মা জানিত প্রদাহ উৎপন্ন হইয়া অতিরিক্ত পরিমাণে আটান এবং কঠিন শ্লেষ্মার সঞ্চার হয়। ইহার দরুণ কখন কখন আক্রান্ত স্থানে ক্ষতও হইয়া থাকে এবং শ্বাস যন্ত্রের উপর কখন কখন কৃত্রিম পর্দাও উৎপন্ন হইতে পারে। গ্রাহির উপরও ইহার বিশেষ কার্য্য আছে, বিশেষতঃ যক্ষত এবং মূত্রকোষের উপর। চর্ম্ম এবং শরীরের আঁশাল অংশ এবং উপাঙ্গের উপবর্গ ইহার বিশেষ কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ আনয়ন করিয়া ইহা আক্রান্ত স্থানে ক্ষত উৎপাদন এবং উহার বিনাশও করিতে পারে। আটান কঠিন রসিক

জ্বর প্রেয়া উৎপাদন করা ক্যালী বাইক্লরিকামের একটী বিশেষ প্রকৃতি বা শক্তি মধ্যে পরিগণিত ।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মস্তক । বস অবস্থা হইতে দাঁড়াইলে চর্চাৎ কণ্ঠহারী মাথাধারা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বমনের ইচ্ছা (ব্রাই, সাল্‌ক্‌) ; মাথার গোলমেনে এবং ভারিবেধ ; প্রাতঃকালে ঘুম ভাঙিলেই (নেট্রাম্-নিউর) কপাল এবং মাথার উপরিভাগে বেদনা আরম্ভ হইয়া মাথার পশ্চাৎভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত হয় ; কপালের দুই পার্শ্ব দপ্পলিয়া বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে চক্ষে অন্ধকার দেখা ; এই বেদনা প্রাতঃকালে আরম্ভ হয় এবং বেলা দুই প্রহর পর্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়া সন্ধ্যার সময় ভাগ হয় ; সাদৃশ্যিক শিরঃপীড়া বাহা বাম চক্ষের উপরিভাগেই অধিক অন্তত্ব হই (সাল্‌নিউর) ; মাথার হাড়গুলি টাটায় (মার্ক্‌, নাইট্রিক্‌-অ্যাস্‌, ফস্‌-অ্যাস্‌) ; একখানি পাথরু কদাইয়া রাখিলে বেক্রপ হয়, মাথার উপরিভাগে সেক্রপ চাপা বোধ ।

চক্ষু । চক্ষু প্রদাহচক্ষু ; চক্ষু দিয়া হরিদ্রাবর্ণের ক্লেদ নিঃসরণ এবং প্রাতঃকালে চক্ষুর পাতার পাতায় লাগিয়া থাকা (মার্ক্‌, পাল্‌স্‌, সাল্‌ক্‌) ; চক্ষুর মধ্যে চুলকাণি, উন্মাদভব, জ্বালা এবং চাপাবোধ (একন্‌, মার্ক্‌, সাল্‌ক্‌) ; চক্ষে আলোক সহ্য হয় না, যাহার দরুন চক্ষে আলোক লাগিলে জ্বালা অন্তত্ব হই এবং চক্ষু দিয়া জল পড়ে (অ্যাস্‌) ; চক্ষুর পাতার ধার অত্যন্ত লাল ; চক্ষুর যোজক ঝিল্লী লালবর্ণ এবং চক্ষু দিয়া জল পড়া ; চক্ষুর যোজক ঝিল্লী এবং কর্ণিয়াতে (Cornea) কোকোর জ্বর কুসুদী (মার্ক্‌, নাইট্রিক্‌-অ্যাস্‌, সাইলিনি) ; অনেক কালের কর্ণিয়ার অসচ্ছতা (Opacity of the Cornea) ; চক্ষুর পাতা প্রদাহযুক্ত, ক্ষীত এবং অত্যন্ত জ্বালাযুক্ত ; চক্ষুর পাতার গোপের জ্বর ক্ষীতি ।

কর্ণ । বার কানে স্ফাবিদানের জ্বর প্রবল বেদনা (অ্যাস্‌, সাল্‌ক্‌) বাহা তালু, মাথার পার্শ্ব এবং গ্রীবা পর্যন্ত বিস্তৃত হয় ; কর্ণমূলস্থিত গ্রন্থির ক্ষীতি ; গ্রীবা বেদনাযুক্ত হয় (হিপ্‌-সাল্‌ক্‌, মার্ক্‌) ; কানদ্বারা হরিদ্রাবর্ণের গড়ি পূর্ণ নির্গমন ।

নাসিকা । ছই নাসারক্কে মধ্যবর্তী হাড়ের (Septum) উপর ক্ষত (আলান্, অরাম্, নাইটিক্-আস্); নাসিকার স্নায়িক স্নায়ীর সমুদয় অংশই প্রোহবুক্ত হইয়া উহাতে পূর্ব উৎপন্ন হয় (গ্রাক্, মার্ক্, নাইটিক্-আস্, সাইলিসি); নাসারক্কে মধ্যে কঠিন ডেলার জার পদার্থের স্কার; নাক দিয়া কঠিন রসির জার স্নেয়া নির্গমন (ক্যালী-আয়োড্); অত্যন্ত তরল সন্ধি এবং নাক দিয়া প্রচুর পরিমাণে স্নেয়া নির্গমন, বাহার দরুণ নাক এবং ওষ্ঠে ক্ষত হয় (আস্, সিপ্); নাসিকার অত্যন্ত শুষ্কতা (বেল্, গ্রাক্) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে নাকের হাড় চাপাবোধ; নাক যেন কঠিন এবং শক্ত হইয়াছে এরূপ অনুভূত হয়, বাহার দরুণ রোগী নাক ঝাড়িয়া গাঢ় স্নেয়া ফেলিতে প্রয়াস পায়, কিন্তু নাক ঝাড়িলে কিছুই নির্গত হয় না; কোন একটা ভারি পদার্থ যেন নাকের মধ্য হইতে ঝুলিয়া রহিয়াছে এরূপ অনুভূত হয়; নাকের গোড়ার চাপ পড়া বা চাপিয়া ধবার জার বেদনা বা ব্যতনা (একন্, মার্ক্, আয়োড্, নেটাম্, আস্); নাক ঝাড়িবার সময় নাকের ডাইন পার্শ্বে স্থলীবিধানের জার প্রবল বেদনা বাহার দরুণ মনে হয় যেন ছই খানি শিথিল অস্থিতে অস্থিতে ঘর্ষণ করিতেছে; নাকের মধ্যে টাটানি; নাসারক্কে মধ্যবর্তী হাড়ের উপর চুমটা পড়ে (আলান্, আণ্টি-ক্রুড্, অরাম্, গ্রাক্, নাইটিক্-আস্); নাসিকার অস্থি গোকাব ধরা (Charies); নাকে দুর্গন্ধ ।

মুখমণ্ডল । মুখ মণ্ডল শিটা বা হরিদ্রার আভাযুক্ত; থেঁতুগিয়া গেলে বা মোচড়াইয়া পড়িলে বেক্রপ হয়, মুখমণ্ডলের সমুদয় হাড় সেক্রপ বেদনা বা টাটানি (হিপ্-সালফ্, নাইটিক্-আস্) ।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য । জিহ্বা নিম্নল, লাল এবং ফাটা-যুক্ত (বেল্, রাস্‌টজ্); জিহ্বা শুষ্ক এবং লালবর্ণ (ব্যাপ্ট্); জিহ্বা হরি-দ্রার আভাযুক্ত গাঢ় লেপযুক্ত (পেড্রাক্, মার্ক্, নাস্‌বন্); জিহ্বার ক্ষত (মার্ক্); মুখগহ্বর শুষ্ক (এইলাহ্, আণ্টি-ক্রুড্, আস্, ব্রাই, নাস্‌-মন্, হায়োস্); মুখগহ্বর এবং গলার মধ্যের উপবিভাগে আটাল চট্‌চট্‌টা আঠা লালের স্কার (মার্ক্-কর) । প্রাতঃকালে থুৎ থুৎ করিলেই গলাদিয়া প্রচুর পরিমাণে চট্‌চট্‌টা আঠা স্নেয়া নির্গমন (আলান্, আমন্-কার্ক্); আল্-জিহ্বার গোড়ার গভীর গর্তাবিশিষ্ট লাল মাগে পরিবেষ্টিত হরিদ্রাবর্ণের

চট্‌চট্‌রা আঠা পুঁথারত ক্ষত ; আলজিফ্রা এবং টন্সিল্ (Tonsils) ক্ষীত, লালবর্ণ এবং বেদনায়ুক্ত (বেল্) হইয়া অবশেষে ক্ষত (এপিস্, মার্ক্) এবং উহার চতুর্দিকস্থিত অংশ কাল্‌ডে, নীলের আভাযুক্ত এবং ক্ষীত (এইলাফ্, ব্যাপ্ট্) হয় ; আলজিফ্রার শোথ ; মুখ গহ্বরের পশ্চাৎভাগের দুই পার্শ্বে যেন একগাছি চুল লাগিয়া রহিয়াছে একরূপ অগ্নুভূত হয় ; (জিফ্রায় একরূপ অগ্নুভূত হইলে নেট্রাম্-মিউব্) ; ডেলার জ্বর কোন পদার্থ যেন গলার মধ্যে লাগিয়া রহিয়াছে একরূপ অগ্নুভূত হয়, চোক গিলিলে ও বাহ্য দ্রবীভূত হয় না (ব্যারাইটা-কার্ব্, বেল্, হিপ্-সাল্‌ফ্) ; বাম টন্সিলে খোঁচা বিধায় জ্বর প্রবল বেদনা যাহা কানৈব দিকে বিস্তৃত হয় (বেল্, হিপ্-সাল্‌ফ্) এবং চোকা দি গিলিলে বাহার উপশম হয় ; মুখগহ্বরের পশ্চাৎভাগ, টন্সিল্, কোমল ভাস্ক্য (Soft palate) এবং স্বাস যন্ত্রের স্লেষ্মক কিল্লীর উপর ক্রান্তি পদ্ধতির জ্বাৰ আশাল দানাত্ত পক্ষা পড়ে ।

পাকস্থলী এবং উদর । সম্পূর্ণ ক্ষয়শূন্যতা (অ্যুলাম্, অ্যাম্, চায়না, নেট্রাম্-মিউব্, সাল্‌ফ্), অত্যন্ত পিপাসা এবং টক স্বাদ বিশিষ্ট জ্বাৰ পানের অত্যন্ত ইচ্ছা (চায়না, হিপ্-সাল্‌ফ্) ; হঠাৎ বমনোদ্বেগ ; গোলমপী রক্তের জ্বাৰে পাতলা চক্‌চকে পদার্থবমন ; টক স্বাদ বিশিষ্ট উদরস্থ অঙ্গণে জ্বাৰে জ্বাৰে কথ্য মগ্নিত পদার্থ বা পিত্ত বা রক্ত বমন, বা আহারের পরকণ্ঠে পাকস্থলীতে জ্বাৰ এবং চাপিবোধ (ব্রাই, নাক্স-বন্, পাল্‌ম্) ; পাকস্থলীতে অম্ল বা বেদনাগ্ৰস্ত এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গ প্রত্যঙ্গে পর্যায়ক্রমে বেদনা ; অঙ্গ প্রত্যঙ্গে বেদনা হওয়ার সময় বমনাদির উদ্বেগ হয় ; পাকস্থলী ক্ষীত এবং উচ্চাতে পূর্ণবোধ, বাহার মজ্জা কোমবে কাপড় পরিতে কষ্টাশ্রুত হয় । উদরের ডাইন অংশে স্ফীতি বিধানের জ্বাৰ বেদনা (ব্রাই, ক্যালী-কার্ব্) ; স্রীহার স্থানে স্ফীতি বিধানের জ্বাৰ বেদনা (ব্রাই, ক্যালী-কার্ব্) ; উদরের নধা দিবা স্ফীতি বিধানের জ্বাৰ বেদনা বা যাতনা, যাহা কয়েককাল পর্যন্ত বিস্তৃত হয় ; উদর ক্ষীত এবং শিথিল হয় ; বহুত প্রদেশে চাপিয়া দিয়া বা স্ফীতি বিধানের জ্বাৰ মূলপূর্বে বেদনা ; আহারের কতকক্ষণ পরে উদরে কষ্টনবৎ বেদনা ; অস্ত্র মধ্য পুরাতন আকারের ক্ষত ।

মল । আমাশয় ; কটাবর্ণের জল (আস্, কয়েজ্), অথবা রক্ত-মিশ্রিত মলত্যাগ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গুহ্বদ্বারে কষ্টদায়ক চাপাবোধ, বাহ্যের বেগ এবং কৌথপাড়া ; প্রত্যেক বৎসর কোন এক নির্দিষ্ট সময়ে আমাশয় ; কোষ্ঠবদ্ধ, মল পরিমাণে অধিক, ডেলার ছায় গুটলী গুটলী এবং মলজ্যেগের পর গুহ্বদ্বারে জ্বালা এবং চাপাবোধ ; প্রাতঃকালে উদরাময় এবং বাহ্যের বেগের দরুণ ঘুম ভাঙ্গিয়া যায় ; ভিজা গাঁদের ছায় রক্তমিশ্রিত মলত্যাগ ; ডেলার ছায় কোন পদার্থ চাপিয়া থাকিলে বেক্রপ হয়, গুহ্বদ্বারে সেক্রপ অস্বভূত হয় ।

মূত্রযন্ত্র । মূত্র লালবর্ণ এবং পরিমাণে অল্প ও উহার সঙ্গে সঙ্গে পৃষ্ঠদেশের মধ্য দিয়া আড়াআড়ি বেদনা ; মূত্র পরিমাণে অল্প এবং মূত্রে প্রচুর পরিমাণে সাদাটিয়া বা শ্বেয়া তলানি পড়ে ; মূত্রাবরোধ এবং তদ্রূপ মস্তিষ্কের বিকৃতাবস্থার লক্ষণ । ওলাউঠা রোগের মূত্রাবরোধে ক্যান্থারিস্, টিরিবিখিনা দ্বারী প্রস্রাব না হইলে এই ঔষধের ২।৩ মাত্রা সেবনে প্রস্রাব হইতে দেখা যায় ।

জননেন্দ্রিয় । পুরুষের স্ত্রীসহবাসের ইচ্ছা থাকে না, পুরুষাদে গৰ্ভ-মীর ব্যারামের দরুণ গভীর ঘা ; চলিবার সময় পুরুষাদে গোড়ার মধ্য প্রদেশে স্ফটীবিধানের ছায় বেদনা, দাহার দরুণ রোগী স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে বাধ্য হয় ; মলত্যাগের সময় ধাতুনির্গমন ; পুতান আকারের প্রমেহ রোগ এবং তদ্রূপ মূত্রনাশী দিয়া রাসের ছায় বা ভিজা গাঁদের ছায় প্রচুর স্রব নিগমন । স্ত্রীলোকের নিরামিত সময়ের অনেক পূর্বে রজঃস্রাব এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মাথাঘোরা, বমনোদ্বেগ এবং শিরঃপীড়া ; হরিদ্রা রক্তের ষেতপ্রদর (হাইড্রাস্টিস্) এবং উহার দরুণ যোনিদ্বারাদিতে চুলকানি, জ্বালাস্বভব, কোমরের পশ্চাত্তাগের মধ্য দিয়া বেদনা, দুগ্ধলবোধ এবং তলপেটে ভারি ও ঘৃণ্ণ-ঘৃণে বেদনাস্বভব ।

শ্বাসযন্ত্র । স্বরভঙ্গ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠনালীতে প্রচুর পরিমাণ শ্বেয়ার সঞ্চার (কয়েজ্, নাধু কাশ্) ; প্রাতঃকালে স্বরভঙ্গ ; সন্ধ্যার সময় স্বরভঙ্গ (ক্যাক্-কার্স্, কাকো-বেজ্, ল্যাক্) ; স্বরভঙ্গ এবং কঁকশ স্বর (কার্সো-বেজ্) ; চাপিয়া থাকিলে বেক্রপ হয়, বুকের মধ্যে সেক্রপ হওয়ার

সঙ্গে সঙ্গে কাশি এবং গলা দিয়া হরিত্রাবর্ণের বা হরিত্রার আভ্যন্তরীণ সবুজ বর্ণের কঠিন পদার্থ নির্গমন; গলা দিয়া কঠিন শ্লেষ্মা নির্গমন (ফস্), এই শ্লেষ্মা এত আঁটাল যে উহা টানিলে একগাছি রসির জায় লগা হয়; স্বরভঙ্গ, কর্কশ স্বর এবং ধাতুর ধ্বনিবিশিষ্ট কাশি; গলার মধ্যে কৃত্রিম পর্দার জায় শ্লেষ্মার সঞ্চায় যাহা সহজে নির্গত হয় না (ব্রোমিন্, আরোড্) এবং গলা দিয়া রসির জায় শ্লেষ্মা নির্গমন; কাশিতে কাশিতে গলা দিয়া স্থিতিস্থাপকগুণ বিশিষ্ট ফাটব্রিনের জায় (Fibrinous) পদার্থ নির্গমন; বুকের মধ্যে শ্লেষ্মার প্রবল সাঁই সাঁই শব্দ হয়; ঘূমের অবস্থায় বুকের মধ্যে শ্লেষ্মার সাঁই সাঁই ঘড়্ ঘড়্ শব্দ হয়; শ্বাস কষ্ট; বুকে সাঁই সাঁই শব্দ এবং হাঁপানি ও উহার সঙ্গে সঙ্গে বায়ুনলের দুই শাখার সংযোগ স্থানে (Bifurcation of the Bronchia) আঁটা বোধ, যাহার দক্ষণ মনে হয় যেন শৈল্পিক কিল্লী পুক হইয়াছে; গায়ের কাপড় ছাড়িলে, প্রাতঃকালে ঘুম ভাঙ্গিলে, আহা-রের পর এবং দীর্ঘ নিশ্বাস টানিলে কাশির বৃদ্ধি, এবং শব্দন করিলে, বিছা-নার উত্তাপে কাশির উপশম; কঠিনালীতে হুড়্-হুড়ী; প্রত্যেকবার নিশ্বাস টানিবার সময় কাশির উদ্ভেক। কংগ্রদেলে কুট্-কুটানি বিশিষ্ট বাতনা।

পৃষ্ঠদেশ। কোমরের পশ্চাৎভাগে বেদনা যাহা প্রাতঃকালেই অধিক অনুভূত হয়; বসিলে শুষ্ক দ্বারের ঠিক উপরিভাগের অস্থিতে বেদনা।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, হাত, পা ইত্যাদি। অঙ্গ প্রত্যঙ্গে বাতের বেদ-নার জায় বেদনা; মোচড়াইয়া পড়িলে বা ধেঁলিয়া গেলে বেক্রপ হয়, চাপিলে হাতের কাছে সেরূপ বেদনা; হাতের আঙ্গুলে ক্ষত এবং অস্থি পোকায় ধরা; বামস্ত্রীকায়ের নিম্নকোণে স্থলীবিধানের জায় বেদনা; সন্ধিতে, বিশেষতঃ মণিবন্ধে, বাতের বেদনার জায় বেদনা; বাম সায়েটিক্ ন্নায়ুর (Left Sciatic nerve) গতি দিয়া বারম্বার বা আগা গোড়া (অর্থাৎ কুচকির পশ্চাৎভাগ হইতে পায়ের ডিম পর্য্যন্ত) বেদনা; ন্নায়ুর উপর চাপ পড়িলে পায়ের স্মৃদয় অংশে বোঁচা বিধার জায় বেদনার উদ্ভেক হয়; ডাইন পায়ের টিবিয়া (Tibia) নামক অস্থিতে ধেঁলিয়া যাওয়ার জায় বেদনা; চলিবার সময় পায়ের গোড়ালীতে (শুড়মুড়াতে) টাটানি; প্রদাহযুক্ত পায়ের পাতায় ক্ষত হওয়া; সামান্য সঞ্চালনে সন্ধিতে কেড়্-কেড়্ শব্দ হয়; পায় ভারিবোধ।

চন্দ্র । শরীরে, বিশেষতঃ হাতের উপর, হাম বা ঘামাচির জ্বাৰ গোটা গোটা ফুসুড়ী ; গায়ে অসম্ভব আকড়ু খাবড়ু ধার বিশিষ্ট গভীর ক্ষত ; শীতকালে গায় বা অধিক বেদনায়ুক্ত চৰ্ম ; গায় বসন্তের জ্বাৰ কোঁকায় আঁকার বিশিষ্ট ফুসুড়ী ; গায় পুঁথ সম্বলিত দাদের জ্বাৰ ফুসুড়ী । চন্দ্র উষ্ণ, শুষ্ক এবং লালবর্ণ ।

জ্বর । গা ভাঙ্গা এবং হাইতোলার অত্যন্ত ইচ্ছা ; শীত এবং উষ্ণের সঙ্গে সঙ্গে আত্যাধোরা এবং বমনোদেগ, তৎপর উচ্চাশ্বত্ব, উষ্ণের সঙ্গে সঙ্গে কপালের পার্শ্বে ঠাণ্ডা এবং খোঁচা বিঁধার জ্বাৰ বেদনা বা যাতনা, পিপাসা থাকে না, শীত পায়ের পাতা হইতে আরম্ভ হইয়া শরীরের উর্দ্ধদিকে বিস্তৃত হয়, বাহ্যিক দরুণ রোগী উষ্ণ স্থানে থাকিতে চাহে ; (আস্. হিপ্পোক্ৰ., রাস্ট্র.) ; শরীরের উত্তাপের সঙ্গে সঙ্গে সমুদয় শরীরে পর্যায়ক্রমে ঘর্ষ ; প্রথম রাত্রিতে অর ।

ব্যবহার্য্য । সকল প্রকারের শ্লেষ্মা জনিত অশ্বথ ; নাসিকা, সম্বন্ধীয় সর্দি ; বায়ুনলের শ্লেষ্মা জনিত অশ্বথ ; সপর্দা মূণ্ডীকাশি (Membranous Croup) ; ডিপ্‌থিরিয়া ; উদরাময় ; খেতপ্রদর ; গণ্ডমালা জনিত অশ্বথ ; চক্ষু প্রদাহ ; পুরাতন ক্ত ; গরমীর ঘা ; বাত রোগ ; অজীর্ণ রোগ ; পিত্তাধিক্য হেতু অশ্বথ ; মূত্র ক্লম্ব বা মূত্রাবরোধ (গলাউঠার মূত্রাবরোধে বিশেষ উপকারী) ; আসিনিকের ধূম টানিয়া অশ্বথ ; পারার, বিশেষতঃ বিন্‌ আয়োডাইড্ অব্‌ মার্কিউরির, অপব্যবহার জনিত অশ্বথ ; নাসারন্ধ্রের মধ্যস্থিত উপস্থির ক্ষয় ; শ্বাস যন্ত্রের শৈথিল্য বিস্তার পুরাতন আকারের অশ্বথ ; যকৃত প্রদাহ ইত্যাদি অশ্বথে ক্যালী বাইক্রমিকাম্ ব্যবহার্য্য ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । মোটা, গণ্ডমালা এবং গরমীর ব্যাধি-মের ধাতু ; নাক, মুখ, গলার মধ্য, পাকস্থলী, মূত্রনালী এবং বোনিদ্বার দিয়া রসির জ্বাৰ পদার্থ বা শ্লেষ্মা নির্গমন ; প্রতিদিন প্রাতঃকালে একই নির্দিষ্ট সময়ে শিরঃস্ৰাব ; বেদনা একস্থান হইতে অন্তস্থানে হঠাৎ সরিয়া পড়ে ; লক্ষণাদি হঠাৎ উপস্থিত হয় এবং হঠাৎ যায় ; মোচড়াইয়া পড়িলে বেক্রম হয় অস্থিতে সেক্রম অর্জিত হয় ; অস্থি পোকায় ধরা (Caries) ; শৈথিল্য বিস্তার মধ্য ডিপ্‌থিরিয়ার জ্বাৰ পর্দা উৎপন্ন হয় ; অত্যন্ত বলক্ষয় ; •

প্রাতঃকালে, ঠাণ্ডা লাগিলে, আগারের পর অস্থখের বৃদ্ধি এবং উঠাপে ও শেষ বেলায় অস্থখের উপশম ইত্যাদি ক্যালী বাইক্রমিকামের কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ। সাধারণতঃ হিপার সারুকার, ক্যালী-আয়োডেটাম্ এবং সৰুপ্রকারে প্রস্তুত করা পারাব কার্ণোর সঙ্গে ক্যালী-বাইক্রমিকামের কার্ণোর সাদৃশ্য আছে। শৈল্পিক কিল্লী এবং চর্শের উপর ইহার কার্য আনিনিক এবং টাটার এনিটিকের তায়। কঠনালী এবং বাহুল্যের উপর ইহার কার্য স্পঞ্জিয়া, আয়োডিন্ এবং ব্রোমিনের তায়; যকৃতের উপর ইহার কার্য মার্কিউবায়নের তায়; অস্থির আবরণ পদার (Periosteum) উপর ইহার কার্য মেডিবিরাম্ এবং ফাইটোলাকাদ তায়। এতদ্বির ইহার কার্ণোর সঙ্গে আর্টমোনিয়াম্ কুডাম, ল্যাকোসিস, নাইট্রিক্ অসিড্, পাল্‌নেটীলা এবং সাইনিমিয়াব কার্ণোর সাদৃশ্য আছে।

প্রতিষেধক ঔষধ। আনিনিক, ল্যাকোসিস, পাল্‌নেটীলা, ক্যালী-বাইক্রমিকামের প্রতিষেধক ঔষধ মধ্যে পরিগণিত।

ডাইলুশন বিচার। ৩৫ এবং ৬৪ ক্রমই সচবাচর অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার ১০ এবং ৩০ ক্রমও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ডাক্তার হিউজ বলেন বায়ু প্রয়োগার্থ অনেক বাইক্রমেট্ অব্ পটাসের ১ গ্রেইন্. ৮ আউন্স্ জলে মিশাইলে সকল প্রকারের কার্যই চলে।

ল্যাকোসিস,—ল্যাক্।

(LACHESIS.—LACH.)

লক্ষিক আমেরিকাতে এক প্রকার কৃক এবং সৰু মস্কক বিশিষ্ট মৰ্প জন্তে। ভৌগোল্যবস্তুর ইহার বিষ লটরা সুগার অব্ মিকেল সঙ্গে মিশাইয়া যথানিয়মে ১ম, ২য় এবং ৩য় শতভাগিক বা ৬৪ দশমিক ক্রমের গুঁড়া প্রস্তুত হইয়া থাকে। ৩য় শতভাগিক বা ৬৪ দশমিক ক্রমের গুঁড়া চটতে যথা নিয়মে ১ ইহার ৪র্থ শতভাগিক ক্রমের আনোক প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া । মস্তিষ্ক এবং কমেসুরুকা মজ্জা সম্বন্ধীয় স্নায়ু মণ্ডলের উপর ইহার সাধারণ কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায় । তন্মধ্যে নিউমোগ্যাস্ট্রিক্ স্নায়ুর (Pneumogastric nerve) উপর ইহার কার্য্য অত্যন্ত প্রবল । ইহা দ্বারা মস্তিষ্ক বিমুক্ত হইয়া বলক্ষয়, আক্ষেপ এবং অচেতনতা উৎপন্ন হয় এবং নিউমোগ্যাস্ট্রিক্ স্নায়ু আক্রান্ত হওয়ার দরুন গলার মধ্য, কণ্ঠনালী, বায়ুনল এবং অংপিণ্ড উত্তেজিত অবস্থা প্রাপ্ত হয়, অথচ উক্ত যন্ত্রাদির প্রকৃত প্রদাহ উৎপন্ন হয় না । তৎপন্ন রক্তের সঙ্গে মিশ্রিত হওয়ার দরুন রক্ত পচিয়া রক্তের কাইব্রিন (Fibrine) নামক পদার্থ বিনষ্ট হয় এবং তদরুন শরীরের স্থানে স্থানে লোমছা ঘাইয়া উঠাতে রক্ত সঞ্চিত, বক্তস্রাব, বলক্ষয় কারক প্রদাহ, কোড়া, সাংঘাতিক প্রদাহ, পচাবৃত্ত ঘা (Gangrene), পূর্ব দ্বারা রক্ত বিবাক্ত হওয়ার দরুন অম্ম (Pyæmia) উৎপন্ন হইয়া বিকারের লক্ষণাদি প্রকাশ পায় । ঘূমের পর সমুদয় লক্ষণ বা উপভবের বৃদ্ধি করা ল্যাকেসিসের এক বিশেষ প্রকৃতি বা শক্তি মধ্যে পরিগণিত ।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মন । দুঃখিত হওয়ার স্বভাব (নাইট্রিক্-অ্যাস্, পাল্‌স্, সিপিয়া) ; মনের জড়তা ; কোন বিষয়ে চিন্তা করিতে অশক্তি ; স্মরণশক্তির দুর্বলতা বা ভ্রাস (আগারিকাশ্, অ্যাস্‌য়া, আনাক্‌ড, ক্রিয়াজ্, মার্‌, নেট্রাম্-মিউর, নাক্স্, ফন্‌-অ্যাস্) ; বর্ণ বিনাশেও ভুল হব (লাইকোপ্) ; মনের অতিরিক্ত প্রাধৰ্থ্য (কাকিয়া, চাৰ্‌না) ; না না বিষয়ে চিন্তা ; অনবরত এক বিষয় হঠাৎ পরিত্যাগ করিয়া অন্য বিষয়ে চিন্তা (সিপিয়া) এবং না না প্রকারের ভয় উৎপাদক ছবি দেখা (হায়োস্) ; প্রাতঃকালে ঘুম ভাঙ্গিলেই মনের মালিন্য এবং চিন্তা (নেট্রাম্-মিউর) ; অতিরিক্ত পাঠের পর উন্মত্ততা ; অহঙ্কার (প্লাটিনা, ট্রান্স্) ; অস্ত্রের সূখে কাতর (এপিস্, হায়োস্) ; সর্বদা সন্দেহ করা ; রোগী (দ্বীলোক) মনে করে ঈশ্বর ব্যতীত তাহার উপর মনুষ্যের কোনও ক্ষমতা নাই ।

মস্তক । প্রাতঃকালে ঘুম ভাঙ্গিলেই মাথাঘোরা (আলাম্, ফস্, নাইট্রিক্-অ্যাস্) ; চক্ষু বৃদ্ধিলে ঞ্গণিক মাথা ঘোরা (থুজা) ; মাথা বেদনা,

যাহা নাসিকার মূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় (মার্ক্-আয়োড্); চাপিয়া ধরার জ্বাৰ মাথা বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বমনোদ্বেষ; কপালের বামপার্শ্বের উচুস্থানে বেদনা যাহা মধ্যদেশ পর্য্যন্ত অন্বেষ্য হয়; প্রত্যহ প্রাতঃকালে উঠিলেই চক্ষুর উপরিভাগ এবং মাথার পশ্চাৎভাগে বেদনা; একপ্লেথ অবল মাথা বেদনা যাহা স্বল্প পর্য্যন্তও বিস্তৃত হয়; শক্ত গ্রীবা বা গ্রীবা নোয়ান যায় না (রাস্টক্স্); জিহবার পক্ষাঘাত; মাথার পার্শ্ব এবং কর্ণের পশ্চাৎভাগে ফাটিয়া যাওয়ার জ্বাৰ বেদনা; শয়ন করিয়া থাকিলে যাহার উপশম হয়; মাথার পশ্চাৎভাগে একখানি সীসা বসাইয়া রাখার জ্বাৰ জ্বরির বোধ (কার্বো বেক্, চেলিডন্), যাহার দূরণ রোগী তাহার মাথা বালিস হইতে কদাচিত উঠাইতে পারে এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মাথাঘোরা; স্পর্শ করিলে অথবা পেশী সকলনের সমর মাথার বাম পার্শ্বে অবলবোধ এবং কোন প্রাণী হামা দেওয়াব জ্বাৰ হৃৎকড়ী; মাথার চুল পড়িয়া যায় (গ্রোফ্, মার্ক্-নাইট্রিক্-অ্যাস, কন্, সিপিগা, মাল্ক্). গভীরস্থায় যাহার বন্ধি হয়; স্থায়ের উদ্ভাপে অত্যন্ত বৈরক্তি (বেল্, মেনয়েন্, নেট্রিন্ কার্ক্)।

চক্ষু। চক্ষে বাপ্সা দেখা; চক্ষুর সমুখে কোন একটী কাল বস্ত্র বদ্ধ করিতেছে একরূপ অন্বেষ্য হয়; চক্ষুর সমুখে যেন কুয়াশা রহিয়াছে একরূপ অন্বেষ্য হয় (ক্যালো আয়োড্, মার্ক্, পাল্, মাল্ক্); আলোক যেন আগুনের রাশি পূর্ণ উজ্জ্বল নীলবর্ণের চক্ৰবর্তী পরিবেষ্টিত চক্ষে একরূপ দৃষ্ট হয়; চক্ষে একা বাকা চিত্র বা মূর্তি দেখা; চক্ষের মধ্য এবং উহার উপরিভাগে কসিয়া বা বাউয়া দবার জ্বাৰ বেদনা বা যাতনা; সংজ্ঞাশ রোগের পর চক্ষুর রেটিনার প্রদাহ (Retinitis); দৃষ্টি ধীনতা (Amblyopia) এবং উভাব সঙ্গে সঙ্গে কুক্ষন্ এবং অসংপূর্ণের অন্বেষ্য।

কর্ণ। কানের মধ্যে বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গলার মধ্যে বেদনা; টাটানি; গালের ভাড হইতে কান পর্য্যন্ত ছিড়িয়া ফেলার জ্বাৰ বেদনা; কোন প্রকার কীট প্রবেশ করিলে বেজপ হয়, কানের মধ্যে নেক্রপ বদ্ধ, ফড়, সোঁট সোঁট শব্দ শুণ্য।

নাসিকা। শব্দির আক্রমণের পূর্বে নাপাথরা (হাইড্রাইট্); নাক দিয়া অগবৎ তরল স্বেদা নির্গমন এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে নাসারন্ধ্র লালবর্ণ

এবং ক্ষতযুক্ত হওয়া ; নাকের মধ্যে ক্ষত এবং উহাতে খোসা (চুমটী) পড়া ; থাকিয়া থাকিয়া সময়ে সময়ে এক সঙ্গে অনেকগুলি হাঁচি ।

মুখ মণ্ডল । মুখমণ্ডল শিটা বা ফিকা ; মুখমণ্ডল মাটির জায় ধূসর বর্ণ (আস্) ; মুখমণ্ডলের বিসর্পের জায় (Erysipelatous) ক্ষীতি (বেল্, গ্রাফ, হিপ্প-সাল্‌ফ, রাস্টক্স) ; শিটা মুখমণ্ডলও উষ্ণ এবং লালবর্ণ হয় ; মুখমণ্ডলের বাম পার্শ্ব এবং চক্ষুর কোটরস্থ স্নায়ুশূল ; মুখমণ্ডলে উষ্ণতা আরম্ভ হইয়া উপরের দিকে মাথা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় ; গালের মেলার অস্থিতে (Malar-bone) শক্ত বোধ বাহ্য গ্রীবা দেশস্থিত গ্রন্থি হইতে আরম্ভ হয় ; মুখমণ্ডলের চুলকানি ।

মুখ গহ্বর এবং গলার মধ্য । দাঁতের গোড়ায় ছিড়িয়া ফেলা, চিড়িকমারা বা কসিয়া ধরার জায় বেদনা বা যাতনা (পাল্‌স্), যাতা অনেক সময় মাড়ি হইতে কান পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় ; কোন নির্দিষ্ট সময়ে দাঁতে বেদনা ; ঘুম তাঁহাতেই দাঁতে বেদনা ; আহারের পর দাঁতে বেদনা (আন্টি-ফুড্, ষ্টাফিস্, নাক্স-বম) ; গব্য এবং ঠাণ্ডা দ্রব্য পান করিলে দাঁতে বেদনা ; জিহ্বা শুষ্ক, লালবর্ণ, কাল, শক্ত এবং কাটাবুজ (বাপ্ট্, বেল্, নেজা, রাস্টক্স) ; কথা বলিতে কষ্টানুভব ; জিহ্বা ভারি (মিউই-আস্) ; মুখ মেলিতে বা হা করিতে অশক্তি , জিহ্বা বাহির করার সময় জিহ্বা কাণে অথবা উহা দাঁতের পশ্চাৎ দিকে বেন আটকিয়া থাকে ; মুখের মধ্য শুষ্ক, উষ্ণ এবং ক্ষতযুক্ত এবং উহাতে টাটানি বা চড়্‌চড়ানি (বোরাক্স্, হাইড্রাষ্ট্, মার্ক্, আরোড্) ; জিহ্বার প্রদাহ ; টনসিল্ প্রদাহ এবং উহাতে পূর্ণ উৎপন্ন হওয়ার উপক্রম হওয়া ; প্রদাহযুক্ত টনসিল্ এবং গলার মধ্যে ক্ষত ; সাংঘাতিক আকারের ডিপথিরিয়া ; গলার মধ্যের অসুখ বাম দিক হইতে আৰম্ভ হয় ; গিলিতে অত্যন্ত কষ্টানুভব ; তরল দ্রব্য গিলিবার সময় নাক দিয়া বাহির হইয়া পড়ে ; থক্ থক্ করিলেই গলা দিয়া স্লেমা নির্গত হয় এবং গলার মধ্যে ছাল উঠিয়া যওয়ার জায় যাতনা অনুভূত হয় ; গলার মধ্যে শুষ্কানুভব, কিন্তু পিপাসা থাকে না (এপিস্, নাক্স-মক্স, পাল্‌স্) ; গলার মধ্য ক্ষীত হওয়ার জায় অনুভূত হয় এবং ঢোক গিলিবার সময় মনে হয় বেন গলার মধ্যে দুইটা ডেলার জায় বড় পদার্থ একত্রিত হইয়া টেলিয়া আসি-

ভেছে; আহার দ্রব্যাদি গিলিবার সময় উক্ত অস্থির উপশম; গলার মধ্যে যেন রুটীর এক টুকরা লাগিয়া রহিয়াছে এরূপ অনুভূত হয়; টেন্সিও প্রদাহ বাহা বাম দিকে অধিক অনুভূত হয়; গিলিবার সময় গলনালী যেন রুদ্ধ হইয়া যায় এবং তদনুগত অত্যন্ত যাতনা, অথবা গিলিবার সময় গলার মধ্যে হইতে কান পর্য্যন্ত উক্ত যাতনা বিস্তৃত হয় (আইয়া, বেল, কালী-বাই, হিপ-সাল্ফ); স্পর্শনে গ্রীবা অত্যন্ত টাটায় বা বেদনামুক্ত হয় (এপিস); গলার মধ্যে বেদনা এবং টাটানি বাহা বাম দিক হইতে আরম্ভ হয়, কঠিন পদার্থ অপেক্ষা তরল পদার্থ গিলিতে অধিক কষ্টানুভূত হয় (বেল); স্পর্শনে গলার মধ্যের বহির্দেশে অত্যন্ত অসুখ বোধ হয় (বেদনামুক্ত হয় না, বা টাটায় না)।

পাকস্থলী এবং উদর । ক্ষুধার অবস্থা সকল সময়ে এক প্রকার থাকে না,—অর্থাৎ কখন অত্যন্ত ক্ষুধা হয়, কখন বা ক্ষুধা একবারেই থাকে না; মুখে তিক্ত স্বাদ; আহারের পর উদরস্থ অজীর্ণ আহারদ্রব্যাদি বমন; আহারের পর গলা দিয়া টক জল উঠা; বমন এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে উদরানয়; অজীর্ণ, আহারের পর বাতর বৃদ্ধি হয় (চায়না, নাগ্-বম, পাল্‌স); পাকস্থলীতে চর্ষণবৎ যাতনা অনুভূত হয় বাহা আহারের পরই কমে এবং পেট খালি হইলে পুনরায় আরম্ভ হয়; কোমরে কাপড় কসিয়া পরিলে অত্যন্ত অসুখ বোধ (ব্রাই, ক্যাক্স-কাল, ফোটন্)। উদরের ডাউন পাশে ছিড়িয়া ফেলার ভায় বা কর্তনবৎ বেদনা; উদর স্ফীত, বিস্তৃত ও কঠিন, উষ্ণ, টাটানি, এবং বেদনামুক্ত (একন্, বেল); শুষ্কবৎ হইতে নাতি পর্য্যন্ত কসিয়া বা নাড়িয়া ধরা; উদরে খালি বোধ; ক্ষত হইলে যেরূপ হয়, যক্‌ৎ প্রদেশে সেরূপ বেদনা বা যাতনা; দক্ষতের প্রদাহ এবং উহাতে কোড়া হওয়া; রক্ত অস্ত্রের ইলিয়াম্ (Ilium) নামক অংশ যে স্থানে শেষ হইয়াছে (Caecum), উক্ত প্রদেশের স্ফীতি, বাতর দ্রবণ রোগী চীত ভাবে জড়সড় হইয়া শয়ন করিয়া থাকিতে বাধ্য হয়; অস্ত্রের কোলন (Colon) নামক অংশের প্রদাহ; উদর গরম এবং টাটানিমুক্ত এবং কোমর হইতে উরুদেশ পর্য্যন্ত শক্ত হয়; অস্বাভাবিক কিম্বী প্রদাহ (Peritonitis) এবং অস্বাভাবিক কিনীর মধ্যে পূর্ব হইয়া উহার প্রদাহ (Septic Peritonitis)।

মল এবং মলদ্বার । মলত্যাগের সময় এবং উহার পর গুহদ্বারে আলানুভব (আস্, কাস্, মার্ক্, নেট্রাম্ মিউর, সাল্ফ্); গুহ এবং গুহদ্বারের সংকোচন; গুহ দ্বাবে একটী ক্ষুদ্র ছাত্তা দিয়া পিটানের স্থায় দপ্প-দপ্পানি বা চিড়িকমাঝা; গুহ দ্বাবে অনবদ্য কষ্টদায়ক শূলানী বা টাটানি; মল হর্গক্লুজ্, কাল্চে (আস্); অনিবাধ্য কোষ্ঠবদ্ধ (আলাম্, প্রাথম্, নাক্স-বন্, ওপিয়াম্); অর্শরোগ এবং তদ্রূপ গুহদ্বারে বলী বাহির হওয়া, (আলোজ্, ক্যাক্স-কার্ক্, পাল্ফ, মিউব-আস্); প্রত্যেকবার হাঁচি দেওয়া বা কাশির সময় অর্শের বলীতে স্ফটাবিধানের স্থায় অন্তত্ব হব; পুরাতন আকারের কোষ্ঠবদ্ধ এবং মল ভেড়ার মলের স্থায় কঠিন; পুরাতন উদরাময়, প্রধানতঃ সন্ধান সময় এবং রাত্রিতে; পর্যায়ক্রমে কোষ্ঠবদ্ধ এবং উদরাময়; গুহদ্বার দিয়া অত্যন্ত হর্গক্লুজ্ পূর্ব রক্ত নির্গমন ।

মূত্রযন্ত্র — বারিষাব মূত্র ত্যাগ : মূত্র ফেরাক্লুজ্, কাল্চে; মূত্রাধারে চাপাবোধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বারিষাব মূত্রত্যাগের ইচ্ছা; মূত্রনালীর সমুখ ভাগে কসিয়া ধরার স্থায় বা কঠিনবৎ বেদনা এবং উহাতে চড়্-চড়্ করা; প্রসাৰেব বেগ হয় বটে, কিন্তু বেগ দিলে মূত্র নির্গত হয় না । মূত্রকোষ প্রদেশে স্ফটাবিধানের স্থায় যাতনা অন্তত্ব হব; জ্বরাক্রান্তের স্থায় হরিদ্রাবর্ণের মূত্রত্যাগ; মূত্র কাল্চে এবং ঘোলাটারা; একটী গোলা চাপিয়া থাকিলে যেরূপ হয়, মূত্রাধারে সেরূপ যাতনা অন্তত্ব হব ।

জননেদ্রিয় । স্ত্রীলোকের অল্পকাল স্থায়ী বজ্র রজঃস্রাব, কিন্তু প্রতি মাসেই নিয়মিত সময়ে বজ্রঃস্রাব হয়, রক্ত কাল্চে; রজঃস্রাবের সময় প্রসব বেদনার ন্যায় বেদনা (কলোফিল্, সিমিসিফ্, পাল্ফ); জ্বায়ু এবং ডিম্বকোষে বেদনা, বক্ত্রঃস্রাবের পথ যাহার উপশম হয়; একখানি ছুতী বিধাইয়া দিলে যেরূপ হয়, উদরের মধ্যে সেরূপ বেদনা; রজঃস্রাবের পূর্বে মাথাঘোরা এবং শিরঃপীড়া; জ্বায়ু প্রদেশ এত টাটায় বা বেদনাবুক্ত হয় যে, উহাতে গায়ের কাপড়ের ভারও সহ্য হয় না; বার ডিম্বকোষ স্ফীত এবং উহাতে চাপিয়া ধরা বা স্ফটাবিধানের স্থায় বেদনা বা যাতনা; সমুদয় শরীরেই উচ্ছাত্তব; জ্বায়ু হইতে অতিরিক্ত রক্তস্রাব (Metrorrhagia),

এবং রক্তঃস্রাব শেষ বদ্ধ হওয়ার সময় অজ্ঞাত যে কোন অস্থিত হউক না কেন (সাসুনেরিয়া) ।

শ্বাসযন্ত্র । স্বরভঙ্গ এবং কণ্ঠনালীতে ছাল উদ্ভিগা যাওয়া বা টাঁচিয়া ফেলার জ্বায যাতনা এবং শুকানুভব (একন্, কষ্ট, কাম্, কন্) যাহার দ্বারা রোগী গলাস্পর্শ করিলেও কষ্ট অনুভব করে (একন্, স্পষ্ট) ; গলা হইতে কোন পদার্থ উঠাৎ কণ্ঠনালীতে ঢুকিয়া যেন শ্বাস বোধ কবিতা রোগীর শ্বাস ভাঙ্গিয়া ফেলে এবং তদ্রূপ বায়ুনের উপরিভাগের সরু মুখে আক্ষেপের উদ্বেগ হয় ; কণ্ঠনালী এত বেদনাক্রান্ত হয় বা টাঁচিয়া যে, উহার দ্রুপ রোগীর গলার চতুর্দিকে কাপড়াদি চাপও সহ হয় না (এপিস্) ; কাশি ; ঘূমের পর কাশির বৃদ্ধি ; কণ্ঠনালীতে চাপ পড়িয়া কাশির উদ্বেগ ; শুক গুল্-গুল্ কাশি, গলা স্পর্শ করিলে, গলার মধ্যে হুড়্-হুড়্ করিলে, গলার মধ্যে ক্ষত হইলে এবং গলার মধ্যে বহির্বাযু ঠাণ্ডা লাগিলে বাহ্য উদ্বেগ হয় ; রোগী অনবরত দীর্ঘ নিশ্বাস টানিতে বাধ্য হয় (টেথেন্স) ; অত্যন্ত মর্মে মর্মে শব্দ বিশিষ্ট কাশির পর গলাদিয়া উঠাৎ প্রচুর পরিমাণে কেশাক্ষত চট্‌চট্‌য়া আঠা স্লেমা নির্গত হয় ; শ্বাস প্রবাহ ঘন ঘন এবং সময়ে সময়ে বোম্বী কাপড় হওয়ার উপক্রম হয় (একন্, অস্, এপিস্, ইপিকাক, কন্) ; বুকে যাতনা ; কাশিতে কাশিতে গলা দিয়া প্রচুর পরিমাণে রসিয জ্বায স্লেমা নির্গমন (কাখী-বাই) ; কাশিতে কাশিতে গলা দিয়া প্রচুর পরিমাণে রক্তমিশ্রিত কেশাক্ষত স্লেমা নির্গমন ; বুকের বাম পার্শ্বে হঠাৎ বিদ্যানেব জ্বায বেদনা বা যাতনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে শ্বাসকষ্ট, কাশিবার সময় বা নিশ্বাস প্রবাহের সময় যাতনার বৃদ্ধি হয় ; বুকের মধ্যে জ্বালাশুভব ।

হৃৎপিণ্ড । অংপ্রদেশে অত্যন্ত আঁটবোধ (ক্যাষ্ট) ; অং অগ্র প্রদেশে (Precordial Region) খিল ধরার জ্বায বেদনা, যাতনা দ্রুপ অং-স্পন্দন এবং যাতনার উদ্বেগ হয়, অত্যন্ত দুর্বলতা এবং রোগী হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন বা দ্রুপদপান স্পষ্ট অনুভব করিতে পারে ; হৃৎপিণ্ড নিয়মিতরূপে স্পন্দন করে না (ক্যাষ্ট, লরেন্স) ; শ্বাস করিলে নিশ্বাস বদ্ধ হওয়ার উপক্রম হয় ; বুকে ভারিবোধ ; হৃৎপিণ্ড যেন সঙ্কুচিত হইবার একপ্র অসু-ভূত হয় ; হৃৎপিণ্ডের বাহ্যোপা ; নবপ্রসূত শিশু নাগবণ হয় (L'yanosis) ;

মূর্ছা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ বেদনা, বমনোদ্বগ, মুখমণ্ডল শিটা এবং মাথাঘোরা।

ঘাড় এবং পৃষ্ঠদেশ। ঘাড় শক্ত হয় বা উহা নোয়ান যায় না (ক্যালী-কার্ক, ইয়েস, ফস্, রাস্টল্); চাপিলে ঘাড় বেদনাবুক্ত হয়; কোমরের পশ্চাৎভাগে দুর্বল এবং অবশবোধ এবং উহাতে বেদনা (রাস্টল্); কোমরের পশ্চাৎভাগে কসিনা ধরার গ্রাহ বেদনা; পৃষ্ঠদেশে বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কেশ্ঠবদ্ধ, ক্রমশঃন্দন এবং শ্বাসকষ্ট।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, হাত, পা ইত্যাদি। মোচড়াইয়া পড়িলে বেক্রপ হয়, মণিবন্ধে সেক্রপ বেদন্য; অঙ্গুলের মাথায় হৃৎকটানের গ্রাহ বাতনা অল্পত হয়; অঙ্গুল হাড়া (Whitlow); হাত পায়ের অভ্যন্ত দুর্বলতা; হাঁটুর নিকটে ভ্রম কটানের গ্রাহ বেদনা বা বাতনা; মোচড়াইয়া পড়িলে বেক্রপ হয়, বাম হাঁটুর নিকটে সেক্রপ বেদনা; পায়ের পচাবুক্ত বা বা গ্যাঙ্গ্রিন্ (Gangrene) (ফাস্, লাইকোপ্); পা এবং পায়ের পাতার লাল, নীলের আভাবুক্ত এবং অভ্যন্ত বেদনাবুক্ত ফাঁতি; পায়ের টিবিয়া (Tibia) নামক অস্থিতে পোকায় ধরা (Caries)।

চক্ষু। চক্ষু নীলের আভাবুক্ত বা হরিদ্রাবর্ণ; চক্ষু ক্ষত যাহা চাপিলে আলা করে, টাটান এবং উহা হতে দুর্বলত্ব নষ্ট হইবে গ্রাহ ক্রেন্ নির্গত হয়; অসাম ক্ষত যাহা মোড়াষ পচা লাগে (মার্ক্, নাইটিক্ অস্) এবং কাল্চে লালবর্ণের আকার ধারণ করে; দুষ্ট বা সাংঘাতিক বর্ণ বা পূজা-বাত (Curbuncle) যাহা বেগুণী রঙ্গ দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়; গায় হামের গ্রাহ কুসুড়ী, যাহা আস্তে আস্তে প্রকাশ পায় বা কাল্চে বা নীলের আভাবুক্ত আকার ধারণ কবে; পুরাতন ক্ষতের দাগ ফাটিয়া রক্ত পড়ে।

নিদ্রা। ঘুমের ইচ্ছা রহিয়াছে অথচ বোগী ঘুমাইতে পারে না (বেল্, ওপিয়াম্, ক্যাম্); ঘুমেরদ্বোবে বারম্বার ওপাশ ওপাশ করিয়া ছট্-কট্ করা বা নড়াচড়া; সজ্ঞার সময় ঘুমের ইচ্ছা একবারেই থাকে না; অস্থির নিদ্রা অর্থাৎ বারম্বার ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়; অথবা অনেক বকমের স্বপ্ন দেখিয়া বারম্বার ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়; প্রেম, বা স্নান্ধবাস সম্বন্ধীয় স্বপ্ন দেখা।

জ্বর। পৃষ্ঠদেশে শীতবোধ (এবিস্-ক্যান্); শীত পৃষ্ঠদেশে আরম্ভ হই

(ক্যাম্প্, ইউপেট্-পাক্); শীত পৃষ্ঠ দেশের নিম্ন দিক হইতে উর্দ্ধদিকে বিস্তৃত হয়; এক দিন অন্তর একদিন শীত: পায়ের পাতা বরফের ভাষ শীতল; রক্ত সিক্ত করিলে বেক্রপ হয়, গায় সেক্রপ আলামুভব, প্রধানতঃ রাত্রিতে (ক্যাক্-কার্ক); সন্ধার সময় শরীর উষ্ণ, প্রধানতঃ হাত পায়ের পাতা; হাত পায়ের পাতা আলা (দাল্ফ); রাত্রিতে ঘণ্ট (কার্ক-কার্ক, চাঘনা, ফস, ফস্-আন্, সাটানসি, দাল্ফ); সবিবাম অর বাহা প্রাতি বৎসর বসন্ত কালে রোগীকে আক্রমণ করে, অথবা পূর্ণ বৎসব বয়াকালে কোইনাইন্ দ্বারা অর থামাইবার পর অবের পুনরাক্রমণ; নাড়ী ক্ষুদ্র, ত্রুক্ষল, দ্রুতগামী এবং অসম; রাত্রিতে শীত এবং দিনের বেলা উষ্ণামুভব; আত্মক-অব বা অর বিকার এবং উগ্রার সঙ্গে সঙ্গে অন্ধ জ্ঞান বহিততা (Stupor, বিড্ বিড্ কবির্য প্রলাপ বলা (Low-muttering Delirium), নিম্ন মাড়ি পাড়িয়া হাত, জিহবা শুষ্ক, লালবর্ণ, কালচে এবং উগ্রার অগ্রভাগ ফাটায়ুক্ত এবং জিহবা কম্পমান; হাঁরদ্রাবনের, ঠাণ্ডা রক্তাশ্রিত ঘণ্ট।

ব্যবহার । পারাব অপব্যবহার জনিত রোগ; ঝাষিক কাশি; ছপিকক বা কাশি; বুগ্গী কাশ; ইপানি কাশি; সন্ধ্যাবনক ঝিল্লাপ্রদাহ (Pericarditis; অর্ধিক অব বা অরবিকার, পচা বা জনিত অব; সবি-রান অর; অক্ষেপ (Convulsions); পক্ষাঘাত; নৃগিরোগ; ঝাযুশুন; শোথ; ফক; হটে বা সান্দাতক রোগ বা পুষ্ঠাঘাত (Ariuncle); কোষ্ঠা; শয্যাকত বা শয্যাকটিক (Bed-sores); ককটরোগ (Cancer); বিসর্প বা ইরিসিপেলাস্; ভরাযু হতে অর্ধিক রক্তস্রাব (Metrorrhagia); স্রব বহঃস্রাব; ভিধকোষের কঠিনতা এবং উগ্রাতে পূর্ণ হওয়া; স্ত্রীলোকের রক্তস্রাব শেষ বদ্ধ (Change of life) হওয়া সন্যের অন্তঃ; উদরাময়; অশরোগ; অজাণ রোগ; কানরোগ; টনসিল প্রদাহ; ডিপ্‌থিরিয়া; আরক অর; প্রচুর পরিমাণে পচা ওর্গক যুক্ত এবং জানার জলের ভাষ ছেকড়া ছেকড়া পদার্থসম্বলিত পূর্ণ সংযুক্ত যা বা গ্যাঙ্গ্রিন (Gangrene); মাতাল-দিগের অন্তঃ; মূর্ত্তা; পারাব অপব্যবহার জনিত ক্ষত; ঝাটিক এবং জ্যোহিক অর; জলাতন; পুরাতন সন্ধি এবং উগ্রার দরুণ নানাবিধ ক্ষত

হওয়া ; কোষ্ঠরুদ্ধ ; বক্ষাকাল ; যুবতী বালিকার পুরাতন আকারের
স্বৎস্পন্দন ইত্যাদি অস্থখে ল্যাকেসিস্ ব্যবহার্য্য ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । ঘূমের পর মনের অত্যন্ত অস্থখ
এক উদ্বিগ্ন ; ক্রোমরে কসিয়া কাপড়াদি পরা সহ হয় না ; শরীরের বাম
অংশই অধিক আক্রান্ত হয় ; মাতালদিগের অস্থখ ; পাবা এবং কোইনাই-
নের অপব্যবহার জনিত অস্থখে উপকারী ; ঘূমের পর সমুদ্র লক্ষণ বা
যাতনার বৃদ্ধি ; প্রাতঃকালে বিছানা হইতে উঠিলে সমুদ্র শরীরের দুর্ব্ব-
লতা ; প্রাতঃকালে শারীরিক এবং মানসিক অবসন্নতা ; আক্রান্ত স্থান
নীলবর্ণ দেখায় ; সর্বদা শয়ন করিয়া থাকার ইচ্ছা, বিশেষতঃ আহারের পর ;
জ্বালোকের শেষ রক্তঃ রোধের সময়ের অস্থখে উপকারী ; ঘূমের পর, প্রাতঃ
কালে, সন্ধ্যার সময়, টক দ্রব্য বা মদ্যপানে, সূর্যের উত্তাপে, আহারের
পর, বহির্বাযুতে এবং বহির্বাযুর অত্যন্ত শীতল বা উষ্ণাবস্থায় অস্থখের বৃদ্ধি
ইত্যাদি ল্যাকেসিসের কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত ।
ঘূমের পর অস্থখাদির বৃদ্ধি একটী প্রধান বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ । ল্যাকেসিসের কার্যের সঙ্গে এপিস্ এবং
আসিনিকের কার্যের বিশেষ সাদৃশ্য আছে । এতত্ত্বি কোন কোন
বিষয়ে ল্যাকেসিসের কার্যের সঙ্গে বেলাডোনা, কষ্টিকাম্, চায়না, হিপার
সাল্ফার, ল্যাকটিক্ আসিড্, লাইকোপডিয়াম্, মার্কিউরিয়াম্, নাইট্রিক্
আসিড্, পাল্‌সেটিলা, ফস্ফরাস্, রাস্টক্স্, সাল্ফার, নেজা এবং টারে-
ণ্টুলার কার্যের সাদৃশ্য আছে ।

প্রতিষেধক ঔষধ । আসিনিক্, বেলাডোনা, মার্কিউরিয়াম্,
নাক্স্ বমিকা, ফস্ফরিক্ আসিড্ ইত্যাদি ল্যাকেসিসের প্রতিষেধক ঔষধ
মধ্যে পরিগণিত ।

ডাইলুশন বিচার । ৬, ১২ এবং ৩০ ডাইলুশন সচরাচর ব্যবহার্য্য ।
পচাযুক্ত বা বা গ্যাংগ্রেনের (Gangrene) পক্ষে ৬ষ্ঠ ক্রমের গুঁড়া বা আরোক
বিশেষ উপকারী । ৬ষ্ঠ ক্রম অপেক্ষা নিম্নক্রম ব্যবহৃত হয় না, কারণ উহাতে
উপকার না দর্শিতা অপকার হইয়া থাকে ।

লাইকোপডিয়াম,—লাইকোপ্

(LYCOPODIUM,—LYCOP.)

মধ্য এবং উত্তর ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার পাহাড় পর্বতে ইহার জন্ম। ইংলণ্ড এবং অয়ারলণ্ডে ইহা সচরাচরই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার স্পোর (Spores) বা বিচির জায় পদার্থ বথানিয়মে সুগার অব মিষ্টের সঙ্গে মিশাইয়া ১ম, ২য় এবং ৩য় শততমিক বা ৬ষ্ঠ দশমিক ক্রম পর্যন্ত গুঁড়া প্রস্তুত হইয়া থাকে। ৩য় শততমিক ক্রমের গুঁড়া হইতে যথা নিয়মে ইহার ৪র্থ শততমিক ক্রমের আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহার মূল আরোকও প্রস্তুত হইতে পারে। কিন্তু আবাকে এই ঔষধের সমুদয় গুণ থাকে কিনা সে সম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহ আছে।

সাধারণ ক্রিয়া। শরীরের সমুদয় অংশেই ইহার কার্য দেখিতে পাওয়া যায়, বাহার দরুণ ইহার দুর্বলতা এবং অবসন্ন আন্তে আন্ত বা ক্রমে ক্রমে উৎপন্ন হইয়া উহার কার্য কবান শক্তি হ্রাস হয় এবং অনেক সময় আকান্ত অংশের বিনাশও সংস্খিত হইয়া থাকে। স্বাস যন্ত্র, পরিপাক কার্য সম্বন্ধীয় যন্ত্র, জননেন্দ্রিয় এবং মুত্র যন্ত্রের মৈত্রিক ক্রিয়া ও চর্মের উপরও ইহার কার্য অত্যন্ত প্রবল। বক্রত এবং পারিপাক কার্য সম্বন্ধীয় যন্ত্রের উপর ইহার স্থানিক কার্য বিশেষ প্রবল দেখিতে পাওয়া যায়, বাহার দরুণ অকীর্ণ রোগ, বক্রতে রক্তাধিক্য বা রক্তাববোধ, কোষ্ঠবদ্ধ ইত্যাদি কতকগুলি অসুখ প্রকাশ পায়। লিম্ফটিক স্রব বা গ্রন্থিগুলি (Lymphatic cords and glands) অত্যন্ত দুর্বল হয়, গ্রন্থি, প্রধানতঃ গ্রীবা দেশস্থ গ্রন্থিগুলি, ক্ষীণ ও কঠিন হয় এবং চর্ম জড়তা এবং অসুস্থাবস্থা প্রাপ্ত হয়। উদরে বা অন্তরের মধ্যে প্রচুর দূষিত বায়ু উৎপাদন করা এই ঔষধের একটি বিশেষ প্রকৃতি বা শক্তি মধ্যে পরিগণিত।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মন। মন ক্ষুধাহীন, দুঃখিত, নিস্তব্ধতা এবং নিরাশার ভাব (নেট্রাম-মিউর, লোবিলিয়া, পাল্‌স); পাকস্থলীর অসুখ হেতু মনের

অত্যন্ত উদ্বিগ্ন; সর্বদা খিট্ খিট্ করা, চিড়্ চিড়্ করা এবং চটিয়া থাকা (আনাকার্ড্ ব্রাই, ক্যাম্, নাইট্-ক্-আস্, ফস্), বাহার দরুণ রোগী সমুখ এবং পশ্চাৎদিকে টলিয়া পড়ে; মাথায় গোলবেলে এবং ভারিবোধ; মাথার চাপিয়া ধরার জ্বার অবসরকারক বেদনা বা যাতনা, অপরাহ্ন ৪টা হইতে রাজি ৮টা পর্য্যন্ত বাহার বৃদ্ধি হয়; মৃদুপিয়া শিরঃশীড়া; পশ্চাৎদিকে মাথা হেলাইলে মাথা বেদনা; দিনের বেলা মাথা বেদনা; কাশিলে মাথা বেদনা; কপালে বেদনা; মাথার ডাইন পার্শ্বে বেদনা, দাঁড়াইলে বাহার বৃদ্ধি হয় এবং শয়ন করিয়া থাকিলে বাহার উপশম হয়; মাথার উপরি ভাগে চাপিয়া ধরার জ্বার বেদনা; মধ্যাহ্নে আশ্রয়ের পর মাথা বেদনা; চুল অকালে পাকে (কস্-আস্); চুল পড়িয়া যায় (গ্রাফ্, নেট্রাম্ মিউর, নাইট্-ক্-আস্, কস্, সিপিরা, ফস্-আস্); মাথার পশ্চাৎভাগে ফুকুড়ী আরম্ভ হয়; ফুকুড়ীতে গুরু খোসা বা চুমট পড়ে, যাছা ছাড়াইলে রক্ত পড়ে; ফুকুড়ী হইতে চর্গজ্বক্ক কল্কানি পড়ে; চুলকাইলে বা উত্তাপে ফুকুড়ীর বৃদ্ধি (গ্রাফ্, হিপ্-সাল্-ফ্, মার্ক্, নাইট্-ক্-আস্); স্ক্রু আঁটিয়া রাখিলে যেরূপ হয়, কপালের দুই পার্শ্বে সেরূপ ঘাটিয়া ধরার জ্বার বেদনা বা যাতনা।

মস্তক । প্রাতঃকালে ঘুম হইতে উত্তিবার সময় এবং উহার পর মাথা ঘোরা (আলাম্, ব্রাই, ক্যাম্, নাইট্-ক্-আস্, ফস্), বাহার দরুণ রোগী সমুখ এবং পশ্চাৎদিকে টলিয়া পড়ে; মাথায় গোলবেলে এবং ভারিবোধ; মাথার চাপিয়া ধরার জ্বার অবসরকারক বেদনা বা যাতনা, অপরাহ্ন ৪টা হইতে রাজি ৮টা পর্য্যন্ত বাহার বৃদ্ধি হয়; মৃদুপিয়া শিরঃশীড়া; পশ্চাৎদিকে মাথা হেলাইলে মাথা বেদনা; দিনের বেলা মাথা বেদনা; কাশিলে মাথা বেদনা; কপালে বেদনা; মাথার ডাইন পার্শ্বে বেদনা, দাঁড়াইলে বাহার বৃদ্ধি হয় এবং শয়ন করিয়া থাকিলে বাহার উপশম হয়; মাথার উপরি ভাগে চাপিয়া ধরার জ্বার বেদনা; মধ্যাহ্নে আশ্রয়ের পর মাথা বেদনা; চুল অকালে পাকে (কস্-আস্); চুল পড়িয়া যায় (গ্রাফ্, নেট্রাম্ মিউর, নাইট্-ক্-আস্, কস্, সিপিরা, ফস্-আস্); মাথার পশ্চাৎভাগে ফুকুড়ী আরম্ভ হয়; ফুকুড়ীতে গুরু খোসা বা চুমট পড়ে, যাছা ছাড়াইলে রক্ত পড়ে; ফুকুড়ী হইতে চর্গজ্বক্ক কল্কানি পড়ে; চুলকাইলে বা উত্তাপে ফুকুড়ীর বৃদ্ধি (গ্রাফ্, হিপ্-সাল্-ফ্, মার্ক্, নাইট্-ক্-আস্); স্ক্রু আঁটিয়া রাখিলে যেরূপ হয়, কপালের দুই পার্শ্বে সেরূপ ঘাটিয়া ধরার জ্বার বেদনা বা যাতনা।

চক্ষু । চক্ষু প্রদাহ এবং তদ্রূপ চক্ষুর কোণে চুলকানি, চক্ষুর পাতা লালবর্ণ এবং ক্ষীত; জলশূন্য হইলে যেরূপ হয়, চক্ষে সেরূপ কষ্টানুভব এবং রাজিতে চক্ষুর পাতায় পাতায় লাগিয়া থাকা (আলাম্, ক্যাক্-কার্ক্, মার্ক্, পাল্-স্, গ্রাফ্, নাইট্-ক্-আস্, সাল্-ফ্); চক্ষু জল শূন্য এবং ধূলা লাগিয়া থাকিলে যেরূপ হয়, চক্ষুর মধ্যে সেরূপ কস্ কস্ করা; প্রাতঃকালে চক্ষু মেলিতে অত্যন্ত কষ্টানুভব; চক্ষুর পাতায় ব্রণ (Stye), বিশেষতঃ নাকের

নিকটবর্তী কোণেব নিকটবর্তী স্থানে (গ্রাফ্, পাল্‌স্, ষ্টাকিস্); চক্ষুর পাতা লালবর্ণ, উহাতে ক্ষত এবং চক্ষু দিয়া উগ্র বা জ্বালা উৎপাদক জল পড়া (মার্ক্, সাল্‌ক্); চক্ষে আলোক সহ্য হয় না; সন্ধার সময় চক্ষে কিছুই দেখা যায় না; কোন বস্তুর কেবল বাম অর্ধেক স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়; চক্ষু যেন একখানি সরু বা মিহি কাপড় দ্বারা ঢাকা রহিয়াছে এরূপ অনুভূত হয়; চক্ষুর সম্মুখে যেন কোন পদার্থ ধড়্‌ ফড়্‌ করিয়া তাড়াতাড়ি নড়িতেছে এরূপ অনুভূত হয়; চক্ষুর সম্মুখে কাল চিহ্ন তাহে (সাইক্লোমেণ্, মার্ক্, কন্‌, সাল্‌ক্); চক্ষুর মধ্যে সূচীবিধানের স্তায় অনুভূত হয়, কিন্তু চক্ষু লাল হয় না; চক্ষু বিস্তৃত রূপে খোলা থাকে এবং উহাতে আলোক জ্ঞান একবারেই থাকে না।

কর্ণ। সকল প্রকারের শব্দই যেন কানে লাগে বা কানে সহ্য হয় না (একন্‌, বেল্‌, মিউর আস্); কানের মধ্যে সোঁ সোঁ শব্দ হয় (একন্‌, বেল্‌, চায়না); কান দিয়া ছানাব জলের স্তায় ছেক্‌-ডেক্‌ড়া পূৰ্ব সংযুক্ত ক্রেন নিঃসরণ (অরাম্‌, গ্রাফ্‌, হিপ্‌, সাল্‌ক্‌, মার্ক্‌, নাইট্রিক্‌-আস্); কানে কম শুনা (গ্রাফ্‌, ক্যানী-কাক্)।

নাসিকা। অত্যন্ত প্রবল সর্দি এবং তদ্রূপ নাসিকা ক্ষীত হয় ও উহা হঠাৎ জ্বালা উৎপাদক উগ্র স্লেথা নির্গত হয় (আস্‌, সিপা, মার্ক্‌-কর); নাক দিয়া ছানাব জলের স্তায় ডেক্‌ড়া ডেক্‌ড়া স্লেথা নির্গমন বাহা ডাইন নাসারক্‌ প্রথম আদন্ত হয়; আরক্ত রস বা ডিপ্‌থিরিয়া রোগে উক্ত প্রকারের নিঃসরণ; নাসারক্‌ বন্ধ হইয়া থাকে, যাহার দরুন নাক দিয়া নিঃসৃত টানিতে পারা যায় না (নাক্স-বম) এবং নাসিকার ক্ষতানুভব; নাকে কোন প্রকারের গন্ধ সহ্য হয় না (একন্‌, অগারিকাস্‌, বেল্‌, কফিয়া, কল্‌চ্‌, হিপ্‌, সাল্‌ক্‌); নাকের পাতার পাথার স্তায় সঞ্চালন বা স্পন্দন; নাসারক্‌ ক্ষত।

মূৰ্ধ মণ্ডল। মূৰ্ধ মণ্ডল হরিদ্রার আভাশঙ্ক, ধূসর বর্ণ এবং চক্ষু নীল রেখা দ্বারা পরিবেষ্টিত (চায়না, আস্); মূৰ্ধমণ্ডল শিটা, কিকা, কয় বা শীর্ণ এবং শোথের স্তায় ক্ষাত ও টল্‌টলে (আস্); মূৰ্ধ মণ্ডলে দম্‌কা উচ্চানুভব (ক্রিডাড্‌, সাল্‌ক্‌); মূৰ্ধ মণ্ডলের হাড় ছিড়িয়া ফেলার স্তায়

বেদনা বা যাতনা ; আঙ্গিক-জ্বর বা জ্বর বিকারে নিম্ন মাড়ি পড়িয়া যায় (ল্যাক, ওপিয়াম) ; মুখমণ্ডল এবং ওষ্ঠের কোণে চুল্কানি বিশিষ্ট দ্বাদের জ্বার ফুসুড়ী ।

- মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য । মুখগহ্বরের চতুর্দিক এবং ওষ্ঠের কোণে পুঁথ সঞ্চিত বা কল্তানি বিশিষ্ট ফুসুড়ী (আণ্টি-ক্রুড, গ্রাক, মার্ক) ; নিম্ন মাড়ি ঝুলিয়া পড়ে (ওপিয়াম) ; স্পর্শনে দাঁত অত্যন্ত বেদনা-যুক্ত হয় বা টাটায় ; সমুখের দাঁত নড়ে এবং স্বাভাবিক অপেক্ষা অনেক লম্বা বলিয়া অনুভূত হয় (কার্বো-আনিমেল, মার্ক, নাইট্রিক-আস) ; দাঁতে কসিয়া ধরা বা ঝিল, ধরার জ্বায় বেদনা, কোন প্রকারের উষ্ণ দ্রব্য পানে বাহার উপশম হয় ; সামান্য স্পর্শন বা চাপ দিলেই মাড়ি দিয়া রক্ত পড়ে (মার্ক, নাইট্রিক-আস, কস) ; জিহ্বা সালা লেপযুক্ত (আণ্টি-ক্রুড, ব্রাই, নাক্স-বম, পাল্‌স) ; জিহ্বার উপর এবং নীচে ক্ষত ; জিহ্বার ফোকার জ্বায় ফুসুড়ী (বেরুলী-কার্ক, নেট্রাম-মিউর, মিউর-আস) ; মুখগহ্বর এবং জিহ্বা শুষ্ক, কিন্তু পিপাসা থাকে না (নাক্স-বম, পাল্‌স) ; মুখে জল উঠে ; লাল শুকাইয়া চট্‌চটিয়া আঠা স্লেথায় পরিণত হইয়া তালুকা এবং ওষ্ঠে লাগিয়া থাকে ; জিহ্বা শুষ্ক, কাল্‌চে এবং কাটাযুক্ত ; জিহ্বা বহির্দিকে ঘেঁষে ঠেলিয়া বাহির হয় এবং বারবার এদিক ওদিক সঞ্চালিত হয়, গলার মধ্যে বেদনার দরুণই জিহ্বার উক্ত প্রকারের অবস্থা ঘটিয়া থাকে ; জিহ্বা ক্ষীণ এবং বিকৃত, বাহার দরুণ রোগীকে অত্যন্ত কুৎসিত দেখায় ; ডিপ্‌থি-
- রিয়া এবং গলার মধ্যে বেদনাতেই জিহ্বার এরূপ অবস্থা হইয়া থাকে ; মুখে টক বা তিক্ত স্বাদ (চায়না, নাক্স-বম, ম্যাগনেস-কার্ক) ; গলার মধ্যে স্লেথ সঞ্চিত হয় ; থক করিলে বা গলার খেকুর দিলেই গলা দিয়া রক্তমিশ্রিত স্লেথ নির্গত হয় ; গলার মধ্যে বেদনা এবং টাটানি ডাইন দিক হইতে আরম্ভ হয় ; নিম্ন দিক হইতে উচ্চদিকে গলার জ্বায় কোন পদার্থ ঠেলিয়া উঠিলে ঘেরূপ হয়, গলার মধ্যে সরূপ অনুভূত হয় (আসাকিটিডা, ফাইমষ্ট) ; গলার মধ্যের সঙ্কোচন বাহার দরুণ কোন দ্রব্য বা চোক গিলিতে পারা যায় না ; আহার করিবার সময় আহার দ্রব্যাদি নাক দিয়া বাহির হইয়া পড়ে (মার্ক) ; টন্‌লিলের প্রদাহ এবং উহাতে পুঁথ হওয়া যাহা ডাইনদিক •

হইতে বাম দিকে বিস্তৃত হয়; হস্তাহির নিম্নস্থিত গ্রন্থিতে বেদনা বা টাটানি; টনসিলে ক্ষত বাহা ভাইনদিকে প্রথমতঃ আরম্ভ হয় ।

পাকস্থলী এবং উদর । অত্যন্ত ক্ষুধা; বত খাওয়া বার ততই খাওয়ার ইচ্ছা হয় (ব্রাই, ফেরাম্, মার্ক্, সিনা); ক্ষুধা, কিন্তু সামান্য পরিমাণ আহার জ্বালাদি উদরত্ব হইলেই যেন গলা সমান ভরিয়াছে একরূপ অল্পভূত হয়; পেট যেন সর্বদাই ভরা রহিয়াছে একরূপ অল্পভূত হয় (চায়না); কাকি পানে অকচি (নেটাম্-মিউর, ফস্-আস); উগ্র, জালা উৎপাদক উদ্বার, বাহা সম্পূর্ণরূপে যেন উঠে না; হিকা (ব্রাই, সিকুটা, হায়োস্); বুক জালা এবং মুখ দিয়া জল উঠা (লেডাম্, নেটাম্-কার্ক, নাস্-বম্); গা বমিবমি করা বা বমনোদ্যেগ; প্রাতঃকালে এবং অনাহারে বা উপবাস করিলে গা বমি বমি করা বা বমনোদ্যেগ; পাকস্থলীর সঙ্কোচন এবং উহাতে থিলধরার স্তার যাতনা; কাঁপিলে বা বিস্তৃত হইলে বেকপ হয় পাকস্থলীতে সেকপ ভারি এবং চাপা বোধ; সন্ধ্যার সময় সামান্য পরিমাণ খাইলেই পেট ঠোস মারিয়া থাকে (চায়না, লেডাম্, সাল্ফ্); পাকস্থলীর মধ্যের ক্ষীতি এবং শুষ্করূপ স্পর্শনে উহাতে বেদনা বা টাটানির উদ্বেক হওয়া (আর্টি-কুড্, আর্স্, ব্রাই) কচিতে অকচি; নিষ্ট দ্রব্য খাওয়ার ইচ্ছা; আহার জ্বালাদি ভাল পরিপাক পায় না; নিশ্বাস প্রথমে নরম প্রদেশে চাপিয়া ধরার স্তার বেদনা বা টাটানি, স্পর্শনে তাহার বৃদ্ধি হয়; কোন একটা ভারি পদার্থ লাগিয়া থাকিলে বেকপ হয় উদরের বামদিকে সেকপ অল্পভূত হয়; দূষিত বায়ুর সন্ধ্যার হেতু উদর অত্যন্ত পূর্ণ, স্নীত এবং বিস্তৃত হয় (আবিসিড্, চায়না, কার্কো-বেজ্, ক্যালী-কার্ক, ফস্); উদরের নানা স্থানে দূষিত বায়ু সঞ্চিত হওয়ার লক্ষণ হাইপোকণ্ড্রিয়াম্, পৃষ্ঠদেশ, পাক্সরা এবং বুকের মধ্যে ভূত্বাতি করা এবং উক্ত স্থানে কদিয়া ধরা, কাঠ উপরে তাহার উপশম হয় (কার্কো-বেজ্); দূষিত বায়ু সঞ্চিত হওয়ার লক্ষণ উদরে কদিয়া ধরার স্তার বেদনা বা যাতনা (চায়না, কার্কো-বেজ্); উদরের মধ্যে ক্রমাগত গড়্ গড়্, কল্ কল্ এবং গৌ গৌ শব্দ হয় (আগারিকাস্, আলোজ্, হিপ্-সাল্ফ্, সাল্ফ্, জিক্)।

মল এবং মলদ্বার । অল্প সঞ্চিত হয় এবং কঠিন মল ত্যাগের সময় গুরুদ্বার বাহির হইয়া পড়ে; গুরুদ্বার মধ্যে থিল ধরা এবং উহাতে

সূচী বিলানের জ্বাৰ বাতনা ; গুহ হইতে অশ্বের বলী বাহির হইয়া পড়ে বাহা স্পর্শ করিলে অত্যন্ত বেদনায়ুক্ত হয় এবং টাটায় ; কোষ্ঠবদ্ধ ; মল শুষ্ক এবং কঠিন (ড্রাই, সাল্ফ্), অথবা প্রথমতঃ কঠিন বড় মোটা নেড় এই তৎপর কতক পরিমাণে নরম ; কোষ্ঠ পরিষ্কার হইলেও মনে হয় যেন গুহের মধ্যে আব্দো অনেক মল লাগিয়া রহিয়াছে ।

মূত্র যন্তু । পৃষ্ঠ দেশে বেদনা, মূত্র ত্যাগের পর বাহার উপশম হয় ; বারবার মূত্র ত্যাগের ইচ্ছা ; মূত্রে লাল বালির কণার জ্বাৰ তলানি পড়ে (আর্নিকা, চায়না, কোকাস্, কস্, নেটাম্-মিউর) ; মূত্র বোলাটিয়া, হৃৎকোষ জ্বাৰ, হৃৎকায়ুক্ত, পূর্বসূ-যুক্ত তলানি বিশিষ্ট ; মূত্রাধার প্রদেশে এবং উদরে চাপিয়া ধরার জ্বাৰ ঘূস্ ঘূসে বেদনা ; মূত্রাধারে পাথরি (Stone in the bladder) জন্মবার ধাতু ; মূত্রাধার প্রদাহ ; অসাড়ে বা অনিচ্ছা পূর্বক মূত্র নির্গমন ; মূত্রাধারে মূত্রের সঞ্চয় হয় না ; মূত্রাধারে পাথরির বন্ধন, অথবা মূত্রাধারের শ্লেষ্মা জনিত পুরাতন রোগ জনিত, রক্ত মূত্র ত্যাগ ; মূত্র ত্যাগের পূর্বে রোগী (শিশু) বাতনার চীৎকার করিয়া কঁদিয়া উঠে ; বুটাদার কাণ্ডে মূত্র ত্যাগ করিলে উহাতে লাল বালি দেখিতে পাওয়া যায় ; মূত্র কাল্চে এবং পরিমাণে কম ; মূত্রদ্বার দিয়া বিনা কষ্টে রক্তস্রাব ।

জননেন্দ্রিয় । পুরুষের স্ত্রী সহবাসের ইচ্ছার হ্রাস ; স্বরভঙ্গ ; পুরুষাঙ্গ জ্বত, সর এবং শিথিল (আগ্রাস্, বাবাইটি-কার্ক্, বার্কেরিশ্, ক্যাম্প্, সাল্ফ্), পুরুষাঙ্গের মাথার আবরক চর্ম্মের (Prepuce) মধ্যে চুলকানি । স্ত্রীলোকের নিয়মিত সময়ের অনেক পূর্বে এবং অনেক কাল ধরিয়া প্রচুর রক্তস্রাব ; রক্ত বোধ ; ভয় পাইয়া রক্ত বোধ (একন্) ; যোনি দ্বারে শুষ্কভাব ; পুরুষ সহবাসের সময় এবং উহার পর যোনি দ্বারে জ্বালা (সাল্ফ্), হৃৎকোষ জ্বাৰ প্রদর নিঃসরণ (ক্যাক্-কার্ক্, কোঁনা-য়াম্, ক্রিয়াজ্, পাল্‌স্, সিপিয়া, সাল্ফ্-আস্) ; রক্ত মিশ্রিত ক্ষত কারক শ্বেত প্রদর ; তলপেটের মধ্য দিয়া আড়ে কন্তর্নবৎ বেদনা, বাহা ডাইন দিক হইতে বাম দিকে বিস্তৃত হয় ; যোনি দ্বার দিয়া বায়ু নিঃসরণ (ক্রেমিন্) ।

শ্বাস যন্তু । স্বরভঙ্গ ; শ্বাস প্রশ্বাস ঘন ঘন, প্রধানতঃ ঘূমের অব-

হায়; গন্ধকের ধূম প্রবেশ করিলে বেরূপ হয়, স্বাস প্রাশাসে বুকের মধ্যে সেরূপ কষ্টানুভব (আস্, চারনা); বুকে ঝিল ধরিলে বেরূপ হয়, সেরূপ স্বাস-কষ্ট; দিবা রাত্রি শুষ্ক কাশি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পাকস্থলী প্রদেশে বেদনা; পানীয় পালক লাগিয়া থাকিলে বেরূপ হয়, সন্ধ্যার সময়, প্রথম রাত্রে শয়ন করার পূর্বে গলার মধ্যে সেরূপ হুড়্ হুড়্ করিয়া শুষ্ক কাশি; গন্ধকের ধূম প্রবেশ করিলে বেরূপ হয়, কঠিনালীতে সেরূপ অল্পভূত হইয়া শুষ্ক কাশি; কাশিতে কাশিতে গলা দিয়া অল্প পরিমাণ, গাড়, হরিদ্রা বর্ণের স্লেয়া বা পুঁথ বা ধূসর বর্ণের স্লেয়া নির্গমন (ষ্টানাম); লোস্তা স্বাদ বিশিষ্ট স্লেয়া নির্গমন (আধা, কাক্-কার্ক, কার্কো-বেজ্, কস্, সিমিয়া); ফুফুসের সমুদয় অংশেই যুঁষুঁষে রকমেব কনকনানি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বুকের মধ্যে আঁটাবাদ; বুকের মধ্যে ভয়ানক কষ্টানুভব; বুকের বাম পার্শ্বে হৃদী-বিধানের ভ্রায় বেদনা বা বাতনা; স্বাস টানিবার সময় হৃদীবিধানের ভ্রায় বেদনা; বক্ষাকাশ এবং গলাদিয়া প্রচুর পরিমাণে পুঁথ নির্গমন; সামান্য শারীরিক পরিশ্রমেই স্বাস প্রশ্বাস ঘন ঘন হয়; স্বাস কষ্ট এবং স্বাস প্রাশাসে নাকের পাতার পাথর ভ্রায় সকালন; অপরাহ্ন ৪টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত কাশির বৃদ্ধি; বিকারের লক্ষণাক্রান্ত ফুফুস প্রদাহ (Typhoid Pneumonia) ।

জংপিণ্ড । জংস্পন্দন (একন্, আস্, স্পাইজেল, সাল্, বিরেট্-আব্); নাড়ী ক্রতগামী এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মুখমণ্ডল এবং পায়ের পাতা সীতল ।

গ্রীবা এবং পৃষ্ঠদেশ । গ্রীবা কঠিন হয় বা উশ নোয়ান যায় না (চেলিডন্, রাস্টিঙ্ক্); গ্রীবদেশস্থ গ্রন্থির ক্ষীতি (বারাইটা-কার্ক, কাক্-কার্ক, আয়োড্, মার্ক্, সাইলিসি); ঘাড় এবং মাথার পশ্চাৎভাগে কনিয়া ধরার ভ্রায় বেদনা বা বাতনা; ডুই বুকের মধ্যবর্তী স্থানে কন্যলার আঙুলে পোড়ার ভ্রায় আলাহুতব; কোমরের পশ্চাৎভাগে বেদনা (বেল্, নাক্-বন্, পাল্ন্); বক্রতে ইচ্ছাধিক্য বা রক্তাবরোধের লক্ষণ পৃষ্ঠদেশ এবং ডাইন পার্শ্বে বেদনা ।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, হাত, পা ইত্যাদি । সমুদয় অঙ্গেই কনিয়া ধর

বা ছিড়িয়া ফেলার জ্বাৰ বেদনা বা বাতনা (ব্রাই, ফেলোস্, মার্ক্, সাল্ফ্) ; সন্ধিয় কঠিনতা এবং উহাতে বেদনা । বোগলের গ্রন্থির ক্ষীতি (ব্যারাইটা-কার্ক্, সাইলিসি) ; কহুই এবং স্বক্কেৰ সন্ধিতে ছিড়িয়া ফেলার জ্বাৰ বেদনা বা বাতনা ; বাহু এবং আঙ্গুলে সহজে ঝাঁঝ ধরে (ক্যান্) ; বাহুর মধ্য দিকে কসিয়া ধরার জ্বাৰ বেদনা ; আঙ্গুলের সন্ধি গুলি প্রদাহযুক্ত, লালবর্ণ এবং ক্ষীত ; হাতের চৰ্ম্ম অভ্যস্ত শুষ্ক । হাঁটুর সন্ধির ক্ষীতি এবং কঠিনতা ; বাম উরুর মধ্যদেশাংশে .টাটানি এবং উহাতে কামড়ানের জ্বাৰ চুলকানি, যাহা জননেস্ত্রিয় পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় ; ডাইন উরুর মধ্যমাংশে ছিড়িয়া ফেলার জ্বাৰ বেদনা বা বাতনা ; পায়ের পাতার ক্ষীতি ; রাত্রিতে পায়ের ডিম্বে খিল ধরা ; চলিবার সময় পায়ের তলার বেদনা (সাল্ফ্) ; পায়ের পাতা ঠাণ্ডা এবং ঘর্ষাবৃত (ক্যান্-কার্ক্, সাইলিসি) ; একপায়ের পাতা উচ্চ এবং অপর পায়ের পাতা ঠাণ্ডা ; ধমনী বা শিরার, আবেৰ (Tumour) জ্বাৰ, ক্ষীতি ; জন্ম হইতেই পায়ের স্থানে স্থানে কাল দাগ পড়ে এবং উহাতে অধিক লোম হয় (জট বা জড়ুল) ।

চৰ্ম্ম । গায় পুঁয় বা কল্‌তানিযুক্ত ফুসুড়ী (হিপ্-সাল্ফ্, গ্রাফ্) ; শরীরের স্থানে স্থানে চৰ্ম্ম লাল ও পুরু হইয়া কাটিয়া যায় ; গায় ছাল উঠিয়া যাওয়ার জ্বাৰ ক্ষত হয় এবং উহা দিয়া সহজে রক্ত পড়ে (গ্রাফ্, হাইড্রাষ্ট্) ; পুরাতন আকারের আমবাত বা রক্তপিত্ত (Urticaria) ।

নিদ্রা । দিনের বেলা নিদ্রানুতা বা ঘুমের ইচ্ছা, বারংবার হাই-তোলা (নায়-মব্) এবং রাত্রিতে নিদ্রাশূন্যতা অথবা ঘুম ভাল হয় না অথবা ঘুম হইলেও রোগী উহার দরুণ আপনাকে আপনি অস্থির মনে করে না ; ঘুমের অবস্থায় সৰ্ব্বদা স্বপ্ন দেখা (আস্) ; আন্ত্রিক অর বা জর-বিকার এবং অন্তান্ত প্রকারের ফুসুড়ী বিশিষ্ট বা কোটক জ্বরে অজ্ঞানবৎ নিদ্রা (আগিকা, ভগি-রাম) ; ঘুমেরঘোরে হাসি বা কঁাদা ; ঘুম ভাঙ্গিলেই চিড়্ চিড়্ করি, সকলকে ধমকান এবং আপনাকে আপনি অস্থির মনে করা ; ঘুম হওয়া হওয়া সময়ে হঠাৎ চমকিয়া উঠা ; কুৎস্পন্দন এক রোগী বাম পার্শ্বে শয়ন করিতে পারে না ।

জ্বর । সন্ধ্যার সময় পৃষ্ঠদেশে শীত আরম্ভ হইয়া বেন সমুদয় শরীরে

সুড়্, সুড়্ করিয়া চলিয়া বেড়ায় বা বিস্তৃত হয়; সামান্য নীত হইয়া শরীর উষ্ণ হয় এবং শরীরের উষ্ণতা অনেককণ ব্যাপিয়া থাকে ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গে শ্রান্তি এবং বেগনা অনুভূত হয়; সমুদয় শরীরে দমকা উচ্চাভূতব, প্রধানতঃ সন্ধ্যার সময়; সামান্য শারীরিক পরিশ্রমেই ঘর্ম্ম হয় (ক্যাক্-কার্ক্, হিশ্-সাল্‌ফ্, কস্, সিগিলা, সাইনিসি); মনে হয় যেন শরীরের রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া একবারে বন্ধ হইয়াছে; অপরাহ্ন ৪টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত নীতবোধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে হাত পায়ের পাতায় অবশ বা অসাড়বোধ; শরীরের এক অঙ্গাংশে নীতবোধ, প্রধানতঃ বাম অংশে; সবিরাম বা পালা অর; অপরাহ্ন ৪টার সময় অর আরম্ভ হইয়া রাত্রি ৮টার সময় শেষ হয় (ব্রাস্টেক্স); বরফের মধ্যে শয়ন করিয়া থাকিলে বেকুপ হয়, সেকুপ নীত কম্প এবং তৎপর ঘর্ম্ম ও প্রবল শিশাসা, কিন্তু উহার পূর্বে শরীর উষ্ণ হয় না; গোরাইজের গন্ধবিশিষ্ট ঘর্ম্ম হওয়া।

ব্যবহার। অজীর্ণ রোগ; উদরে দ্বিভ বায়ু (Flatulenco) সঞ্চান; মুখ দিয়া জল উঠা; কোষ্ঠিবদ্ধ; অর্শরোগ; সর্দি; কান দিয়া পূঁবাতি নির্গমন; কুক্ষুস প্রদাহ; শিশুগণের বায়ুনদায় স্লেয়া জনিত রোগ; টনসিল্ প্রদাহ (Tonsillitis); মূত্রাধারে পাথরী (Gravel); মূত্রাধারের স্লেয়া জনিত রোগ; মূত্র কোষের প্রদাহ এবং ক্ষয় (Nephritis); চক্ষুপ্রদাহ; গার কল্তানি বিশিষ্ট কুক্ষুড়ী; পারা জনিত ঘা; বকৃতের পুণাতন প্রদাহ; উদর এবং বক্ষ কোটির মধ্যবর্তী স্থান হিত ডায়েফ্রাম্ (Diaphragm) নামক গোলাকার পেশীর প্রদাহ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে থিকা; শোথ; শ্বেতপ্রদর; বাতরোগ; গ্রহীর ক্ষতি; অস্থি পোকায় ধরা (Caries); আত্মিক ভব বা অরবিকার; সবিরাম বা পালা অর; কর্ণ প্রদাহ; কুক্ষুদের পুণাতন প্রদাহ; বক্ষা কাশ জনিত অন্রুথ; বক্রোৎকাশ ইত্যাদি অন্রুথে লাইকোপডিয়াম্ ব্যবহার্য।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ। কতক পরিমাণে পুণাতন (Sub-acute) এবং যে সকল রোগ আশ্বেত আশ্বেত ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি হয় তাহার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। শরীরের উচ্চাংশই অধিক ক্ষয় বা শীর্ণ হয়; একাকী থাকিবার ভয়; সামান্য পরিমাণ আহার জরাদি উদরস্থ হইলেই মনে হয় যেন পেট গলা ঘনান ভরিয়াছে; সামান্য শারীরিক পরিশ্রমের পরই

প্রান্তিবোধ এবং হ্রস্বলতা ও বহির্বাসে সেবনের ইচ্ছা (পাল্‌স্) ; অনিচ্ছাপূৰ্ণক পেশীর সঙ্কোচন এবং বিস্তৃতি ; স্বাভিহে হাড়ে হাড়ে বেদনা ; অপরাহ্ন ৪টা পর্য্যন্ত অস্থিরতা বৃদ্ধি ; শয়ন করিয়া থাকিলে, বসিয়া থাকিলে, আহারের পর, অক্ষান্ত স্থান ত্রিভাইলে, চলিতে আরম্ভ করার সময় অস্থিরতা বৃদ্ধি (বাস্টল্‌স্), এবং রাত্রি ৮টার পর, ক্রমাগত নড়া চড়াতে (বাস্টল্‌স্), ঠাণ্ডাতে, উষ্ণ আহার বা পানীয় দ্রব্যে, গায়ের কাপড় কেলিয়া দিলে অস্থিরতা উপশম ইত্যাদি লাইকোপডিয়ামের কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

সমুদ্র বিশিষ্ট ঔষধ । পরিপাক কার্যে সক্ষম যন্ত্রের উপর লাইকোপডিয়ামের কার্যের সঙ্গে ব্রাইওনিয়া এবং নান্দ্র বনিকার কার্যের বিশেষ সাদৃশ্য আছে । কিন্তু সমুদ্র বিষয়ে লাইকোপডিয়ামের কার্যের সঙ্গে অত্র কোন ঔষধের কার্যের সম্পূর্ণ সাদৃশ্য আছে কি না সন্দেহ । তবে কোন বিষয়ে লাইকোপডিয়ামের কার্যের সঙ্গে আর্সিনিক্, বেলাডোনা, ক্যামেরিয়া ক্যাস্ট্রোনিকা, ক্যাস্ট্রো-বেলিটেবিলিস্, চায়না, গ্রাফাইটিস্, হিপার সাল্‌ফার, মার্কিউরিয়াম্, নেট্রাম্, মিউরিয়্যাটিকাম্, নাইট্রিক্, আসিড্, পিট্টোলিয়াম্, কফরাস্, পাল্‌সেটিল, বাস্টল্‌স্, নাইলিসিয়া, সাল্‌ফার ইত্যাদি ঔষধের কার্যের সহিত সাদৃশ্য আছে ।

প্রতিষেধক ঔষধ । একোনাইট্, ক্যাম্ফার, কক্কিকাম্, ক্যামো-মিলা, গ্রাফাইটিস্, ওপিয়াম্, পাল্‌সেটিল ইত্যাদি লাইকোপডিয়ামের প্রতিষেধক ঔষধ মধ্যে পরিগণিত । এতদ্বির কতক পরিমাণ কাকির কাত পান করিলেই লাইকোপডিয়াম্ জনিত অস্থিরতা অনেক উপশম হইতে পারে ।

ডাইলুশন বিচার । ৬, ১২ এবং ৩০ ডাইলুশনই সচরাচর অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে । ১২ ডাইলুশনই লেখক সচরাচর অধিক ব্যবহার করিয়া থাকেন । অনেক সময় ২০০ ডাইলুশন দ্বারা (প্রধানতঃ পরিপাক কক্ষ সক্ষমীয় পুরাতন আকারের অস্থিরতা) অন্ত্যন্ত ডাইলুশন অপেক্ষা অধিক উপকার দর্শিতে দেখা যায় । ৬ষ্ঠ ক্রম অপেক্ষা নিম্ন ক্রম অনেক রোগীর চিকিৎসায় ব্যবহার করিয়া লেখক কোনও ফল পান নাই । অতএব তিনি এই ঔষধের নিম্ন ক্রম ব্যবহারের পক্ষপাতী নহেন ।

মার্কিউরিয়াম্,— মার্কিউরিয়াম্ সলিউবিলিস্,—মার্ক্-সল্

(MERCURIUS,—MERCURIUS SOLUBILIS,—MERC. SOL.)

মার্কিউরিয়াম্ বলিতে মার্কিউরিয়াম্ সলিউবিলিস্ বুঝায়। এই প্রকার মার্কিউরিয়ে (পারা) হানিমান আবিষ্কার করেন। অতএব ইহা মার্কিউরিয়াম্ সলিউবিলিস্ হানিমানি নামেও উল্লিখিত হইয়া থাকে। ডাক্তার য়াঘের (Dr. Jahr) মতে, তাঁহার মৃত্যুর কএক বৎসর পূর্বে হইতেই হানিমান, মার্কিউরিয়াম্ সলিউবিলিসের পরিবর্তে মার্কিউরিয়াম্ বাইবাম্ (Mercurius Vivus) ব্যবহার করিতেন। এতদেশে মার্কিউরিয়াম্ সলিউবিলিস্ই আমরা সচরাচর অধিক ব্যবহার করিয়া থাকি। সূগার অব্ মিকের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া যথা নিয়মে ইহার ৩য় শততমিক বা ৬ষ্ঠ দশমিক ক্রম পর্যন্ত শুঁড়া প্রস্তুত হইয়া থাকে। ৩য় শততমিক বা ৬ষ্ঠ দশমিক ক্রমের শুঁড়া হইতে যথা নিয়মে ইহার ৬ষ্ঠ শততমিক ক্রমের আরো ক প্রস্তুত হইয়া থাকে। মার্কিউরিয়াম্ সলিউবিলিস্ এবং মার্কিউরিয়াম্ বাইবাম্ এই দুইয়ের কার্য এবং গুণ এক প্রকার বলিয়া অনুমিত। অতএব এস্থলে মার্কিউরিয়াম্ সলিউবিলিসের কথাই লিখিত হইল।

সাধারণ ক্রিয়া। মনুষ্য দেহে এমন কোন যন্ত্র বা অংশ নাই যাহার পদার্থ এবং কার্যের উপর মার্কিউরিয়ানের প্রবল কার্য দেখিতে পাওয়া যায় না। মনুষ্য দেহের মধ্যে যত অংশ বা যন্ত্র আছে উহার সমুদয়ই ইহা দ্বারা আক্রান্ত হইয়া উহার কার্যের শক্তির পরিবর্তন হয় এবং তৎকাল উক্ত যন্ত্র বা অংশ পচিয়া যায় এবং বিনাশপ্রাপ্ত হয়। নিঃসরণ এবং শোষণ কার্যের বৃদ্ধি হইয়া নিঃসরণ তরল, উগ্র বা জালা উৎপাদক ও ক্ষত কারক গুণবিশিষ্ট হইয়া থাকে। দৈনন্দিক ও লিফেটিক্ বিলী, গ্রন্থি, কুস্কুস্, যকৃৎ, শরীরের অন্যান্য অংশ, গ্রন্থি এবং চর্ম্মের উপর ইহার কার্য অত্যন্ত প্রবল, যাহার দরুন উক্ত যন্ত্র বা অংশগুলি প্রথমতঃ উত্তেজিত হইয়া ক্ষীণ এবং প্রদাহযুক্ত হয় এবং তৎপর প্রতিক্রিয়াতে উহার তর্কলতা এবং অবসন্নতা উপর হইয়া উহার পচন আরম্ভ হয়। উক্ত আক্রান্ত অংশ বা যন্ত্র

শুলিতে বিনাশজনক ক্ষত এবং পুঁথ হয় ও উহাতে পচা লাগিয়া থাকে । পূর্বেই বলা হইয়াছে যে মনুষ্য দেখে এমন কোন অংশ বা যন্ত্র নাই বাহার উপর মার্কিরি (Mercury) কার্য দেখিতে পাওয়া যায় না । নিম্নলিখিত প্রাকৃতিক লক্ষণদ্বারাই উক্ত কথার সত্যাসত্য প্রমাণীকৃত হইবে । এই ঔষধের কার্যের সঙ্গে, গরমীর ব্যারামের বিষের কার্যের বিশেষ সাদৃশ্য আছে । অতএব কি হোমিওপ্যাথিক, কি আলোপ্যাথিক, কি আয়ুর্বেদীয় সমুদয় মন্ত্রের চিকিৎসা-প্রণালীতেই গরমীর ব্যারাম বা গরমীর ব্যারাম জনিত অস্থি মার্কিরি (পারা) সর্বসম্মতিক্রমে ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং উহা দ্বারা এত উপকার হইতে দেখা যায় । বাস্তবিক এবং বিজ্ঞানার উচ্চতাতে সমুদয় উপদ্রবের বৃদ্ধি করা মার্কিউরিয়ামের একটা বিশেষ প্রাকৃতিক গুণ বা শক্তি মনো পরিগণিত ।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মন । অরণ শক্তির তরুলতা বা হ্রাস (অগ্রাণ্, অগ্রা, আনা-কার্ড, ক্রিয়াজ্, লাক্, নেটাম্-মিউর, নাক্স-মন্, কন্-আস্); অত্যন্ত চিন্তা বা মনের উদ্বেগ এবং অস্থিরতা (আস্); ভয়, বিশেষতঃ সন্ধ্যার সময় এবং রাত্রিতে (একন্, আস্, কাক্স-কার্স্, রাস্টক্স্); হোলী আস্তে আস্তে প্রেমের উত্তর দেয় (কন্, কন্-আস্); হৃতা এবং জ্ঞানশূন্য হওয়ার কাল্পনিক ভয় (ক্যানাবিস-ইণ্ড্); বীড়্ বীড়্ কবির প্রলাপ বলা (আগাবি-কাশ্, এইলেছাস্, বেল্, হায়োস্); অত্যন্ত মানসিক অবসন্নতা এবং দীনতার ভাব; বিমর্ষভাব এবং সন্দেহ; চিহ্নটিড়ে স্বভাব এবং সর্বদা খিট্ খিট্ করা; সমুদয় বিষয়েই নৈরাগোর ভাব; তাড়াতাড়ী কথা বলা (বেল্, হায়োস্, লাক্, ট্রামন্); ক্রমাগত কৌথানি বা কোকানি; নিরুপাধ বা পাগলের স্থায় অসম্ভব বিষয়ে কথা বলা ।

মস্তক । একগাছি হুতা বা রসি দিয়া চতুর্দিক কসিয়া বাঁধিয়া রাখিলে বেক্রপ হয়, মাথাগ সেক্রপ অনুভূত হয় (জেল্ন্স্, মাক্-বিন্, নেটাম্-মিউর, নাইট্রিক্-আস্, পাল্ন্স, সাল্ফ্); মাথা যেন ফাটিয়া যাইবে এরূপ অনুভূত হয় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মস্তিকে পূর্ববোধ (একন্, বাই, চায়না, নেটাম্-

মিউর) ; কপালের বাম পার্শ্বে চাপিয়া ধরার জায় বেদনা ; মাথার এক পার্শ্বে ছিড়িয়া ফেলা, কসিয়া ধরা বা ছলকুটানের জায় বেদনা বাহ্য কর্ণ, দন্ত এবং গ্রীবা পর্য্যন্তও বিস্তৃত হয় ; অনবরত মাথা এপাশ ওপাশ করিয়া ঘুমাণ বা মাথা চালা ; স্পর্শনে মাথা বেদনাবুক্ত হয় (চায়না, নেট্-মিউর, নাইট্রিক-অ্যাস), চুলকাইলে বাহার বৃদ্ধি হয় এবং রক্ত পড়ে ; মাথাৎ কলতানি বিশিষ্ট কুস্কুড়ী (হিপ্পোক্র্যাট্, গ্রাক্, লাইকোপ্, মার্ক্, নাইট্রিক-অ্যাস), বাহার দৃশ্য চুল ক্ষয় হয় ; মাথাৎ হৃদযাত্রার কলতানি বিশিষ্ট চুমটীবুক্ত কুস্কুড়ী এবং ভাল উঠিয়া উঠাতে যা হওয়া ; মাথাৎ চুল পড়িয়া যাব (গ্রাক্, নাইট্রিক-অ্যাস, মিলিয়', ফন্স) ; মাথাৎ হাতে ছিঁড়িয়া ফেলা বা ছল কুটানের জায় বেদনা বা বাতনা : মাথাৎ ঠিক উপরিভাগে হাড়ের জোড় খোলা থাকে (Opus fontanelles-) ; মাথা বড় : অকালে মানসিক শক্তির বিকাশ ; চিত্ত হইয়া শয়ন করিলে মাথা ঘোরা এবং উঠার সঙ্গে সঙ্গে যেন সমুদয় বস্তু কাল দেখায় ; মাথার মধ্য দিয়া আগা গোড়া স্থলীবিধানের জায় বেদনা বা বাতনা ।

চক্ষু । চক্ষু প্রস্ফুট এবং উঠার পাতা উল্টিয়া দাওয়া (বোবাক্স) এবং চক্ষে আলোক সহ না হওয়া ; চক্ষুৎ মধ্য উঠ, জ্বলাবৃত্ত এবং লালবর্ণ (একন্, অ্যাস, মাল্) ; চক্ষু দিয়া প্রচুর পরিমাণে জ্বালা উৎপাদক এবং ক্ষতকারক জলপড়া ; চক্ষুৎ কর্ণাতে (Cornea) ক্ষত এবং উঠার ধমনী লাল বর্ণ এবং দৃশ্য বর্ণের অস্বচ্ছ পদার্থ দ্বারা পরিবেষ্টিত ; কর্ণাৎ ভাঙ্গের মধ্যে পুণ্ডর সঞ্চার ; গলদার দাবান্দ জনিত আইরিস্ প্রদাহ (Syphilitic Iritis) ; চক্ষুৎ মধ্যে দৃশ্যবিশেষ বা পদার্থ বিধার জায় বেদনা বা বাতনা, বাস্তবিক এবং স্পর্শনে বাহার বৃদ্ধি হয়, চক্ষু দিয়া পান পড়া ; আগুনের নিকটে কাচ কবাব দৃশ্য চক্ষুৎ পাতার প্রদাহ ; চক্ষুৎ পাতা আক্ষেপিক রূপে বদ্ধ হয় (হিপ্পোক্র্যাট্) ; চক্ষুৎ পাতা লালবর্ণ, ফীত এবং প্রস্ফুট ; প্রাণকালে চক্ষুৎ পাতার পাতার লালিয়া থাকে (আলান্, ক্যান্-ক্যান্, লাইকোপ্, পালস, সাইকোজি, মাল্) ; কোন বস্তু পানে দৃশ্যবিশেষ ের কবাবে চক্ষু বৃত্তি অস্বাভাবিক, বাহার দৃশ্য ভালকণ দেখিতে পাওয়া যায় ন, চক্ষুৎ মধ্যে কবাবে জায় দেখিতে পাওয়া যায় (ক্যালী-কপ্, লাক্) ; চক্ষুৎ মধ্যে যেন কাল দাগ এবং কাটা দি উড়িতেছে এরূপ

দেখায় (আগারিকাক্স, সাইক্লোমেন, কস্, সাল্ফ্); আভ্যন্তরিক বা স্থায়ীকৃত আলোক বা আভ্যন্তরীণ আলোক চক্ষু সহ হয় না বা লাগে (এক্, বেল্, সাল্ফ্); গণ্ডমালা অনিত চক্ষু প্রদাহ; চক্ষুর পাতা ক্ষীত, উষ্ণতার ধার ক্ষত এবং চুমটীবা খোসা বিশিষ্ট; চক্ষুর পাতার ধার ক্ষতযুক্ত; চক্ষু প্রদাহ এবং চক্ষুর স্বৈরাংশ লালবর্ণ; চক্ষুর বোজক বিল্লিতে ফোকার স্থায়ী ফুস্ফুসী; কর্ণিয়ার ক্ষত ।

কর্ণ । কর্ণের মধ্য এবং বহির্দেশে প্রদাহযুক্ত এবং উষ্ণতায় জ্বলন্ত হুটান বা ছিড়িয়া দেবার স্থায় বেদনা বা ব্যথনা (বেল্, পাল্‌স্); কান দিয়া রক্তানিশ্রিত হর্গন্ধযুক্ত ক্রন্দ নিঃসরণ (ক্যাক্স-কার্স্, হিপ্-সাল্ফ্, গ্রীক্, লাইকোপ্); কানের মধ্যে টন টন এবং সোঁ সোঁ শব্দ হয় (চারনা, সাল্ফ্, সাইলিসি); কানের মধ্যে ছান উঠিয়া যাওয়া এবং উষ্ণতায় টাটানি বা চড়্‌চড়ানি; কানে কান শুনা এবং কান যেন বন্ধ হইয়া রহিয়াছে একপ অল্পভূত হয়; কানের মধ্যে যেন শব্দ প্রতিধ্বনিত হয়, নাক ঝাড়িলে বা চোখ গিলিবার সময় কান বন্ধ হওয়া স্বর্ণকালের জন্ত প্রযুক্ত হয়; কান দিয়া পূঁথ নির্গত হয় ।

নাসিকা । ঘ্রামের অবস্থায় নাক দিয়া রক্ত পড়া; কাশিবার সময় নাক দিয়া রক্ত পড়া; সন্ধি এবং নাকদিয়া প্রচুর পরিমাণে জলবৎ, ক্ষতকারক, স্বেদা নির্গমন এবং বাবস্বাব হাঁচি; নাক পচা হর্গন্ধ; নাসারন্ধ্রে খোসা বা চুমটী পড়ে এবং উষ্ণতায় রক্ত পড়ে; নাক লালবর্ণ, ক্ষীত এবং উজ্জ্বল (আর্স্, এবাম্, পাল্‌স্); নাকেব হাড় ক্ষীত এবং স্পর্শনে উষ্ণ বেদনায়ুক্ত হয় (আলাম্, এবাম্, গ্রাই, হিপ্-সাল্ফ্); নাক দিয়া সবুজের আভ্যন্তরীণ হর্গন্ধযুক্ত পূঁথ নির্গমন ।

মুখমণ্ডল । মুখমণ্ডল শিটা বা ফিকা বা হাঁরদ্রাবর্ণ; মুখমণ্ডল মাটির রঙ্গ বিশিষ্ট ও শোথের স্থায় টনটলে (আর্স্, পাল্‌স্); উপর ওষ্ঠের মধ্যের ক্ষীতি (বেল্); ওষ্ঠের কোণে ক্ষত এবং উষ্ণতায় অত্যন্ত কষ্টদায়ক টাটানি (আর্টি-ক্লুড্, গ্রাফ্); ওষ্ঠ শুষ্ক, ফাটাযুক্ত এবং ক্ষতযুক্ত (আর্স্); মাড়ির আক্ষেপ এবং উষ্ণতায় দগ্ধাবনে অশক্তি; মুখমণ্ডলে গরমীর ব্যারাম অনিত ফুস্ফুসী ।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য । দাঁত নড়ে এবং পড়িয়া যায় (মাক্-কর), কাল হয়, উহাতে ক্ষত হয় বা পোকায় ধরে (ষ্ট্রাফিন্); দাঁতে দপ্‌দপিয়া বা ঝাকি লাগার জ্বায় বেদনা বা বাতনা বাহা কান এবং মাথা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়; রাত্রিতে দাঁতের বেদনার বৃদ্ধি (আণ্টি ক্রুড্, বেল্); বিছানার উচ্চতাতে দাঁতের বেদনার বৃদ্ধি (ক্রিমেটিস্); মাড়ি ক্ষীত, তল্‌তলে হয়, দাঁতের গোড়ার মাংস আঁচা বা ক্ষীত হয় এবং স্পর্শ করিলে উহা বেদনায়ুক্ত হয় ও টাটায়; মাড়ি দিয়া রক্ত পড়ে (কার্যো-বেজ্, নাইট্রিক্-আস্); মাড়ির ধার সাদা; মুখে অত্যন্ত দুর্গন্ধ (আণিকা, হিপ্-সাল্‌ফ্, আয়োড্, ক্যালী-নাইট্রিক্, নাইট্রিক্-আস্, ফ্রিয়াজ্); জিহ্বা লালবর্ণ এবং ক্ষীত (বেল্), ক্ষতযুক্ত, কাল এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে চক্ষু লালবর্ণ হব (আস্); জিহ্বা ক্ষীত এবং সাদা লেপযুক্ত (আণ্টি-ক্রুড্, রাই, নাক্স-বম্, আর্দ্র এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে প্রবল পিপাসা; জিহ্বা ক্ষীত এবং তল্‌তলে (নেট্রাম্, আস্) এবং উহার ধারে দাঁতের জাঁচেব জ্বায় দাগ পড়ে; জিহ্বা নাড়িতে অশক্তি; কথা বলিতে অশক্তি; তেতলাব জ্বায় কথা বলা (কষ্ট্, হ্যাগোস্, ষ্ট্রাইমন্); মুখের মধ্যে বা (বোরাক্স্, হেলিবোবাস্, হাইড্রাষ্ট, আয়োড্); মুখের শৈবিক কিল্লীর প্রদাহ এবং উহাতে ভাসান ক্ষত (নাইট্রিক্-আস্); মুখ দিয়া প্রচুর পরিমাণে লাগ পড়া (একন্, চাবনা, ইউকেলিপ্টাস্, আয়োড্, নাইট্রিক্-আস্); মুখ দিয়া দুর্গন্ধযুক্ত এবং তামার স্বাদবিশিষ্ট লাগ নিঃসরণ; মুখে নিষ্ট স্বাদ (আস্, রাই, সাল্‌ফ্, কোকাস্); মুখে লোহাস্বাদ (নেট্রাম্-মিউর); মুখে ধাতুর স্বাদ (ইন্‌স্, লাস্, কোকাস্, নেজা, অসমিগ্রাস্, সাল্‌ফ্); মুখে চট্‌চটিয়া বা পচা স্বাদ (আণিকা, রাস্‌টক্স্); জিহ্বা মালিন বা কাল্‌চে হবিদ্রাবর্ণ লেপযুক্ত; জিহ্বা শুষ্ক, কঠিন এবং কাল্‌চে; মুখদিয়া রক্তমিশ্রিত লাগ পড়া। আল্‌জিহ্বা ক্ষীত এবং লম্বা হয়; গলার মধ্যে এবং মুখে গরমীর ব্যারান জ্বািত বা; গলার মধ্যে অত্যন্ত কষ্টদায়ক শুষ্কভাব এবং মুখগহ্বর লাল-পূর্ণ; গিলবার সময় গলার মধ্যে চাপ পড়া; টনসিল্‌ প্যাকিয়া উহাতে পুঁণ হয় এবং গিলবার সময় গলার মধ্যে উপরিভাগে ঘাটিয়া ধরার জ্বায় প্রবল বেদনা বা বাতনা অধুত হয় (হিপ্-সাল্‌ফ্, নাইট্রিক্-আস্); গলার মধ্যে তামার জ্বায় লালবর্ণ এবং

উহা বেদনায়ুক্ত ও ক্ষীত হয়; ভরল পদার্থ গিলিতে অশক্তি এবং গিলিবার সময় আহার দ্রব্যাদি নাক দিয়া বাহির হইয়া পড়ে (নাইকোপ্); হ্রাসহি্ন নিম্ন ভাগস্থিত গ্রন্থগুলি (Sub-maxillary-glands) প্রদাহযুক্ত এবং বলীত হয় (এরাম্, অরাম্, ব্যারাইটা-কার্ক্, ক্যাক্-কার্ক্, সাইলিসি); গলার মধ্যে জ্বালাহুত্ব ।

পাকস্থলী এবং উদর । হয় অত্যন্ত ক্ষুধা, অথবা ক্ষুধা একবারেই থাকে না; প্রবল কাঠি উল্কার (ইপিকাক্, কস্, বিরেট্-আব্); অত্যন্ত প্রবল পিপাসা (একন্, অস্, ট্রাই); মুখের মধ্যে জলের সঞ্চার হওয়ার দরুণ বমনোদেগ এবং তিত্ত্বস্বাদ বিশিষ্ট পদার্থ বমন; পাকস্থলী জ্বালাহুত্ব, ক্ষীত এবং স্পর্শনে বেদনায়ুক্ত হয়; আহার দ্রব্যাদি ভাল পরিপাক পায় না, অথচ সর্বদাই যেন ক্রমাগত ক্ষুধা লাগে; পেট যেন নেতার স্থায় এবং সম্মুচিত হয়; আহারের অনতিকাল বিলম্বেই ক্ষুধার উদ্রেক হয়; এক থানি পাকস্থলি চাপিয়া থাকিলে বেক্রপ হয়, আহারের পর পাকস্থলীতে সেক্রপ ভারিবোধ; বায়ু অথবা উগ্র পচা দুগ্ধযুক্ত উল্কার উঠা । যকৃত প্রদেশে স্ফীতিবধানের স্থায় বেদনা, বাহার দরুণ নিশ্বাস প্রশ্বাস এবং উদগারের ব্যাঘাত জন্মে (একন্, অস্, ট্রাই, চেলিডন্, চায়না, কালী-কার্ক্, নাক্স-বম্); যকৃত প্রদাহ এবং তদ্রূপ যকৃত প্রদেশ ক্ষীত এবং বেদনায়ুক্ত হয়, বাহার দরুণ রোগী ডাইন পার্শ্বে শয়ন করিতে পারে না (ট্রাই, চেলিডন্); উদর কঠিন, ক্ষীত এবং বেদনায়ুক্ত (অস্, ক্যাক্-কার্ক্, চায়না, ল্যাক্); যকৃতের পুৰাতন আকারের সঙ্কোচন বা হ্রাস (Chronic Atrophy); সম্পূর্ণ লক্ষণ সম্বলিত কানলরোগ (চেলিডন্, নাক্স-বম্); একথানি পাথর চাপিয়া থাকিলে বেক্রপ হয়, উদরে সেক্রপ চাপাবোধ (অস্, ট্রাই); নোচড়াইয়া পড়িলে বা ধঁকুলিয়া গেলে বেক্রপ হয়, অস্ত্রের মধ্যে সেক্রপ বেদনাজ্বল (ফেরাম্, নাক্স-বম্), বাহার দরুণ রোগী ডাইন পার্শ্বে শয়ন করিতে পারে না; উদরে হ্রস্ব কুটানের স্থায় বা কঠনবৎ শূলবেদনা (কোনারাম্), প্রধানতঃ রাত্রিতে এবং সন্ধ্যাকালের ঠাণ্ডাতে ঠাণ্ডা লাগিয়া শূল বেদনা (ডাক্স, নাক্স-বম্); কুচকির গ্রন্থি ক্ষীত হয় (বাগী), বা পাকিয়া উঠাতে প্রব হয় (ক্যাক্-কার্ক্, নাইট্রিক্-অস্, থুজা); উদরে কঠনবৎ বা হ্রস্ব

ফুটানের ভ্রায় বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে শীতবোধ; গরমীর ব্যারাক বা গণ্ডমালা জনিত বাগী (Syphilitic or Scrofulous Buboec)।

মল এবং মলদ্বার। প্রতি মিনিটেই প্রায় বারম্বার বাহ্যের বেগ এবং কৌণপাড়া এবং শুষ্কতার মধ্যে শূলানি বা টাটানি; পেট কামড়ানী বা দান্তের পূর্বে, দান্তের সময় এবং দান্তের পর জ্বালা এবং বারম্বার কষ্টদায়ক কৌণপাড়া, দান্তের আভ্যন্তরিক কালে শীতবোধ (কম), সন্ধ্যাকালের বাতাস লাগিয়া উদরাময় এবং পেট কামড়ানি বা শূল-বেদনা; মল সবুজবর্ণ; মল সবুজ শ্লেষ্মা, (আস্, আর্জেন্ট-নাইট্রিক্, বেল, ইপিকাক্, সাল্ফ্); বক্ত ভেদ; রক্তমিশ্রিত শ্লেষ্মা ভেদ (ক্যাথ্, নাইট্রিক্-আস্); মল চট্‌চটিয়া আঠা; মল কটার আভ্যন্তর, সাদাটিয়া স্থলবর্ণ এবং উগ্র, জ্বালা উৎপাদক, স্বাভাবিক মল বক্ত (আস্, সাল্ফ্); মলদ্বার দিয়া স্তম্ভবৎ কৃমি পড়ে (কেরাম্, স্পাইজেল, সিপিয়া); উদরামা, মল কাল্‌চে, সবুজ, কেশায়ুক্ত এবং গন্ধকের ভ্রায় হরিদ্রাবর্ণ, দান্তের পূর্বে শীতবোধ; মল কাদার রক্ত বিশিষ্ট গুঁটলো; রক্তানাময় এবং মল রক্ত মিশ্রিত শ্লেষ্মা বা রক্ত, স্বাভাবিক মল এবং শ্লেষ্মা মিশ্রিত মলত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে শীতবোধ, গা বমি বমি করা এবং দান্তের সময়ও উহার পব পেটে কষ্টবৎ বেদনা এবং কষ্টদায়ক কোণপাড়া; আকাতরায় ভ্রায় কাল মলত্যাগ। ডাক্তার বেয়াব (Dr. Behr) বলেন যে, রক্তানাময় রোগে শ্লেষ্মা মিশ্রিত স্বাভাবিক মলত্যাগ এবং মলত্যাগের সময় অত্যন্ত কষ্টদায়ক কৌণপাড়া থাকিলে, মলে রক্ত থাকু না থাকুক, মার্কিউরিয়াসের ভ্রায় সমউপকারী ঔষধ আছে কিনা সন্দেহ। এতদেশে আমরাও উক্ত লক্ষণ ধারিয়া আনাময় রোগের চিকিৎসায় মার্কিউরিয়াম্ সলিউবিলিস্ ব্যবস্থা করিয়া বিশেষ ফল পাইবা থাকি।

মূত্রযন্ত্র। মূত্র নালীতে জ্বালাস্তুত্ব (একন্, আস্, ক্যাথ্, কোনা-রাম্); বারম্বার মূত্র ত্যাগের ইচ্ছা, কিন্তু বেগনিলে অতি অল্প পরিমাণ মূত্র নির্গত হয় (এপিন্, কলোস্, ডিঅট্); মূত্র ত্যাগের হঠাৎ অনিবার্য ইচ্ছা এবং প্রচুর পরিমাণে মূত্র ত্যাগ (ক্রিরাঙ্); মূত্র কাল্‌চে লালবর্ণ, খোলাটিয়া, এবং উহাতে তলানি পড়ে; প্রমেহ রোগ এবং তদ্রূপ পুষ্কবাস্কের মাথার

আবরক চর্ম্ম ক্ষীত হওয়ার দরুণ উহা খোলা যায় না (ফাইমোসিস্,—*Phimosi*) এবং তদরূপ মূত্রনালী দিয়া সবুজ বর্ণের ক্রেন নিঃসরণ, রাত্রিতে যাহার বৃদ্ধি হয় (মার্ক-কর); টক গন্ধবৃত্ত মূত্রতাগ ।

জননেন্দ্রিয় । পুরুষের স্রীমহবাসের শক্তির সম্পূর্ণ বিনাশ (অগ্ণুনাশ্, আর্জেন্ট্-নাইট্রিক্, ক্যাম্ফার); পুরুষাঙ্গের মাথায় গরমীৰ ঘায়েৰ জ্বাৰ ঘা এবং উহাতে, যোমের জ্বাৰ, পাতলা ক্রেনের সঞ্চাৰ; পুরুষাঙ্গের মাথায় গরমীৰ ঘা (ছিপ্-সাল্ফ, নাইট্রিক্-অ্যাম্); পুরুষাঙ্গের মাথা এবং উহার আবরক চর্ম্মের প্রবল প্রদাহ এবং ক্ষাতি ও উহাতে অত্যন্ত বেদনা; অণ্ডকোষ এবং শুক্র নিঃস্ৰাৱক স্ত্রো (Spermatic Cord) টানিয়া বা কসিয়া পরার জ্বাৰ ভয়ানক বেদনা বা বাতনা (বার্কেৱিস্); অণ্ডকোষে অত্যন্ত ঠাণ্ডা বোধ (বার্কেৱিস্, ক্যাপ্-স্, সাল্ফ্); অণ্ডকোষ ক্ষীত, কঠিন এবং উজ্জ্বল; পুরুষাঙ্গের মাথায় কঠিন আকারের গবমীৰ ঘা বা হাট্টেরি-রান্ জ্বাৰ (Hard chancre) । স্রীলোকের প্রচুৰ বা অতিরিক্ত রজঃস্রাব (Menorrhagia) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মনের অত্যন্ত উদ্বেগ এবং তল-পেটে বেদনা; শ্বেতপ্রদর, রাত্রিতেই যাহার অধিক বৃদ্ধি হয়; যোনি দ্বাৰ দিয়া সবুজব আভাসুক্ত ক্রেন নিঃসৰণ; যোনি দ্বাৰ দিয়া স্ৰাব উৎপাদক, ক্ষতকারক, চুলকানি উৎপাদক নিঃসরণ এবং যোনিদ্বাৰ চুলকাইলে অত্যন্ত আলাপ উদ্ৰক হয় (অ্যান্, কোনাৱাম্, ফস্, পাল্-স্); যোনিদ্বাৰ অপেক্ষা উচাৰ বহির্দেশে প্রদাহ অধিক হয় এবং উহার দরুণ উচ্চাংশের স্থানে স্থানে ছাল উঠে এবং উহাতে অলাভ-ভূত হয় (কাৰ্বো-বেজ্); জননেন্দ্রিয়ের চুলকানি (কাহ্, কোনাৱাম্), স্রাব লাগলে যাহাৰ বৃদ্ধি হয়; যোনিদ্বাৰ স্থানদৃষ্ট হয়; শুনেৰ্ম্ম ক্ষীতি ও কঠিনতা এবং উহাতে ক্ষত হওয়ার জ্বাৰ বেদনা বা টাটান; শুন পাকিয়া উহাতে পূৰ্ণ হয় (কোনাৱাম্, ছিপ্-সাল্ফ্, ফাইটোজ্, সাইলিন্) ।

শ্বাস বন্ধ । শ্বসভঙ্গ বা কৰ্কশ শ্বব; কণ্ঠনালাতে ছালউঠিয়া যাওয়ার জ্বাৰ অগ্নাত্তব; সন্ধি এবং নাক দিয়া প্রচুৰ পাৰমাণ জলবৎ তরল স্রাবা নির্গমন এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গলার মধ্যে বেদনা; নিম্নস্থান হইতে উচ্চ স্থানে উঠিতে বা চলিবার সময় শ্বাস কষ্ট (একন্, অ্যামন্-কাৰ্ক্, অ্যাম্-

ক্যাক্স-কার্ক) ; কণ্ঠহারী শুষ্ক, শ্রান্তিজনক কাশি, সন্ধ্যার সময় বা রাত্রিতে বিছানায় শয়ন করিয়া থাকিলে বাহ্যিক অধিক উদ্বেক বা বৃদ্ধি হয় ; বুকের উপরিভাগে হৃৎ-হৃদীর দকণ কাশির উদ্বেক হয় (হায়োস্, কন্) ; বুকের মধ্যের সমুদয় বস্ত্রাদি শুষ্ক হইলে যেক্রপ হয়, কাশিবৎসর সময় বুকের মধ্যে সেক্রপ শব্দ হয় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বুকে এবং কোমরের পশ্চাৎ ভাগে বেদনা (বেল্, ব্রাই, কন্) ; বুকে স্থলীবিধানের জায় বেদনা (একন্, ব্রাই, ক্যালী-কার্ক্, ফন্) ; হাঁচিদিতে বা কাশিতে বুকের ডাইন পার্শ্বে স্থলী বিধানের জায় বেদনা বাহ্যিক বুকের মধ্যদিয়া পৃষ্ঠদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় (সাল্ফ্) ; ফুসফুসের স্ফোটক বিশিষ্ট বোগে (Tuberculosis) গলা দিয়া রক্ত মিশ্রিত শ্লেষ্মা নির্গমন ; বুকের মধ্যে জ্বালানুভব যাহা গলার মধ্য পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় ; বুকের মধ্যে অতিরিক্ত বক্তের সঞ্চার ; বুকের মধ্যে শুষ্কানুভব ; রক্তস্রাবের পর অথবা ফুস্ফুস প্রদাহের পর ফুস্ফুস পাকিয়া উঠাতে পূর্ব উপদ্রব হয় ; বুকের মধ্যে আঁটা বোধ ; ফুস্ফুসের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বায়ুবহা নলীর প্রদাহযুক্ত বিস্তৃত (Emphysema of the Lungs) ; হপিকক বা কাশি ; ডাইন রক্ত চইতে ডাইন পার্শ্বে আগা গোড়া স্থলীবিধানের ন্যায় বেদনা । সামান্য শারীরিক পরিশ্রমেই জ্বৎস্পন্দন (ট্রাকিস্) ।

বাড় এবং পৃষ্ঠদেশ । প্রীবার গ্রহিব প্রদাহ এবং ক্ষীতি (ব্যারা-ইটা-কার্ক, বেল্, ক্যাক্স-কার্ক, আয়োড্) ; পৃষ্ঠদেশ এবং কোমরের পশ্চাৎভাগে হেংলিয়া যাওয়া বা মোচড়াইয়া পড়াব জায় বেদনা, বিশেষতঃ বসিয়া থাকিলে ; নিশ্বাস প্রবাসের সময় কোমরের পশ্চাৎভাগে যাটিয়া ধরার জায় বেদনা বা বাতনা ।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, হাত, পা ইত্যাদি । অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কপন (ককিউলস্, কোনারাম্, জেলস্, ট্রানিন্) ; হাত পায়ের পাতাই অধিক কাঁপে ; অঙ্গ প্রত্যঙ্গের অনিচ্ছাপূর্বক স্পন্দন বা কাঁকনি ; সমুদয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গে ঢুর্কল এবং শ্রান্তিবোধ এবং উঠাতে অতিরিক্ত পরিমাণে ভারিবোধ ; সমুদয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গে কসিয়া ধরা বা ভিড়িয়া ফেলার জায় বেদনা (ব্রাই, কলোস্, লেডাম্, লাইকোপ্, সাল্ফ্), রাত্রিতে এবং গরম বিছানায় বাহার বৃদ্ধি হয় ও উহার সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর ঘর্ম হয়, কিন্তু ঘর্ম হওয়ার

দৰ্শন অহুধের কোনও উপশম হয় না ; পা এবং হাতের পাতা ঠাণ্ডা । হাতে এবং হাতের পাতায় খিল ধরার জ্বাৰ সন্ধান ; হাতের নখ আবিড়ু খাবড়ু হয় বা উহা পড়িয়া যায় ; হাতে কল্তানি বিশিষ্ট খোলের জ্বাৰ ফুসুড়ী যাঁহা রাত্রিতে চুকাই ; ছাল উঠার জ্বাৰ বা যাঁহা হইতে সহজে রক্ত পড়ে ; স্বক্কেৰ সন্ধি, বাহু এবং মণিবন্ধের সন্ধির হাড়ে ভৌঁতা ছুরি দিয়া কাটার জ্বাৰ বেদনা বা যাতনা, রাত্রিতে এবং আক্রান্ত স্থান সন্ধান করিলে বাহার উদ্রেক বা বৃদ্ধি হয় ; রাত্রিতে উরু এবং পায়ে শীতল চট্‌চটিয়া ঘর্ষ ; আক্রান্ত স্থানে চিড়িকমারার জ্বাৰ বা দপ্‌দপিয়া বেদনা, বাহার দৰ্শন আক্রান্ত স্থানে পূঁষ ইইয়াছে বলিয়া অনুভূত হয় ; কটিবাত রোগ ; পা এবং পায়ের পাতার শোথের জ্বাৰ ক্ষতি ; পায়ের পাতার তলায় জ্বালা-স্থত্ব ; জননেন্দ্রিয় এবং উরুর মধ্যবর্তী স্থানে ছাল উঠিয়া যাওয়ার জ্বাৰ চড়্‌চড়ানি বা টাটানি (গ্রাক্) ; পায়ের পাতার উপরিভাগের শোথের জ্বাৰ ক্ষতি ; কুচকি এবং হাঁটুর সন্ধিতে ছিড়িয়া ফেলার জ্বাৰ বেদনা, রাত্রিতে বাহার বৃদ্ধি হয় ; উরু আক্রান্ত সন্ধিতে পূঁষ হওয়ার উপক্রম হয় ।

চর্ম্ম । চর্ম্ম মলিন বা কাল্‌চে হরিদ্রাবর্ণ (ফেরাম্-আয়োড্) কামল রোগ (চাযনা) ; সমুদয় শরীরে চুন্ধানি, রাত্রিতে বিছানার উষ্ণতাতে বাহার উদ্রেক বা বৃদ্ধি হয় (আলাম্, ক্রিমোট্‌স্, মেজিরিয়াম্, পাল্‌স্, সোরিনাম্, সাল্‌ফ্) ; গায়ের স্থানে স্থানে ফোকার জ্বাৰ জলপূর্ণ ফুসুড়ী ; গায় ক্ষত যাঁহা হইতে সহজেই রক্ত পড়ে (আসাফিটিডা, হিপ্-সাল্‌ফ্, মেজিরিয়াম্, সাল্‌ফ্) এবং উহার গোড়ায় চব্বিৰ জ্বাৰ কল্তানি পড়ে ও উহার ধার কাঁচা মাংসের জ্বাৰ উন্টান ; গায় ভাঙ্গান এবং বিস্তৃত রকমের বা ; গায় চেপ্টা, বেদনাহীন, ফিকা এবং ভাতের ফেনের জ্বাৰ তরল পূঁষ বিশিষ্ট ক্ষত ; পুরুষাঙ্গের মাথার আবরক চর্ম্মে (Prepuce) উরু প্রকা-রের ক্ষত ; পুরুষাঙ্গের মাথার গরমি-ব্যারামের প্রাথমিক (Primary) এবং পরবর্তী (Secondary) বা (নাইটিক্-আম্) ; শরীরের স্থানে স্থানে গোলাকারের তামার জ্বাৰ লালবর্ণ চক্‌চকে দাগ পড়ে ; গায়ের স্থানে স্থানে দানের জ্বাৰ ফোকা বিশিষ্ট জলপূর্ণ চুমটি বিশিষ্ট ফুসুড়ী এবং উহা দিয়া হরিদ্রাবর্ণের জ্বালা উৎপাদক বা উগ্রগুণবিশিষ্ট কল্তানি পড়ে ।

নিদ্রা । দিব্যরাত্রি ঘুমের ভাব বা ইচ্ছা ; নিদ্রা পৃথকতা (নিমিসিক, ভায়না, কফিরা) ; দিব্যতে ঘুমের ভাব বা ইচ্ছা এবং রাত্রিতে নিদ্রাপৃথকতা ।

জ্বর । শীতবোধ ; বহিবায়ুতে শীতবোধ ; তরল ভেদ হওয়ার আভ্যন্তরিক কালে শীতবোধ ; গায় ঠাণ্ডা জল ঢালিলে ঘেঞ্জা, হয়, প্রাতঃ-কালে, সন্ধ্যার সময় শয়ন করিয়া থাকিলে সেরূপ শীতবোধ, যাহা আঙনের উদ্ভাপেও নিবারিত হয় না ; পর্যায়ক্রমে শীত এবং উষ্ণাত্তব (ক্যাক্-কার্ক, ককিউলান্স) ; রাত্রিতে শরীর গরম হয় (চায়না, কস্) ; রাত্রিতে প্রচুর ঘর্ম (চায়না, কস্, সাল্ফ) ; প্রত্যেকবার নড়াচড়াতে প্রচুর ঘর্ম (ক্যাক্-কার্ক, কস্, হিপ্-সাল্ফ, সিলিয়া, সাইলিসি) ; ঠাণ্ডা, চট্‌চটিয়া ঘর্ম (আস্, ক্যাম্ফার) ; চর্কি বা তৈলের জায় ঘর্ম (ব্রাই) ; দুর্গন্ধবৃদ্ধ ঘর্ম (আর্শিকা, আস্, কার্কো-অনিমেল, সাইলিসি) ; হরিদ্রাবর্ণের ঘর্ম যাহার দরুণ বিছানার কাপড়াদিও হরিদ্রাবর্ণ হয় ; সকল প্রকার অস্থখেই ঘর্ম হয় বটে, কিন্তু উহার দরুণ অস্থখের কোনও উপশম হয় না ; রসক্ষয় জন্মিত জ্বর বা হেক্টিক্ ফিবার (Hectic-Fever), বিশেষতঃ শিশু এবং ছোট বালক বালিকা-গণের ; উত্তেজনা জনিত জ্বর (Irritative Fever) ; নাড়ী দ্রুতগামী এবং কখন কখন মুদ্রগতি বিশিষ্ট ও কম্পমান ; সন্ধ্যার সময়ই শীত অধিক অনুভূত হয় ; রাত্রিতেই জ্বরের আক্রমণ অধিক হয় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পিপাসা থাকে ; রাত্রিতে দুর্বলকারক প্রচুর ঘর্ম ।

ব্যবহার । সকল প্রকারের গরমীর বা এবং গরমীর ব্যারাম জনিত সকল প্রকারের অস্থখ ; গণ্ডমালা এবং সর্দিজনিত সকল প্রকারের অস্থখ ; সন্ধি এবং পেশীবাত ; সকল প্রকারের শোথ ; অগ্নি এবং গ্রন্থির অস্থখ ; উদরাময় এবং আমাশয় ; চর্মরোগ ; ব্রায়শূল ; পক্ষাঘাত ; আক্ষেপ বা কন্বালসন্স (Convulsions) ; রক্তপ্রাব ; পাকস্থলীর অস্থখ এবং পিত্ত-জনিত অস্থখ ; কামলরোগ ; বায়ুনল প্রদাহ ; কুক্ষ-প্রদাহ ; বহুতপ্রদাহ ; কর্ণপ্রদাহ এবং কান দিয়া পুঁয় পড়া ; ঠাণ্ডা লাগিয়া কানে কম শুনা বা কানে তালি লাগা ; নাসিকায় সাংঘাতিক আকারের বিসর্প বা ইরিসিপেলাস্ ; মুখে বা এবং তদ্রূপ মুখ দিয়া লাগ পড়া ; জিহ্বা-প্রদাহ ; গলাতে গরমীর বা ; উষ্মি ; শূলবেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে উদরাময় ; ব্রজ্যমা-

শর ; রক্তমূত্র ; একশিরা ; বাগী ; কষ্টকর রজঃস্রাব এবং বাধকের বেদনা (Painful Menstruation) ; শ্বনের প্রদাহ এবং উহাতে ক্ষত ; সর্দি ইত্যাদি অস্থখে মার্কিউরিয়াম্ ব্যবহার্য্য। সংক্ষেপে ইহা বলা যাইতে পারে যে, মনুষ্য দেক্ এমন কোন রোগ নাই যাহাতে মার্কিউরিয়াম্ অল্প কি অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত না হয়।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ। সমুদয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বলক্ষর, উহাতে প্রান্তিবোধ এবং উহার কাঁপনি ; স্বেচ্ছাপূর্ব্বক সঞ্চালন শক্তি বিশিষ্ট পেনী, হাত, জিহ্বা ইত্যাদির অনিচ্ছাপূর্ব্বক কাঁপনি ; মুখে এবং গায় অত্যন্ত দুর্গন্ধ ; কতকায়ক বা উষ্ণ নিঃসরণ ; রাত্রিতে চাতের মধ্যে বেদনা ; গ্রন্থির ক্ষীতি ; গায় চক্ষাকারের ফুসুড়ী ; ডাইন পার্শ্বে শয়ন করিতে অশক্তি ; সকল প্রকারের গ্রন্থির অস্থখ ; আক্রান্ত স্থান ক্ষীত এবং উহাতে কাঁচা ঘায়ের ভায় জ্বালা এবং চড়্ চড়ানি ; প্রায় সকল প্রকার অস্থখেই প্রচুর ঘর্ষ হয়, কিন্তু উহার লক্ষণ অস্থখের কোনও উপশম হয় না ; সন্ধ্যার সময় এবং রাত্রিতে, বিহানার উচ্চতাতে, ঘর্ষের সময়, আর্দ্র বায়ুতে, সন্ধ্যাকালের শীতল বাতাস লাগিলে, বর্ষাব সময়, দিন গরম হইলে, আর্দ্র ঠাণ্ডা রাত্রিতে, শারীরিক পরিশ্রম বা অঙ্গচালনায়, ডাইন পার্শ্বে শয়ন করিলে অস্থখের বৃদ্ধি এবং দিনের বেলায় ও বিশ্রাম কালীন অস্থখের উপশম ইত্যাদি মার্কিউরিয়ামের কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত।

সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ। মার্কিউরিয়ামের কার্যের সঙ্গে আরো-ডিন্, নাটটিক্ আসিড্, আসিনিক্, হিপার সাল্ফার, গ্রাফাইটিস্, কস্ক-রাস্, অরাম্, বেলাডোনা, ক্যাস্কেরিয়া-কার্ক্, চায়না, কোনায়াম্, ল্যাকেসিস্, মেজিরিয়াম্, পাল্‌সেটিল্, সাইলিসিয়া, ষ্টাকিসেগ্রিয়া, সাল্-কার্, থুজা ইত্যাদি ঔষধের কার্যের অনেক সাদৃশ্য আছে।

প্রতিষেধক ঔষধ। আসাফিটিডা, বেলাডোনা, কার্কী বেজি-টেবিলিস্, হিপার সাল্ফার, ক্যালী-আয়োডাইড্, লাইকোপডিয়াম্, নাটটিক্ আসিড্, অরাম্, মেজিরিয়াম্, সাল্ফার, আরোডিন্, চায়না, ষ্টাকিসেগ্রিয়া, ল্যাকেসিস্ ইত্যাদি মার্কিউরিয়ামের প্রতিষেধক ঔষধ মধ্যে পরিগণিত।

ডাইলুশন বিচার। গরমীর ষায় ৩য় দশমিক ক্রমের গুঁড়া, ৩ গ্রেইণ্ মাত্রায়, উপকারী। গরমীর ষায় কোন কোন চিকিৎসক ১ম, ২য় দশমিক ক্রমের গুঁড়াও ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। রক্তমাশয়ে ৬ষ্ঠ ক্রমের আরোক উপকারী। গ্রন্থির অস্থখেও ৬ষ্ঠ ডাইলুশন এবং কখন কখন ৩য় দশমিক ক্রমের গুঁড়া উপকারী। প্রায় সকল প্রকার অস্থখেই ৬ষ্ঠ ডাইলুশন ব্যবহার্য্য। গরমীর ব্যারাম জনিত পুরাতন অস্থখে অনেক সময় ৬, ১২ এবং ৩০ ডাইলুশনে বিশেষ উপকার দর্শে। পুরাতন আকারের রক্তমাশয়ে ৩০ ডাইলুশন দ্বারা বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। গরমীর ব্যারাম জনিত অস্থি বেদনার চিকিৎসায় ১২ এবং ৩০ ডাইলুশন ব্যবহারে লেখক বিশেষ উপকার পাইয়া থাকেন। গরমীর ব্যারাম বাতীত প্রায় সকল প্রকার অস্থখেই ৬ষ্ঠ ক্রম দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শে। কখন কখন পুরাতন আকারের অস্থখে ১০০ এবং ২০০ ডাইলুশন দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শিতে দেখা যায়। আবার গরমীর ব্যারাম অনেক কালের পুরাতন হইলে মার্কিউরিয়াসের ২য় এবং ৩য় দশমিক ক্রমের গুঁড়া, ১ গ্রেইণ্ মাত্রায়, প্রতি দিন রাত্রিতে শ্রবণ করিবার সময় ১ মাত্রা, সেবন করিয়া ২।৩ সপ্তাহ কাল মধ্যেই সুবিশেষ ফল পাইতে দেখা যায়। যে প্রকার পুরাতন আকারের অস্থে মার্কিউরিয়াস ব্যবহার্য্য, তাহাতে ৩০ ডাইলুশন ব্যবহার করিয়া লেখক বিশেষ ফল পাইয়া থাকেন।

নাক্স বমিকা,—নাক্স বম্।

(Nux Vomica,—Nux vom.)

লক্ষা, ইষ্ট্ ইণ্ডিস্, কোচিন চায়না এবং উহার নিকটবর্ত্তী দেশ এবং ইণ্ডিয়ান্ আফ্রিকিলেগোর অন্তর্গতঃ দ্বীপ সমূহে এই গাছের জন্ম। ইহাকে এতদ্দেশে কুচিলা বলে। উহার বিচিত্র গুঁড়া হইতে ২০০ ডিগ্রী ওয়ার প্রফ্ স্পিরিটে যথা নিয়মে ইহার মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহা এক অত্যন্ত বিষাক্ত বৈদ্য মধ্যে পরিগণিত। উহার সার পদার্থকে ট্রিক্‌নিয়া বলে। ট্রিক্‌নিয়া নাক্স বমিকা অপেক্ষাও অধিক উগ্র বিষ বলিয়া পরিগণিত।

বিভিন্ন আদত শুঁড়া সুগার অব্ মিকের সহিত যথা নিয়মে মিশ্রিত করিয়া ইহার শুঁড়াও প্রস্তুত হইতে পারে ।

সাধারণ ক্রিয়া । কসেরুকা মার্জ্জার উপর ইহার কার্য্য অত্যন্ত প্রবল, বাহার দরুণ মস্তিস্কের নিম্নভাগস্থিত গতি এবং জ্ঞান উৎপাদক স্নায়ু-গুলি আক্রান্ত হইয়া কসেরুকা মার্জ্জার বে অংশ গৌণ কার্য্যের উপর শক্তি বিস্তার করে সে অংশই ইহা দ্বারা অধিক আক্রান্ত হইয়া থাকে । এই প্রকার কার্য্য দ্বারা স্নায়ু অতিরিক্ত পরিমাণে উত্তেজিত হইয়া পেশী গুলির অনিয়মিত গতি উৎপাদন করে । এই অনিয়মিত গতির অতিরিক্ত বৃদ্ধির দরুণ পেশীর ধসুঠকারের হ্রাস প্রবল আক্ষেপ বা সঙ্কোচনের উদ্বেক হয় এবং প্রতিক্রিয়ায় অবশেষে পেশীর কার্য্যের সম্পূর্ণ বিনাশ বা উহার পক্ষাঘাত হইয়া থাকে । ধসুঠকারের হ্রাস উক্ত প্রকার আক্ষেপ, হাত, পা, বুক, পৃষ্ঠদেশ ইত্যাদিই সমস্তের অধিক আক্রমণ করিয়া থাকে, বাহার দরুণ আক্ষেপ দ্বারা আক্রান্ত হইয়া শরীর পশ্চাদ্গতিকে ধসুঠকারের হ্রাস বীকিয়া পড়ে এবং তদরূপ স্বাস প্রশ্বাসের সহায়কারী পেশীগুলি অতি প্রবল বেগে সঙ্কুচিত হয় এবং তদরূপ স্বাস প্রশ্বাসের অত্যন্ত ব্যাঘাত জন্মে, এমন কি উহার দরুণ রোগীর স্বাসরোধও হইতে পারে : উহার সঙ্গে সঙ্গে মুখমণ্ডল, মাড়ি, গলার মধ্য, আহাঁর বহা গলনালী এবং অন্ত্র ও মূত্র যন্ত্রাদিরও আক্ষেপিক অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায় । এই সকল ভয়ানক অবস্থার দরুণও রোগীর মনের বিশেষ বিকৃতি জন্মিতে দেখা যায় না । উল্লিখিত ধসুঠকারের হ্রাস আক্ষেপ ক্রমাগত থাকে না । অর্থাৎ আক্ষেপ একবার হইয়া কতকক্ষণ অবস্থিতি করে এবং কতকক্ষণের প্ত সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয় ও সামান্য শব্দ কানে প্রবেশ করিলে বা সামান্য রূপে স্পর্শ করিলেই আক্ষেপের পুনরাক্রমণ হইয়া থাকে (ট্রায়ন্) । ইহা দ্বারা বিবাক্ত হইলে অবসন্নতার দরুণ বা স্বাস কষ্ট হইয়া রোগীব মৃত্যু হইয়া থাকে । শরীরের পরিপোষণের সহায়কারীবহ্ন এবং উহার কার্য্যের উপরও নাঙ্গ্ বমিকার কার্য্য অতি প্রবল । ইহা উক্ত বহ্নের নিঃসরণ পরিবর্তন করে, উহার কার্য্য বিকৃত করে এবং উক্ত বহ্নের পদার্থে পরিবর্তন আনিয়ন করিয়া পাকস্থলী, মলত্ব এবং অন্ত্রের অম্ল উৎপাদন করে । আহাঁর বহা নলীর (Alimentary Canal) শৈল্পিক বিলীতে উক্ত প্রকারের

উদ্ভেজনা হেতু অজীর্ণের লক্ষণাদি প্রকাশ পাইয়া কোষ্ঠবদ্ধ এবং খাঁস যন্ত্রাদিতে শুষ্ক শ্লেষ্মা উৎপাদন করিয়া শ্লেষ্মা দ্বারা নাসারন্ধ্র রুদ্ধ হয় এবং শুষ্ক কাশির উদ্ভেদ হয়। জননেন্দ্রিয় এবং মূত্র যন্ত্রের উপরও নাক্স-বমিকার কার্যের প্রথরতা দেখিতে পাওয়া যায়, যাহার দরুণ প্রথমতঃ উক্ত যন্ত্রগুলির অতিরিক্ত চাকলা এবং প্রতি ক্রিয়াতে উহার অবসন্নতা বা শিথিলতা দেখিতে পাওয়া যায়। ক্রমাগত আচারে অভ্যাস, অতিরিক্ত পরিমাণে ঘৃত মসলা দ্বারা রীঁধা জ্বাদি খাওয়া, মদ্যাদি উদ্ভেজক পানীয় জ্বাদি পান, উষ্ণকারক ঔষধ এবং এক সঙ্গে অনেকগুলি ঔষধ মিশ্রিত করিয়া সেবন এবং বহির্বাযুতে জ্বল চালানা না করিয়া সর্বদা ঘরে বসিয়া পাঠাদি মানসিক পরিশ্রম দ্বারা অজীর্ণ বা অন্তান্ত অসুখ হওয়া নাক্স-বমিকার একটা বিশেষ প্রাকৃতিক চিহ্ন মধ্যে পরিগণিত।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মন । সর্বদা কগড়া করার স্বভাব; সর্বদা চিড়্ চিড়্ করা; সকলের দোষ অনুসন্ধান করিয়া ধমকানো স্বভাব; খিট্ খিট্ করা; বিমর্ষভাব; একগুয়েমি (আগারিকাশ্, বোরাক্স্, ক্যাম্প্, ব্রাউ, ক্যাম্); সর্বদা অনর্থক সাবধান হওয়া; জিন্দাব ভাব এবং সহজেই চটিয়া যাওয়ার স্বভাব; ভীষণ ভাব এবং অশ্রুতে ঘৃণা করার স্বভাব; রোগী গোল মাল, কথা, বাদা, উগ্রগন্ধ অথবা উজ্জল আলোক সহ্য করিতে পারে না (বেল্, কল্‌চ্, ট্রামন্); সকল বিষয়েই রাগ হওয়া, এমন কি ভাল কথাতেও রোগী চটিয়া যায় (ক্যাম্প্, টাকিস্); সামান্য শব্দেও রোগী ভয় খায় (ওপিয়াম্); আপন বিষয় ভাবিয়াই সর্বদা চিন্তাসূক্ত থাকা; রোগী কোন প্রকারের ঔষধ সহ্য করিতে পারে না; সর্বদা আপন কাল্পনিক অসুখের বিষয় ভাবিয়া মনের অন্তান্ত উবেগ, আহারের পরই বাহার বৃদ্ধি হয়; বাহ্যিক মদ্যপানাদিতে অভ্যাস করে এবং বহির্বাযুতে জ্বলচালানা না করিয়া সর্বদা ঘরে বসিয়া থাকে, স্নানাদিগের পেটের অসুখ এবং কোষ্ঠবদ্ধ হওয়ার দরুণ সর্বদা মনের

উদ্বেগ এবং চিন্তা ; সময় যেন কাটে না (আলাম্) ; অত্যন্ত চিন্তা এবং মনের উদ্বেগ, বাহার দরুণ আত্ম হত্যার ইচ্ছা হয় (অরাম্, নেজা), কিন্তু রোগী মরিতে ভয় যায় ; সর্বদা হৃৎ প্রকাশ করা এবং কাঁদা ; কোন প্রকার লেখা পড়ার কার্য্য করিতে ভয় এবং অশক্তি (আলোজ্) ; রোগী কোন বিষয়ে ঠিক ভাবে চিন্তা কুরিতে পারে না (এথুনা, সিমিসিক্, জেল্‌স্, ফস্-আস্) ; একাকী থাকার ইচ্ছা ; কথা বলিতে ভুল যায় এবং কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে রোগী অসম্ভব দ্রুতের উত্তর দেয় ; রোগী পাগল হইলে তাহার অতি নিকট আত্মীয় বন্ধুগণকে মারিতে ইচ্ছা প্রকাশ করে ; মাতালদিগের মানসিক অন্তঃ (মনোঅবৃত্ততা,—Delirium Tremens) ; বীড়্ বীড়্ করিয়া প্রলাপ বলা (হায়োস্, মিউর-আস্, রাস্-টজ্) ; নেদা করিয়া বা স্নাত্তিজাগ-রণের দরুণ মনের অন্তঃ ; শারীরিক বা মানসিক সকল প্রকারের পরি-শ্রমেই অনিচ্ছা ।

মন্তক । • নেদা করিলে যেরূপ হয়, মাথায় সেরূপ গোলমালে বোধ বা মাথা ঝিম্ ঝিম্ করা (চায়না, গ্রাক্) এবং অবসন্ন বোধ (ওপিয়াম্) ; মধ্যাহ্নে আহারের পর মাথা ঘোরা, বাহার দরুণ মনে হয় যেন মস্তিষ্ক চক্রাকারে ঘুরিতেছে (আলাম্, আর্নিকা, বেল্, ব্রাই, কোনায়াম্) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কণিক অচেতনতা ; চলিবাব সময় মাথা টলে, বাহার দরুণ রোগী মনে করে যেন সে এক পার্শ্বে বা পশ্চাদিকে টলিয়া পড়িবে (বেল্) ; নেদা করিলে যেরূপ হয়, প্রাতঃকালে মাথায় সেরূপ গোলমালে এবং ভাবিবোধ ও মাথা ঝিম্ ঝিম্ করা (ক্রিয়াজ্) ; প্রাতঃকালে বিছানায়, ঘুম ভাঙ্গিলেই মাথা বেদনা (ক্যালী-বাই, নেট্রাম্-মিউর, নাইট্রিক্-আস) ; চক্ষু মেলিবার পূর্বেই মস্তিষ্কের মধ্য ভাগে বেদনাম্ভব ; কপালে বেদনা ; মাথায় পশ্চাৎভাগে বেদনা, বাহার দরুণ মনে হয় যেন মাথার হাড় কাটিয়া বাইবে (ব্রাই, নেট্রাম্-মিউর) ; কুড়ালী দিয়া আঘাত করিলে সেরূপ হয়, মাথায় সেরূপ বেদনা ; ঘুম না হইলে যেরূপ হয়, মাথায় সেরূপ বেদনা অন্তঃভূত হয়, বাহার দরুণ রোগী একবারে অবসন্ন হইয়া পড়ে ; বিছানা হইতে উঠিলেই মাথায় বেদনাদি থাকে না ; মাথাঘোরা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে চক্ষে ঝাপসা দেখা এবং কানে সৌ সৌ শব্দ হওয়া ; মাথা স্বাভাবিক

কষ্টানুভব ; সবিরাম বায়ুশূল যাহা চক্ষুর নিম্নভাগস্থিত ভ্রামুতেই অধিক
অন্তর্ভূত হয় এবং যাহা প্রায়ই প্রাতঃকালে বৃদ্ধি হয় ও বিছানায় শয়ন
করিয়া থাকিলে কখন কখন উপশম হয় ; এই প্রকার বায়ুশূল কাকি বা
মদ্যপানে অত্যাচারের পরই অধিক হইয়া থাকে ।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য । দাঁতে ছিড়িয়া ফেলা বা কসিয়া
থরার জ্বাৰ বেদনা, মানসিক পরিশ্রম, ঠাণ্ডা লাগিলে বা ঠাণ্ডা দ্রব্য খাইলে,
অথবা আহারের পর যাহার বৃদ্ধি হয় (আণ্টি-ক্লুড্, ল্যাক্, টাক্সিস্) ; কাকি
বা মদ খাইলে বেদনার বৃদ্ধি এবং উষ্ণ প্রয়োগে বেদনা বা যাতনায় উপশম
হয় (ব্রাই) : ক্ষয় প্রাপ্ত দাঁতে ছল কুটানের জ্বাৰ বেদনা, যাহার দরুণ উহার
নিকটবর্তী নাড়িস্থত সমুদয় দাঁতেই বেদনা অন্তর্ভূত হয় ; নাড়ি ক্ষীণ, সাদা এবং
চূর্ণকায় হইয়া থাকে এবং উহা হঠাৎ সহজে রক্ত পড়ে ; জিহ্বা সাদা গাঢ় লেপযুক্ত
(একন্, আণ্টি-ক্লুড, ব্রাই, পাল্‌স্) ; জিহ্বায় ঘোস্তার জ্বাৰ ফুসুড়া (বোরাক্স,
মার্ক্, নাইট্রিক্-অ্যাস্) ; জিহ্বায় ভারি বোপ এবং তদরূপ কথা বলিতে কষ্টানু-
ভব (কষ্ট্, জেল্‌স্, ব্যাক্) ; মুখের মধ্যে, জিহ্বা এবং তালুকা চট্ চট্ করে
ও উহা ছাল উঠিয়া যাওয়ার জ্বাৰ চট্ চট্ করে ; গলার মধ্যে শুষ্কবোধ,
কিন্তু পিপাসা অধিক থাকে না (এপিস্, ন্যাক্স-মক্, পাল্‌স্) ; কিন্তু মুখ
গহ্বরের পশ্চাৎভাগে (মার্ক্) অধিক পরিমাণে লাল সঞ্চিত হয় ; জিহ্বা
কালচে এবং কাটাযুক্ত ও উদান পার্শ্ব উজ্জ্বল লাল বর্ণ ; প্রাতঃকালে মুখে
বিস্বাদ (পাল্‌স্) থাকে বটে, কিন্তু আহার দ্রব্যাদির স্বাদ স্বাভাবিক বলিয়াই
অন্তর্ভূত হয় ; মুখে উষ্ণ স্বাদ (ক্যাক্-ক্যাক্, চায়না, ম্যাগ্নেচ, নাইট্রিক্-
অ্যাস্) ; মুখে তিক্ত স্বাদ (ব্রাই, ক্যেল্‌স্, চায়না, পাল্‌স্, সাল্‌ক্) ; মুখে চূর্ণক
(অগ্নিকা, অ্যাস্, অ্যাবোড, ক্রিস্‌জ, নাইট্রিক্-অ্যাস্) ; মুখ এবং গলার
মধ্যে পক্ষী বিশিষ্ট ঘা এবং উদাতে অত্যন্ত চূর্ণক ; রাত্রিতে মুখ দিয়া রক্ত-
মিশ্রিত লাল গড়াইয়া পড়ে ; চাপলে ন্যাদ শব্দ সহজে রক্ত পড়ে ; খুঁত
সঙ্গে স্রব্যাট থানা থানা রক্ত পড়ে । ছাল উঠিয়া গেলে যেরূপ হয়, গলার মধ্যে
সেরূপ অন্তর্ভূত হয় (এরাম, সাল্‌মেনেরিয়া) ; টাঁচিয়া ফেলিলে যেরূপ হয়, গলার
মধ্যে সেরূপ খশ্ খশে বোধ এবং চট্ চটানি (আর্জেন্ট্), গিলবার সময়
এবং শীতল বাতান টানিলে বাহ্যে অধিক অন্তর্ভূত হয় ; আহার বহা গল-

নালীর উপরিভাগ সঙ্কুচিত হয়, বাহার দরুণ কোন দ্রব্য গিলিবার ব্যাঘাত জন্মে; ডেলার জায় কোন পদার্থ লাগিয়া থাকিলে যেরূপ হয়, চোক গিলিবার সময় সেরূপ বেদনাত্তব (নেট্রাম্-মিউর); গলার মধ্য হঠাতে মুখের মধ্য পর্য্যন্ত আঁগা; গিলিবার সময় কানের মধ্যে স্থী বিধানের জায় অনুভূত হয়।

পাকস্থলী এবং উদর। কুখা থাকে, অথচ আহাবে (কটীতে) অরুচি (লাইকোপ্, নেট্রাম্-মিউর); জল, কাফি এবং তামাকে অরুচি; তিক্ত বা টক উদার (মালাম্, কার্বো-বেজ্, ফস্, সাল্ফ্); প্রবল হিক্কা (সিকুটা, হায়োস্, লাইকোপ্); বৃক্ জ্বালা (লাইকোপ্, নেট্রাম্-মিউর); মুখ দিয়া জল উঠা (লেডাম্); আহারের পর মুখ দিয়া জল উঠা; প্রাতঃকালে বমনোদ্বগ (ক্যাক্-কার্ব্, পাল্‌স্, সাল্‌ফ্); আহারের পর বমনোদ্বগ (আস্); তামাক খাইলে বমনোদ্বগ (ফ্রাম্‌স্) এবং উদার সঙ্গ সঙ্গ মূর্ছাবতাব (অটি-টার্ট); টক স্লেয়া অথবা উদরস্থ আহার বা পানীয় দ্রব্য বমন (ইপিকাক্, ফস্, পডোফ্); পিত্ত বমন (গ্রাটিওলা, আইনিস্, পডোফ্); রক্ত বমন (হামামেলিস্, ওপিয়াম্, পডোফ্, ষ্ট্যানাম্); কাঠ বমী, বাহার দরুণ মনে হয় যেন বমী হইবে, কিন্তু বমন না হইয়া গলা হইতে স্লেয়া নির্গত হয়; ত্রাণ্ডি মদ্য এবং চা খড়ি খাওয়ার ইচ্ছা; প্রাতঃকালে মুখে পচা বা তিক্ত স্বাদ; উদরস্থ আহার দ্রব্য, টক স্লেয়া এবং রক্ত বমন; গর্ভাবস্থার প্রাতঃকালে বমন (Morning sickness); পাকস্থলী প্রদেশ স্পর্শ করিলেই বেদনাত্তব হয় বা টাটায়; পাকস্থলীতে আঁকড়িয়া ধরা বা খিলধরার জায় বেদনা বা বাতনা (বেল্, ককিউলাম্); উদরোদ্ধ প্রদেশে পূর্ণ এবং ষাটিয়া ধনাত্ত জায় অনুভূত হয়; আহারেব ১ বা ২ ঘণ্টা পর পাকস্থলীতে চাপা বোধ (পাল্‌স্) এবং উদার সঙ্গ সঙ্গ নাথা যেন কেমন কেমন করে এবং রোগী বসিয়া তাহার আপন অস্থেব বিষয় চিন্তা করে; একু থানি পাথর চাপিয়া থাকিলে যেরূপ হয়, পাকস্থলীতে সেরূপ চাপা বোধ (আস্, ব্রাই, পাল্‌স্), আহারের পব গলা অধিক অনুভূত হয়; অতিরিক্ত আহাব, মদ্য পানে অত্যাচার, অধিক মসলাদি দ্বারা রাঁধা আহার দ্রব্যাদি খাওয়া; অতিরিক্ত ঔষধ সেবন, নির্জ্জনে বাস ইত্যাদির দরুণ

পেটের অন্থঃ ; পাকস্থলীর মধ্যে টাচিয়া ফেলার স্তায় আলাহুত্বঃ ; পাকস্থলীতে দগ্ধপানি । যকৃত প্রদেশে সূচী বিধানের স্তায় বেদনা, নড়া চড়া বা আঘাত লাগিলে যাহার বৃদ্ধি হয় (ব্রাই, চায়না) ; ফোড়া হইলে যেক্রপ হয়, যকৃতে সেক্রপ দগ্ধপানি ; কামল রোগ (চেলিডন্, মার্ক্) ; আহায়ে অকুচি ; মুচ্ছার ভাব ; যকৃতের পিত্তাধারে শিলা (Gallstone) (চায়না) ; আহারের পর দূষিত বায়ু সঞ্চিত হইয়া উদর ক্ষীত হয় (চায়না, লাইকোপ্, নাক্স-মক্, রাস্ টক্স) ; উদরে গড়্ গড়্ কল কল শব্দ হওয়া (লাইকোপ্) ; প্রাতঃকালে উদরে উক্ত প্রকারের শব্দ হয় ; উদরে দূষিত বায়ুর সঞ্চারণ হেতু শূল বেদনা ; অঙ্গীর্ণের দরুণ পেটে বেদনা ; অতিরিক্ত পরিমাণে আহা-রের পর পেটে বেদনা ; ঠাণ্ডা লাগিয়া পেটে বেদনা (ডাক্, মার্ক্) ; কোষ্ঠ-বিশিষ্ট পাথর লাগিয়া থাকিলে যেক্রপ হয়, পেটে সেক্রপ বেদনা বা যাতনা (কলোস্) ; পেট কামড়ানী ; পেটে চিন্ চিনে বেদনা ; প্রাতঃকালে কোন জ্বাৰা খাওয়ার পর বা মধ্যাহ্নে আহাের পর কোন এক নির্দিষ্ট সময়ে পেটে বেদনা ; পেটে বেদনা যাহার দরুণ রোগী হাঁটু শুটাইয়া জড়মড় হইয়া থাকিতে বাধ্য হয় (আলোজ্, কষ্ট্, কলোস্, আইরিস্, ক্রম্) ; দূষিত বায়ু বদ্ধ হইয়া থাকিলে যেক্রপ হয়, ক্ষুদ্র পাক্সরার হাড়ের নীচে সেক্রপ চাপা বোধ (কার্বো-বেজ্) ; অস্থের মধ্যে থোঁলিয়া যাওয়া বা মোচড়াইবা পড়ার স্তায়, আলাগুক্ বেদনা বা যাতনা (মার্ক্) ; উদরে কর্জনবৎ বা চিন্চিনে বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বমনের ইচ্ছা ; কুচ্কির ঠিক উপরিভাগে যেন অল্প বেষ্ট ঝিল্লী বাহির হইয়া পড়িবে এক্রপ অনুভূত হয় (আলাম্, নাইট্ ক্-আস্) ; উদরের উপবিস্তৃত পেশীর স্পন্দন এবং উহার ঝাকনী ।

মল এবং মলদ্বার । অন্ধ অর্শ (Blind-Piles) রোগ, অর্থাৎ যাহাতে রক্ত পড়ে না, এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে শুষ্ক এবং শুষ্ক দ্বায়ে ঘটিয়া ধরা, চাপিয়া ধরার স্তায় বা দগ্ধপিয়া বেদনা, মলত্যাগের পর, আহাের পর এবং চিন্তা করিলে যাহার উদ্বেক বা বৃদ্ধি হয় ; অনিবার্য্য কোষ্ঠবদ্ধ এবং ব্যর্থার বাস্তব বেগ, কিন্তু বেগ দিলে মল নির্গত হয় না (আব্রা, কোনায়াম্, নাইট্ ক্-আস্, সাইলিসি, সালফ্) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে শুষ্কের সঙ্কোচন ; মলত্যাগের পর (কোষ্ঠ পরিষ্কার হইলেও) মনে হয় যেন শুষ্কের মধ্যে আরো

মল জাগিয়া রহিয়াছে (আলোজ, লাইকোপ্); ল্যাবারক্রমে কোষ্ঠবদ্ধ এবং উদরাময় (আন্টি-ক্লড, ক্যাডুয়াস্ মেরিয়াস্, সিমিসিক্, নেটাম্-আস্, পডোফ্); মল ত্যাগের সময় মলের সঙ্গে উজ্জল লালবর্ণ রক্ত নির্গমন এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গুহে আঁটাবোধ ও উহার সঙ্কোচন; উদরাময়, বিশেষতঃ প্রাতঃকালে, মল কাল্চে (ক্লেমেক্স, সাল্ফ); অল্প পরিমাণ, চট্‌চটিয়া রক্ত মিশ্রিত শ্লেষ্মা ভেদ এবং উহাব সঙ্গে সঙ্গে বারবার কৌথপাড়া বা বাহ্যের বেগ ও পেট কামড়ানি; মল ত্যাগের পরই কৌথপাড়া এবং পেট কামড়ানি সারিয়া যায়; লম্বা, মোটা এবং কঠিন নেড় মলত্যাগ; স্বাভাবিক মল এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে রক্ত মিশ্রিত শ্লেষ্মা নির্গমন; রক্ত মিশ্রিত আঁকাতরার স্থায় কাল মল ত্যাগ; অন্ধ এবং রক্ত শ্রাবক অর্শ যোগ (Blind and Bleeding Piles)।

মূত্রে যন্ত্র । বারবার কষ্টদায়ক মূত্র ত্যাগের ইচ্ছা (ক্যাছ) এবং বেগ দিলে কোঁটায় কোঁটায় মূত্র নির্গমন (একন্, বেল, ক্যাছ) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মূত্র নালী এবং মূত্রাধারের গ্রীবা দেশে জালাযুক্ত এবং ছিঁড়িয়া ফেলার স্থায় বেদনা বা যাতনা (এপিস্, ক্যাছ, ক্যানাবিস্-স্যাট, ক্যাস্প); মূত্র মলিন, গাঢ়, সাদাটিয়া এবং পূর্ব মিশ্রিত, লাল্চে এবং ইটের গুঁড়ার স্থায় তলানি বিশিষ্ট; মূত্রের সঙ্গে চট্‌চটিয়া আঁঠা শ্লেষ্মার স্থায় পদার্থ নির্গমন, বাহার দ্রুণ মূত্র নালীতে কোনও যাতনা অনুভূত হয় না; মূত্রাধারে পাথরীর সন্ধার (Stone in the Bladder) হেতু মূত্রবস্ত্র প্রদেশে বেদনা যাহা পা পর্যন্ত ও বিস্তৃত হয়; রক্ত মূত্র ত্যাগ।

জননেন্দ্রিয় । পুরুষের সহজেই স্ত্রীসহবাসের ইচ্ছা হয় (কোনা-রাম); পুরুষাঙ্গ বারবার খাড়া হয়, বিশেষতঃ প্রাতঃকালে, বাহার দ্রুণ রোগী অত্যন্ত কষ্ট অনুভব করে; রাত্রিতে স্ত্রীসহবাস বিষয়ে স্বপ্ন দেখিয়া অনিচ্ছা পূর্বক ধাতু নিঃসরণ; অতিরিক্ত পরিমাণে ঘৃত মসলা দ্বারা রাঁধা দ্রব্যাদি খাইয়া বা স্ত্রীসহবাসে অত্যাচার বা হস্ত মৈথুন হেতু স্বপ্নে ধাতু নিঃসরণ; অগুরুতবে সঙ্কোচক বেদনা। স্ত্রীলোকের নিয়মিত সময়ের অনেক পূর্বে, প্রচুর পরিমাণে বা অতিরিক্ত রজঃশ্রাব (আলাম্, আব্বা, আমন্-কার্ক, বেল, ক্যাক্স-কার্ক); রক্ত কাল্চে, রজঃশ্রাবের সময় প্রাতঃকালে বমনো-

দেখা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে শীত বোধ ও কখন কখন ঘূর্ণী বাওয়া ; কোন মাসেই নিয়মিত সময়ে রক্তঃস্রাব হয় না ; কষ্টকর রক্তঃস্রাব এবং বাথকের বেদনা (Painful Menstruation) ; জননেদ্বিগ্নে চাপা বোধ, প্রাতঃকালেই যাহা অধিক অমুভূত হয় ; জরায়ুতে সঙ্কোচন বা আক্ষেপ এবং বেদনা ও জরায়ু হইতে জমাট থানা থানা রক্ত নির্গমন (কলোফিলাম্, সিকেল্) ; দুর্গন্ধযুক্ত স্বেত প্রদর নিঃসরণ মাথা কাপড়ে লাগিয়া শুকাইলে হরিদ্রাবর্ণ হয় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে জরায়ুতে বেদনা ; মূত্র নিক্ষেপা প্রসব বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বারম্বার মল, মূত্র ত্যাগের ইচ্ছা ; কৌথ-শাড়া বা কোন ভারি দ্রব্য উঠানের দরুণ জরায়ু স্থান ভ্রষ্ট হওয়া বা নিম্ন দিকে সরিয়া পড়া ।

শ্বাস যন্ত্র । স্বভঙ্গ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গলার মধ্যে থল্ থল্ এবং চাঁচিয়া ফেলার জ্বা অমুভূত হওয়া (কষ্ট), বাহার দরুণ কাশির উদ্রেক হয় ; বায়ুনের উপরিভাগে চট্‌চটীয়া আঠা স্বেদ্যাব সঞ্চার (ব্রাউ, ক্রমেজ্) ; বায়ুনের মধ্যে চুনকানি বা স্ফু-স্ফু, যাতার দরুণ কাশির উদ্রেক হয় (ব্যারাইটা-কার্ক) ; শ্বাস কষ্ট ; বৃক্কের নিঃস্রাবের সঙ্কোচন হেতু শ্বাস প্রশ্বাসে আঁটা বোধ (ইয়েন্স, লেবোন্স), বাধা চলিয়া বেড়ান এবং উচ্চস্থানে উত্তিবার সময়ক অধিক অমুভূত হয় ; শুষ্ক, প্রান্ত্র জনক কাশি (ক্রমেজ্), ব্রাউ হই প্রহরের পর হইতে ভোর বেলা পর্যন্ত সাধাব উদ্রেক হয় ; সঞ্চার সময় শ্বসন করিলে কাশির উদ্রেক (কোনাগাম্, হায়েন্স, বেজিয়ারগাম্, পাল্‌স), অথবা অতি প্রচুর কাশির উদ্রেক ; প্রাতঃকালে নিভানা হইতে উত্তিবার পূর্বে প্রবল কাশি এবং কাশিতে কাশিতে গলা দিয়া থানা থানা রক্ত নির্গমন (পাল্‌স) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বৃক্ক টাটানি (জার্বিকা) ; কাশিতে কাশিতে উদর প্রাচীরে মোচড়াইয়া পড়ার জ্বা বেদনা এবং মাথা ধরার দরুণ যেন হয় যেন মাথা কাটিয়া বাইবে (ব্রাউ, নেট্রান্-মিউর) ; আহার বা পানের পর কাশির বৃদ্ধি (চারনা) ; শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রমের পর, তিত হইয়া শ্বসন করিলে, ঠাণ্ডা লাগিলে, তামাক খাইলে কাশির বৃদ্ধি ; একসে বোকা চাপিয়া থাকিলে যেকোন ভাবে বৃক্কের চাপা বোধ (কেব্রাম্, কন্স) ; পাঞ্জরার হাড়ের মধ্যবর্তী স্থানের দ্রাবুশ্ল, অস্থি পার্শ্বে শ্বসন

কক্ষিক-যাহার উপশয় হয়; বৃক্কের মধো বশ্শশে বোধ এবং চাঁড়িয়া ফেলার স্থায় জ্বালা এবং চিঁড়ি-বা টাটানি (কাম); বৃক্ক রক্তাধিকা বা রক্তাবরোধ এবং উহাতে জ্বালা ও উচ্ছ্বাস্তব; যদি শুকাইয়া বাইয়া শুষ্ক কাশি।

হৃৎপিণ্ড এবং নাড়ী। মধ্যাহ্নে আহারের পর শয়ন করিয়া থাকিলে হৃৎস্পন্দন; আহারের পর হৃৎস্পন্দন; কাকি বাওয়ার পর হৃৎস্পন্দন; অনেকক্ষণ ধারিয়া পুস্তকাদি পাঠের পর হৃৎস্পন্দন।

গ্রীবা এবং পৃষ্ঠদেশ। গ্রীবাদেশে ভারিবোধ এবং উহা শক্ত হয় বা নোয়ান যায় না; ঘাড় এবং পৃষ্ঠদেশে ছিঁড়িয়া ফেলার স্থায় বেদনা; খেঁতলিয়া গেলে, মোচড়াইয়া পড়িলে বা ভাঙ্গিলে বেরূপ হয়, পৃষ্ঠদেশে সেরূপ বেদনা (আলোক, বেল, দিগম্বিক, ক্যালী-কার্ক, নেট্রাম-মিউর, প্লাটিনা); পৃষ্ঠদেশে আক্ষেপিকরূপে ধনুকের স্থায় বাকিয়া পড়ে (সিকুটা, ওপিয়াম); ঘাড় এবং কন্ধের স্নায়ুশূল, যাহার দক্ষণ ঘাড় শক্ত হয় বা উহা নোয়ান যায় না, প্রাতঃকালে, আহারের পর এবং স্পর্শনে যাহার বৃদ্ধি হয়; দুই কন্ধের মধ্যবর্তী স্থানে মোচড়াইয়া পড়া বা খেঁতলিয়া বাওয়ার স্থায় বেদনা; পৃষ্ঠদেশে মোচড়াইয়া পড়ার স্থায় বেদনা, শেষ রাত্রি ৩টা হইতে ৪টা পর্যন্ত যাহার বৃদ্ধি হয়।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, হাত, পা ইত্যাদি। অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এবং উহার সন্ধিতে মোচড়াইয়া পড়ার স্থায় বেদনা বা যাতনা প্রাতঃকালে বিছানায় শয়ন করা কালীন যাহার বৃদ্ধি হয়; অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কাঁপনীয় এবং হৃৎপিণ্ডের কাকনি; বহির্বাযু সেবনে সমুদয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গে অবশ এবং শিথিল হওয়ার ন্যায় বোধ হয়; প্রাতঃকালে হাত পায়ে তঠাৎ অবশ বোধ; বাহু, হাত এবং পায়ের পাতার অসাড় বোধ হয়; বাহু পক্ষাঘাত এবং উহাতে দন্দপানি, যাহার দক্ষণ মনে হয় যেন ধমনি ফাটিয়া এক্ত বাতির হইয়া পড়িবে। চলিবাক সমস্ত পা ইত্যাদি শরীরের নিম্নাংশের কাঁপন এবং তদক্ষণ উলিয়া পড়া; হাঁটুর সন্ধির পশ্চাৎভাগে যেন সর্কদা আঘাত করিতেছে এক্ষণে অনুভূত হয়; রোগী পায়ের পাতা টানিয়া টানিয়া চলে; পক্ষাঘাতে বেরূপ হয়, উরু এবং পায়ের ডিমের পেশীতে সেরূপ কদিয়া ধরা, চলিয়া

বেড়াইবার সময় বাহাতে অত্যন্ত বেদনার উদ্রেক হয়; হাঁটুর নিক্তি অভ্যন্ত ক্ষীত এবং বেদনাবৃত্ত; হাঁটুর নিক্তির পশ্চাৎ ভাগ শক্ত হয় এবং উহাতে কসিনাধারার ভায় বেদনা অহুত্বত হয়; এই বেদনা দাঁড়াইলেই অধিক অহুত্বত হয়; বস। অবস্থা হইতে দাঁড়াইলে পেশীর অগ্রভাগ খাট বলিয়া অহুত্বত হয়; পায় অবশ এবং অসাড় বোধ হয়; রাত্রিতে পায়ের ডিমে খিল ধরা (ক্যাঙ্ক-কার্ক, নাইটি ক্-আস, সাল্ফ)।

নিদ্রা। দিনের বেলা নিদ্রার অত্যন্ত ইচ্ছা এবং অনবরত হাই তোলা (নাক্স-মক্); আহারের পর অনেকক্ষণ পর্যন্ত অনিবার্য নিদ্রাবেশ বা নিদ্রার ইচ্ছা (ক্যালী-কার্ক, সাইলিসি, ব্রাই, কস্); সন্ধ্যার সময় অত্যন্ত নিদ্রাবেশ বা ঘুমের ইচ্ছা এবং রাত্রিতে ঘুম হয় না; শেষ রাত্রি ৩ টার সময় ঘুম ভাঙ্গিয়া মনে নানা প্রকারের চিন্তার উদয় হয় এবং ২১০ ঘণ্টা জাগিয়া থাকিয়া ভোর বেলা রোগী পুনরায় ঘুমাইয়া পড়ে, তখন রোগীকে জাগান কষ্টসাধ্য হয় এবং জাগিলে রোগী অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়ে এবং সে বিছানা হইতে উঠিতে চাহে না; রোগী প্রায়ই চিত হইয়া শয়ন করিয়া ঘুমা; ঘুমেরঘোরে রোগীর শ্বাস প্রশ্বাসে গৌ গৌ শব্দ হয়, বা তাহার নাক ডাকে (সেরোস্, ওপিগ্রাম্); স্বপ্নে নানা প্রকারের ভয়ানক স্বপ্ন দেখিয়া রোগী অত্যন্ত ভীত হয়।

জ্বর। শীত কল্প সমুদয় শরীরেই অহুত্বত হয় এবং শীত কল্পের সঙ্গে সঙ্গে শরীরের, বিশেষতঃ হাত পায়ের, আঙ্গুল এবং নখ নীল বর্ণ হয়; সন্ধ্যার সময় শয়ন করিয়া থাকিলে শীত কল্প (নাইটি ক্-আস) এবং তৎপর শক্তি এবং সুখমণ্ডল উৎক হয়; উত্তাপেও শীত নিবারিত হয় না; নড়া চড়াতে শীতের বৃদ্ধি; শুষ্ক উষ্ণাত্তব, যাহার দরুণ গায় কাপড় সঙ্ক হয় না, অথবা রোগী গায়ে কাপড় বাধিতে চাহে না, আবার গায়ের কাপড় ফেলিয়া দিলেই শীতবোধ হয়; শীতের পূর্বেই শরীর গরম হয় এবং শীতের পর উত্তাপে বৃদ্ধি হয়; রাত্রি দুই প্রহরের পর বা প্রাতঃকালে ঘর্ম; ঘর্ম টক এবং দুর্বলকৃত (অগিকা, আস্, কার্কো-আনিমেল্, হিপ্-সাল্ফ, সাইলিসি); মুখ বগলে ঠাণ্ডা চট্‌চটয়া ঘর্ম (ক্যাম্ফার, বিরেট্-আস্); সবিরাম বা পালা জ্বর এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বমন বা বমনোদ্বেগ; প্রাতঃকাল এবং সন্ধ্যার

সময় অঙ্গের আক্রমণ বা বৃদ্ধি; শীতলাবস্থার গৃহীতবেশ এবং কোমরে বেদনা এবং পার্শ্ব ও উদরে বোঁচানি; উষ্ণাবস্থার মাথাঘোরা, বাথা বেদনা, সামান্য মড়া চড়াতে বা গায়ের কাপড় কেলিগেই শীত কম্পের উল্লেখ হয়; পিপাসা, লুণ্ঠন জলাদি পানে অনিচ্ছা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গলায় মধ্যে শুকাইতব, বমনোদেগ বা টক বা তিক্ত স্বাদ বিশিষ্ট পিত্তবমন; ঐক্য-হিক বা ত্র্যাহিক জ্বর (Quotidian and Tertian Fevers); নাড়ী পূর্ণ এবং দ্রুতগামী, অথবা ক্ষুদ্র, দ্রুতগামী, হ্রস্বল, অথবা অসম (Intermittent)।

ব্যবহার। অতিরিক্ত পরিমাণে ঘৃত, গরম মসলা দ্বারা স্নানাদি প্রাণাচার, কাফি বা তামাক খাওয়া, বা মদ্যপানে অত্যাচার হেতু অস্থখ; নানা প্রকারের ঔষধ একত্রে মিশ্রিত করিয়া সেবন, উষ্ণকারক ঔষধ সেবন, হাড়ুড়িয়া বৈদ্যের ঔষধ সেবন জনিত অস্থখ; অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম, কোন প্রকারের শারীরিক পরিশ্রম না করিয়া সর্বদা ঘরে বসিয়া থাকা, অতিরিক্ত আহার এবং নিদ্রাশূন্যতা জনিত অস্থখ; কোন নির্দিষ্ট সময়ে বা সবিরাম অস্থখ; পাকস্থলী, যকৃত এবং অঙ্গের অস্থখ, প্রধানতঃ অঙ্গীর্ণ, কামলরোগ, কোষ্ঠবদ্ধ; অস্থবৃদ্ধি; বক্রপ্রদাহ; অর্শরোগ (রক্তশ্রাবক এবং অন্ধ অর্শ,—Bleeding and Blind Piles); আপন রোগ বিষয়ে সর্বদা চিন্তা করিয়া মনোরোগ (Hypochondriasis); সংজ্ঞাশ রোগ; স্নেহাজনিত অস্থখ,—যথা নাসিকা সঙ্কীর্ণ সর্দি, বায়ুনলপ্রদাহ, অঙ্গের স্নেহাজনিত রোগ, মূত্রনালী বা যোনি দ্বারা প্রেয়া নির্গমন; প্রচুর বা অতিরিক্ত রক্তস্রাব; মুখমণ্ডলস্থ স্নায়ুশূল; বাত রোগ; ক্ষুদ্র সন্ধিবাত রোগ; আক্ষেপ (Convulsions); পক্ষাঘাত; সকল প্রকারের পালাজ্বর; কোইনাইন দ্বারা আটকান জ্বর; একজ্বর; মাতাঙ্গদিগের মানসিক বিকার বা মদোন্মত্ততা (Delirium Tremens), শিরঃপীড়া, মাথাঘোরা; মাতাঙ্গদিগের শিরঃপীড়া; অতিরিক্ত পাঠাদি মানসিক পরিশ্রম জনিত শিরঃপীড়া; সর্দি বসিয়া যাওয়া এবং তদ্রূপ নানা প্রকারের অস্থখ; দন্তশূল; পাকস্থলীতে বেদনা বা বাতনা; পাকস্থলী প্রদাহ; গর্ভাবস্থায় বমন বা বমনোদেগ; আক্ষেপিক এবং উদরে দূষিত বায়ু জনিত শূলবেদনা বা বাতনা;

পিত্তাধিক্য হেতু শূলবেদনা বা বাতনা ও উদরাময় ; আঁশাশয় ; দান্ত্রবেষ্ট
বিল্লীপ্রদাহ (Peritonitis) ; কষ্টকর রজঃস্রাব এবং বাধকের বেদনা
(Painful Menstruation) ; শ্বেতপ্রদর ; সন্তান প্রসবের পর দান্ত্রবেষ্ট বিল্লী-
প্রদাহ (Puerperal Peritonitis) ; ধ্বজভঙ্গ ; সর্দি শুকাইয়া যাওয়া
দক্ষণ কাশি ; কোমরে বাতের বেদনা, কুচকি বাত ইত্যাদি অস্থখে নাস্ত্র-
বমিকা ব্যবহার্য্য ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । সমুদয় ইঞ্জিয়ার অতিরিক্ত চেতনা ;
সমুদয় শরীরেই এক প্রকারের সঙ্কোচক বেদনা বা বাতনা ; সামান্য স্পর্শে
আক্ষেপের হৃদ্বি ; খিট্‌খিটে স্বভাব ; শীর্ণকায় বিশিষ্ট রোগীর লক্ষে উপকারী ;
পিত্তাধিক্য ধাতু ; সমুদয় শরীরের অস্পন্দমান স্পন্দন ; সমুদয় শরীরে ভারিবেশ ;
মহাপান, অতিরিক্ত তানাকু বাওয়া, অধিক পরিমাণে ঘ্রত, গরম মনসা
ঘরা রাঁধা দ্রব্যাদি খাওয়া, রাত্রি জাগরণ, অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম,
কোন প্রকারের শারীরিক পরিশ্রম না করিয়া সর্বদা ঘরে বসিয়া থাকার
দক্ষণ অস্থখ ; মানসিক পরিশ্রমে, প্রাতঃকালে আহারের পর, বিশেষতঃ
মধ্যাহ্নে আহারের পর, নড়াচড়াতে, সামান্য স্পর্শনে, বহির্বায়ুতে, শুক
বাতাসে অস্থখের হৃদ্বি ; প্রবল প্রচাপনে বেদনা বা বাতনাদির উপশম
ইত্যাদি নাস্ত্র-বমিকার কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ । কসেফকার উপর নাস্ত্র-বমিকার কার্য্যের
সচিহ্ন ইথেরিয়া এবং ওপিয়ামের কার্য্যের অনেক সাদৃশ্য আছে । আটো-
পিয়াম কার্য্যের সঙ্গেও নাস্ত্র-বমিকার কার্য্যের সাদৃশ্য আছে । এতদ্ভিন্ন
কোন কোন বিষয়ে নাস্ত্র-বমিকার কার্য্যের সঙ্গে আমোনিয়াম্ মিউরিয়্যাটি-
কাম্, আমোনিয়াম্ কালোনিয়াম্, আদিনিয়াম্, বেলাডোনা, ট্রাইওনিয়াম্,
ক্যালেকেরিয়া-কার্ক, কার্কো-বেজিটেবিলিস্, ক্যামোমিলা, চায়না, ককিউ-
লাস্, ককিয়া, কুশ্রাম্, ইপিকাক্, লাইকোপডিয়াম্, মার্কিউরিয়াম্, কক্ষ-
রাস্, পাল্‌মেটিনা, পিপিরা এবং রাস্‌ট্র- ইত্যাদি ঔষধের কার্য্যের সাদৃশ্য
আছে ।

প্রতিষেধক ঔষধ । একোনাইট্, বেলাডোনা, ক্যাক্সার, ক্যামো-
মিলা, ককিয়া, ককিউলাস্, ইথেরিয়া, পাল্‌মেটিনা, নাস্ত্র-বমিকার প্রতি-

বেধক ঔষধ মধ্যে পরিগণিত। অধিক মাত্রায় নাক্স-বমিকা দ্বারা বিবাক্ত হইলে ক্যান্সার, কাফির কাত, স্ফ্রা এবং আফিম ব্যবস্থা।

ডাইলুশন বিচার। মূল আরোক হইতে ২০০ ডাইলুশন পর্যন্ত ব্যবহার করিয়া জ্ঞানরা ফল পাইয়া থাকি। ৬, ১২ এবং ৩০ ডাইলুশনই সচরাচর অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অরে লেখক ১২ ডাইলুশনই সচরাচর অধিক ব্যবহার করিয়া থাকেন। কোষ্ঠবদ্ধে ৩০ ডাইলুশনই সচরাচর ব্যবহার্য। ডাক্তার বেজ (Dr. Bayes) বলেন যে, অনিবার্য কোষ্ঠবদ্ধ, অথবা অনেক দিনের পুরাতন আকারের কোষ্ঠবদ্ধে ৬ষ্ঠ ডাইলুশন বিশেষ উপকারী। পুরাতন আকারের পেটের অন্রুখে এবং শিরঃস্ফীড়ায় ২০০ ডাইলুশনে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। মাতীলমিগের বমন, শিরঃস্ফীড়া এবং মদোন্মত্ততাতে (Delerium Tremens) ১ম দশমিক ডাইলুশন, ১ ফোঁটা মাত্রায় বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। আবার মদোন্মত্ততাতে অনেক সময় এই ঔষধের মূল আরোক, ১ ফোঁটা মাত্রায় ব্যবহার করিয়া লেখক বিশেষ ফল পাইয়াছেন। শিশুগণের রোগ চিসিংসায় লেখক প্রায়ই ৩০ ক্রম ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। কোন কোন চিকিৎসক নাক্স-বমিকার ১ম বা ২য় দশমিক ক্রমের ঙ্গড়াও ২।১ গ্রেইণ্ মাত্রায় ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।

ওপিয়াম্,—আফিম,—ওপিয়াম্ ।

(OPIUM,—OPL)

একভাগ আফিম এবং ২০ ভাগ প্রক্ স্পিরিট একত্রে মিশ্রিত করিয়া যথা নিয়মে ইহার মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে। যথা নিয়মে সুগার অবমিক্ এর সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া ইহার ঙ্গড়াও প্রস্তুত হইয়া থাকে। আফিম কোন এক বিষমত হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয় হইতে ক্রয় করা উচিত।

সাধারণ ক্রিয়া। মস্তিষ্ক এবং কপেরকা মজ্জা সঞ্চীয় ও সিম্প্যাথেটিক্ স্নায়ুগণের (Sympathetic nerves) উপর ইহার কার্য দেখিতে পাওয়া যায়, যাহার দরুণ ইহা উক্ত স্নায়ুগণকে প্রথমতঃ কতক-কালের জন্য উত্তেজিত করিয়া তৎপর উহাকে শীঘ্র শীঘ্র অবসন্ন করিয়া উহার

কার্যের শক্তির পক্ষাঘাত অনিয়ম কৰে, বাহার দক্ষণ উক্ত জায়বিক দণ্ডনীর জড়তা উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা বিষাক্ত হইলে মস্তিষ্কের শক্তির হ্রাস বা বিনাশ হইয়া অন্ধজ্ঞান রহিততা (Stupor) উৎপন্ন হয়, গতি এবং জ্ঞান উৎপাদনের শক্তির বিনাশ হয়, শৈল্পিক বিস্তারিত নিঃসরণ স্থিতিয়া যায় এবং শৈল্পিক বিস্তারিত উল্লিখিত উদ্ভাবনা প্রাপ্ত হয় ও উহাতে রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ হইয়া থাকে। শ্বাসপ্রশ্বাস কার্য্য মুহু এবং বিলম্বে বিলম্বে ও অনিয়মিতরূপে সম্পন্ন হয়; হৃৎপিণ্ডের কার্য্যের ব্যাঘাত জন্মে এবং এই প্রকার মস্তিষ্ক এবং কেসেরকা মজ্জাব পক্ষাঘাত অনেককাল অবস্থিতি করিলে রোগীর মৃত্যু হইয়া থাকে। যদি রোগীর মৃত্যু না হয়, তবে পুষ্টিপাক কার্য্যের বৈলক্ষণ্য হয়, মাথা ধর, নিদ্রাশুলতা এবং কোষ্ঠবদ্ধ থাকিয়া যায়। মস্তিষ্কের কার্য্যের অবসন্নতা এবং তদ্রূপ অত্যন্ত নিদ্রাশুলতা বা অন্ধজ্ঞান রহিততা ও উহার সঙ্গে সঙ্গে নিশ্বাস প্রশ্বাসে গৌ গৌ, ঘড় ঘড় শব্দ হওয়া ও পিয়ামু দ্বারা বিবাক্ত হওয়ার বিশেষ প্রাকৃতিক চিহ্ন বা লক্ষণ মধ্যে পরগণিত।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মন । জ্ঞান বা চেতনাব সম্পূর্ণ বিনাশ (বেল, হারোস, লরোস) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে নিশ্বাস প্রশ্বাসে গৌ গৌ, ঘড় ঘড় শব্দ হওয়া ও বাহ্যিক বিষয়ে জ্ঞান রহিততা, অর্থাৎ স্থপ চেতনাব জ্ঞান কিছুই থাকে না ; প্রলাপ ; চক্ষু বিস্তৃতরূপে খোলা এবং উজ্জ্বল বা চকচকে, মুগ মণ্ডল লালবর্ণ এবং শোণের হ্রাস উল্লিখিত : অত্যন্ত কষ্ট এবং ভয় উৎপাদক স্বপ্ন বা দৃষ্ট দেহা (আনিসিষ্ট, বেল, হারোস, হোমন, ; নেসা হটসে বেক্রপ হয়, বেক্রপ অন্ধচেতনাবস্থায় পড়িয়া থাকা ; চক্ষু যেন অগ্নি, উষ্ণ এবং শুষ্ক হয় (বেল) ; নদোপান করিলে বেক্রপ হয়, রোগী বেক্রপ পড়িয়া থাকে (নাক্স-মক্স) ; কার্য্যিক বিষয় শুনি যেন স্পষ্ট দেখা যায় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত উত্তাপ (ক্যানাবিস-ইণ্ড) ; সৰ্বদা স্নায়বিক ও চিড়চিড়ে ভাব ; সহজে ভয় হওয়া (নাক্স-বন) এবং চমকিতা উত্তার হতাপ (টম্পেস, কাগী-কার্ক, নেটাম মিউব) ; রোগী (দ্রোণাক) মনে করে, বেনসে বাড়িতে নাই (ব্রাই) ; শরীর শক্তির সম্পূর্ণ বিনাশ (হাটডুটি) ; নদোপাতন (Delirium Tre-

mens) এবং তদ্রূপ ইন্দিয়াদির চেতনা থাকে না এবং স্বাস প্রবাসে গৌ গৌ, ঘড়্ ঘড়্ শব্দ হয়; সংজ্ঞাশ্লোক এবং তদ্রূপ চেতনা রহিত এবং মুখ মণ্ডল লালবর্ণ এবং শোণের জ্বার টল্ টলে হয়; চক্ষু অর্দ্ধ খোলা (শিবচক্ষু), চক্ষুর তারা বিস্তৃত, কখন বা সঙ্কুচিত এবং উহাতে আলোক জ্ঞান থাকে না; মুখে ফেলা উঠে এবং গৌ গৌ করিয়া নাক ডাকে ।

মস্তক । মাথায় গোলমেলে, চিমা এবং ভারিবোধ (নাক্স-বম্) ; নেসা করিলে যেকপ হয় সেরূপ মাথা ঘোবা (চারনা, ককিউলাস্, নাক্স-মফ্, নাক্স-বম্, পাল্) ; মাথায় রক্তাধিক্য বা রক্তাববোধ এবং উহাতে দপ্-দপানি (বেল্) ; কপালের দুই পার্শ্ব এবং কর্ণের পশ্চাত্তাণ্ডে চাপিয়া ধরার জ্বার বেদনা বা যাতনা; কপালে শীতল ঘর্ষ (বিবেরট্-আব্) ; বসা বা শয়নাবস্থা হইতে দাঁড়াইলে মাথাঘোবা; মাথায় অঁটাবোধ ।

চক্ষু । চক্ষুর তারা বিস্তৃত এবং চক্ষে আলোক জ্ঞান থাকে না (বেল্) ; চক্ষুর তারা সঙ্কুচিত (মার্ক্-কর, ফস্, ফাইটোল্, ফাইসট্) ; চক্ষু কাচের জ্বার চক্চকে, বহির্দিকে ঠেলিয়া বাহির হওয়ার জ্বার দেখায় এবং স্থিরভাব বিশিষ্ট (আমিন্, বেল্, হায়োস্, ট্রামন্) ; চক্ষু অর্দ্ধ খোলা, উপর দিকে উল্টান বা শিবচক্ষু, লালবর্ণ, জ্বালাব্ধ, উষ্ণ এবং শুষ্ক (বেল্) ; পক্ষাঘাতে যেকপ হয়, চক্ষুর পাতা সেরূপ পড়িয়া যায় (কষ্ট্, কৌনায়াম্, জেল্) ।

কর্ণ । কানে ভয়ানক সৌ সৌ শব্দ হয় (একন্, বেল্, চারনা) ; সামান্য শব্দও কানে লাগে বা সহ হয় না ।

মুখমণ্ডল । মুখমণ্ডল শোণের জ্বার ক্ষীত এবং টল্ টলে, কাল্চে লালবর্ণ এবং উষ্ণ (একন্, বেল্, হায়োস্, ট্রামন্), লালবর্ণ, শিটা বা মাটির রঙ্গের জ্বার মলিন ; মুখাকৃতি বিকৃত (সিকুটা, কুগ্রাম্) ; নিম্ন ওষ্ঠ এবং মাড়ি পক্ষাঘাতের ন্যায় ঝুলিয়া পড়ে, (লাইকোপ্) ; মুখ মণ্ডলের পেশীর আক্ষেপিক স্পন্দন ; মুখ মণ্ডলের শিরা গুলি ক্ষীত এবং বিস্তৃত ; ওষ্ঠের কোণের স্পন্দন (ইথেন্) ।

জিহ্বা এবং গলার মধ্য । জিহ্বার পক্ষাঘাত হেতু উহার সঞ্চালনে অশক্তি (কষ্ট্, ডাক্, নাক্স-মফ্, নাক্স-বম্, হায়োস্, জেল্) ; জিহ্বা

বেঙুনী রঙ্গ বিশিষ্ট; জিহ্বা কাল (ফস), সাদা (আস্, ব্রাই, নাক্স-বম্, পাল্‌স্, সাল্‌ফ্); মুখ গহ্বর শুষ্ক (আস্, ব্রাই, ডাক্স্, নাক্স-মক্, পাল্‌স্)। গলার মধ্যে শুষ্কাত্ত্ব (এপিস্, আস্, নাক্স-মক্), পক্ষাঘাতের দরুণ কোন দ্রব্য গিলিতে অশক্তি (নাক্স-মক্)।

পাকস্থলী এবং উদর। কৃদামুজতা (আলাম্, আস্, চায়না, নেট্রাম্-মিউর, ফস্, সাল্‌ফ্); প্রবল পিপাসা (একন্, আস্, ব্রাই, নাই-ট্রিক্-আস্, সাল্‌ফ্); উদরস্থ আহার দ্রব্যাদি বমন; সবুজ বর্ণের পদার্থ বমন (আইরিস্, পডোফ্); রক্ত বমন (হামামেলিস্, নাক্স-বম্, পডোফ্, ষ্ট্যানাম্); মল মূত্র বমন; উদরে কর্ভনবৎ শূলবেদন এবং আক্ষেপ সম্বলিত বমন; পাকস্থলীতে চাপা এবং তারিবোধ (আস্, ব্রাই); পাকস্থলীতে প্রবল বেদনা, প্রচাপনে বাহার বৃদ্ধি হয়। পরিপাক সম্বন্ধীয় যন্ত্রের কার্যের জড়তা (আলাম্); উদর ক্ষীত, বিস্তৃত এবং চাপিলে বা স্পর্শ করিলে উচ্চ বেদনামূক হয় (একন্, বেল্); উদরে অধিক পরিমাণ দূষিত বায়ুর সঞ্চার (Flatulence) এবং উহাতে গড্‌গড্‌ শব্দ হওয়া (কার্কো-বেজ্, লাইকোপ্); নাতি এবং কুচ্‌কি সম্বন্ধীয় রক্ত অস্থ বৃদ্ধি (Incarcerated Umbilical and Inguinal Hernia); মল বমন; পেট কামড়ানী এবং উদরে কর্ভনবৎ প্রবল বেদনা (কলোস্); অস্থ ছিড়িয়া ছিন্ন ভিন্ন হইলে যেরূপ হয়, উদরে সেরূপ চাপাযুক্ত বেদনা; সীসা জনিত শূল বেদনা (Lead-colic)।

মল এবং মলদ্বার। উদরে বেদনার সময় শুষ্কদ্বার আক্ষেপিক-রূপে রুদ্ধ হয় এবং তদরূপ বায়ু নিঃসরণে কষ্টান্বিত হয়; অগাড়ে বা অনিচ্ছাপূর্বক মল নির্গমন (আর্গিকা, কার্কো-বেজ্, চায়োস্, রাস্-টিক্স্); হর্গক্যুক্ত মল নির্গমন (আস্); ভয় পাইয়া মল নির্গমন (জেল্‌স্); উদর-ময়ের জ্বার সাদাটিয়া, কাইগের জ্বার বা কেশাযুক্ত উদরাময়ের জ্বার তরল ভেদ এবং মল নির্গমনের সময় শুষ্ক দ্বারে আলা (আলোজ্, আস্, সাল্‌ফ্); হর্গক্যুক্ত কাল মলতাগ (আস্, লেপ্টেণ্ডা); অস্থের জড়তার দরুণ কোষ্ঠবদ্ধ—এমন কি বাত্রেব বেগ একবারেই হয় না (আলাম্, কান্‌ফার, প্রাষাম্), ক্ষুদ্র অস্থের আক্ষেপের দরুণ কোষ্ঠবদ্ধ; মল কঠিন, কাল গোলার জ্বার (আলাম্, ক্যালী কার্ক্, প্রাষাম্); শিশুগণের ওলাউঠা এবং

তদ্রূপ অর্ক-জ্ঞান-রহিততা, গৌঁ গৌঁ করিয়া নাক ডাকা এবং আক্ষেপ (Convulsions) ।

মূত্রযন্ত্র । অসাড়ে বা অনিচ্ছাপূর্বক মূত্রতাগ (বেল, হায়োস্) ; মূত্রাধারের গ্রীবার পক্ষাঘাত হেতু মূত্রাবরোধ ; মূত্রাধারের মুখের সঙ্কোচক যন্ত্রের (Sphincter) আক্ষেপের দ্রুপ মূত্রাবরোধ ; মূত্র পরিমাণে অল্প, কাল্চে, কটাবর্ণ এবং খোলাটিয়া বা ধূমের রঙ্গ বিশিষ্ট (ক্যাস্) ।

জননেন্দ্রিয় । পুরুষের বারম্বার স্ত্রী সহবাসের ইচ্ছা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পুরুষাঙ্গ বারম্বার খাড়া হওয়ার দ্রুপ অনিচ্ছাপূর্বক ধাতুনিঃসরণ (ফস, নাক্স-বম্) ।

শ্বাস যন্ত্র । শুক কাশি এবং তদ্রূপ কণ্ঠনালীতে হুড়্-হুড়ী এবং চাঁচিয়া ফেলার জায় অহতৃত হওয়া (কুমেজ্) ; শুক কাশি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে নিশ্বাস প্রশ্বাস ঘন ঘন এবং নিদ্রাবেশ (আণ্টি-টার্ট্), অথচ রোগী ঘুমানিতে পারে না ; শ্বাস প্রশ্বাসে গৌঁ গৌঁ, ঘড়্ ঘড়্ শব্দ হয় এবং মুখ খোলা থাকে ; বারম্বার অনিচ্ছাপূর্বক দীর্ঘনিশ্বাস ; শ্বাস প্রশ্বাস কার্য্য বিলম্বে বিলম্বে সম্পন্ন হয় ; শ্বাস প্রশ্বাস অনিয়মিত, মূহ্ এবং গৌঁ গৌঁ, ঘড়্ ঘড়্ শব্দযুক্ত ; কণ্ঠনালীর আক্ষেপ ; কাশি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে শ্বাস কষ্ট এবং মুখমণ্ডল নীলবর্ণ ; কাশি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে সমুদয় শরীরে প্রচুর ঘর্ম্ম । নাড়ী পূর্ণ এবং মূহ্ গতি বিশিষ্ট (ডিজিট্) ; নাড়ী মূহ্গতিবিশিষ্ট এবং কোমল ; ক্ষুদ্র এবং হর্সল (ফেরাম্) ; নাড়ীর অনিয়মিত স্পন্দন ।

পৃষ্ঠদেশ । পৃষ্ঠদেশ আক্ষেপিক রূপে ব্যাকিয়া ধক্কের জায় হয় (সিকুটা) ।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ । সমুদয় অঙ্গের কাঁপনি ; হাত পাঠি অধিক কাঁপে ; ভয় পাইয়া অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কাঁপনি ; হাত এবং হাতের সমুখ অংশের ক্ষীতি এবং উহাতে অবশবোধ ; অঙ্গের আক্ষেপিক ব্যাকনি এবং উহাতে অবশ বোধ ; অঙ্গ প্রত্যঙ্গের আক্ষেপিক সঞ্চালন (সিকুটা, বেল, হায়োস্) ; হাত পায়ের পাতা ঠাণ্ডা (ক্যাস্ফাব, বিরেট্-আব্) ।

নিদ্রা । সর্ব্বদাই নিদ্রাবেশ যাহার দ্রুপ রোগী জাগিয়া থাকিতে পারে না (নাক্স-মক্) ; অস্থির নিদ্রা বা নিদ্রাবস্থায় বারম্বার হঠাৎ জাগিয়া

উঠা (আর্পিকা, লরোস্, ফাইসট্) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে চক্ষু অর্দ্ধখোলা থাকে ও নাক দিয়া গৌঁ গৌঁ শব্দ হয় (সাল্‌ফ্); ঘুম যায়, অথচ রোগী ঘুমাইতে পারে না (ক্যাম্, বেল্, ল্যাক্); অস্থির নিদ্রা এবং নিদ্রা দ্বারা রোগী আপনাকে আপনি স্তম্ভ মনে কবে না; ঘুমেরঘোরে নানাপ্রকার স্বপ্ন দেখা এবং নানা প্রকারের কাল্পনিক বিষয়ের উদয় হওয়া; নিদ্রাশূন্যতা (সিমিসিক্, কফিরা) এবং সামান্য শব্দ হইলেও কানে লাগে বা সহ্য হয় না, এমন কি দূরবর্তী স্থানে মুদগী ইত্যাদি ডাকিলে বা ঘড়ীর শব্দ হইলেও রোগী (জীলোক্) ভাগিয়া থাকে; অচেতনতা; ঘুমেরঘোরে বিছানার কাপড়াদি খোঁটা (তোকান্) ।

জ্বর । শরীর ঠাণ্ডা এবং মাথা গরম; গাল লালবর্ণ এবং জ্বালা-বুজ; শরীর বর্ষ দ্বারা আবৃত হইলেও সমুদয় শরীরে জ্বালা অনুভূত হয়, রোগী গায়ের কাপড় ফেলিয়া বসিতে চাহে এবং বলে যে তাহার বিছানা অত্যন্ত উষ্ণ; সমুদয় শরীরে ঠাণ্ডা বর্ষ; এই বর্ষ মাথা এবং কপালেই অধিক হয়; কতকক্ষণ পর পবই রোগী বলে যে তাহার মাথা অত্যন্ত গরম হইয়াছে; আঙ্গিক-জ্বর বা অবিকার এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে রোগীর চেতনা ভাল থাকে না এবং তাহার দরুন রোগীকে জাগান যায় না; চক্ষু অর্দ্ধ খোলা; হয় মৃদু প্রলাপ উক্তি, নতুবা প্রলাপাবস্থায় উচ্চঃস্বরে কথা বলা, রাগ করা, এবং পলায়নের চেষ্টা; মুখমণ্ডল কাল্‌চে লালবর্ণ; অতিরিক্ত পরিমাণে রক্তাধিক্য বা রক্তাবশেষ হেতু নস্ত্রিকের পক্ষাব্যাহত হওয়ার উপক্রম হওয়া; নাড়া পূর্ণ এবং মূহগতিবিশিষ্ট ও উহার সঙ্গে সঙ্গে শ্বাসকষ্ট এবং শ্বাস প্রস্থানে গৌঁ গৌঁ, ঘড়্ ঘড়্ শব্দ হওয়া। সবিরাম জ্বর; শীত কম্প; শীতলাবস্থায় পুনঃপড়া এবং পিপাসা থাকে না; উষ্ণাবস্থায় পিপাসা এবং প্রচুর বর্ষ হওয়া।

ব্যবহার । ভয় জনিত অস্থখ (একন্, ভেল্ন্); মানসিক উত্তেজনা বা অবসন্নতা জনিত অস্থখ; ভয় পাওয়ার পর ও ভয় উৎপাদক কারণ মনে থাকিয়া যার; কণ্ঠের কদলার দৃশ্য শ্বাস দ্বারা টানিবার দরুন অস্থখ; সীসা জনিত অস্থখ; সীসা জনিত শূল বেদনা (Lead-colic); মদোন্মত্ত (delirium Tremens); সংক্রান্ত রোগ; নস্ত্রিক সঞ্চার পক্ষাব্যাহত; অক্ষেপ (Convulsions);

দাঁতলাগা বা ধনুষ্ঠকার; মূণীরোগ; অস্ত্রের জড়তার দরুণ কোষ্ঠবদ্ধ; উদরাময়; আন্ত্রিক-জ্বর বা অব-বিকার; লবিরাম বা পালী জ্বর; স্বল্পবিরাম-জ্বর; মাতালদিগের অমুখ; বৃদ্ধবয়সেব অমুখ; ঘোর অচেতনতা (Coma); মাথা রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ হেতু শিরঃপীড়া এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মাথা ঘোণা; চক্ষে ছানি পড়া (Cataract); অন্তর্বৃদ্ধি (Hernia); শ্বাস রোধক আক্ষেপিক কাশি; প্রব ব়েদনার ব্যাঘাত জন্মা; কৃত্রিম বা আক্ষেপিক আকারের প্রব ব়েদনা ইত্যাদি অমুখে ওপিয়াম্ ব্যবহার্য্য।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । শিশু, ছোট বালক বালিকা এবং বৃদ্ধ বয়সের অমুখে বিশেষ উপকারী; সমুদ্র অমুখেই ঘুমের ভাব অত্যন্ত প্রবল; সমুদ্র শরীরই কিম্ কিম্ করা; ভয় খাওয়ার পর ভয়ের কারণ না থাকিলেও ভয়ের উদয় হইয়া আক্ষেপ; আক্ষেপের সময় এবং উহার পূর্বে হঠাৎ চিংকার করিয়া উঠা; ভয় পাইলে ভয়ের কাৰণ না থাকিলেও রোগীর মনে সর্বদা ভয়ের উদয় হওয়া; ভয় পাইয়া অমুখ; বিজ্ঞানা অত্যন্ত গরম বোধ হয়, যাহার দরুণ বোঁগী উহাতে শরম কবিত্তে চাহে না; ঘর্ষের সময়, ঘুমের সময় এবং উহার পর, উত্তাপে, অমুখের বৃদ্ধি ইত্যাদি ওপিয়ামের কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত ।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ । ওপিয়ামের কার্যের সঙ্গে ক্যানাবিস্, ইণ্ডিকা এবং বেলাডোনার কার্যের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। এতদ্ভিন্ন কোন কোন বিষয়ে ইহার কার্যের সঙ্গে একোনাইট, আর্সেনিক্, ব্রাইওনিয়া, ক্যাম্ফার, ককিয়া, ডিরটারিস, হাযোসায়েরনাস্, লাইকোপডিয়াম্, মার্কিউ-রিয়াম্, নাক্স-বমিকা, পাল্মেটিগা, রাস্টেম্, ষ্ট্রামোনিরাম্, সাল্ফার, বিবেরটাম্, অলান্ ইত্যাদি ঔষধের কার্যের সাদৃশ্য আছে।

প্রতিষেদক ঔষধ । বেলাডোনা, ককিয়া, ক্যানাথাম্, ক্যাম্ফার, ইপিকাক, মার্কিউরিয়াম্, নাক্স-বমিকা, প্রাথম্য ইত্যাদি ওপিয়ামের প্রতি-ষেদক ঔষধ মধ্যে পরিগণিত । আফিম দ্বারা বিষাক্ত হইলে কাকির পাত্ৰ কাত, ক্যাম্ফার, বেলাডোনা এবং বমনোৎপাদক ঔষধ সেব্য।

ডাইলুশন বিচার । অস্ত্রের অমুখে নিম্ন ডাইলুশন ব্যবহার্য্য। কোষ্ঠবদ্ধে আমরা ৬ষ্ঠ ক্রম সচরাচর ব্যবহৃত করিয়া বিশেষ উপকার পাইয়া

থাকি। অব এবং অজ্ঞাত অস্থে ১২ এবং ৩০ ডাইলুশন সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ডাক্তার যারের (Dr Jahr) মতামতসারে শিশুগণের মস্তিষ্কের অস্থে লেখক ৩০ ডাইলুশনই সচরাচর অধিক ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল পাইয়া থাকেন। কোষ্ঠবদ্ধ কোন কোন চিকিৎসক ৩ দশমিক ক্রমের আরেকও ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। ১০০ এবং ২০০ ডাইলুশনও অনেক চিকিৎসক ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল পাইয়া থাকেন। লেখক উক্ত দুই ডাইলুশন অধিক ব্যবহার করিয়া দেখেন নাই। অতএব উহার গুণাগুণ সম্বন্ধেও তিনি বিশেষ কিছু বলিতে পারেন না। অঙ্গের জড়তাব দূরণ পুন্যতন আকারের কোষ্ঠবদ্ধে ওপিয়ার্নেব মূল আরেক ৬, ৬, ৬ ১ এবং ১ ফোঁটা মাত্রায় ব্যবস্থা করিয়া অনেক বোগিক চিকিৎসার লেখক বিশেষ ফল পাইয়াছেন। বন্ধ বয়সেই ওপিয়ার্নেব মূল আরেক ঘণ্টা অধিক উপকার পাওয়া যায়।

ফস্ফরাস্,—ফস্।

(PHOSPHORUS,—PHOS.)

(১) কোন এক বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক প্রেপারেশন হইতে অদিত ফস্ফরাস্ লইয়া উহার এক ভাগ, ৫০০ ভাগ ইথারে (Ether) মিশাইয়া, যত পরিমাণ ইথার উহাতে তত পরিমাণ আব্‌সোলিউট অলকোহল্ (Absolute Alcohol) মিশাইয়া ৩য় দশমিক ক্রমের আরেক প্রস্তুত হইয়া থাকে। (২) এক ভাগ আপত ফস্ফরাসে ১,০০০ ভাগ আব্‌সোলিউট্ অলকোহল্ মিশাইয়া ৩য় দশমিক ক্রমের আরেক প্রস্তুত হয়। ফস্ফরাসের ৩য় দশমিক অপেক্ষা নিম্ন ক্রমের আরেক প্রস্তুত হয় না। ফস্ফরাসে গুঁড়াও প্রস্তুত হইয়া থাকে। যে প্রণালীতে হানিমান গুঁড়া প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিতেন তাহার নিম্নমানবলী ব্রিটিশ্ হোমিওপ্যাথিক ফার্মাকোপিয়ায় উষ্টয়া। গুঁড়া অপেক্ষা আরেক অধিক উপকারী বলিয়া চিকিৎসকগণ বিশ্বাস করেন। অতএব তাহারই আরেকট সচরাচর অধিক ব্যবহার করিয়া থাকেন।

সাধারণ ক্রিয়া। সাধারণ দাওলা এবং রক্তের উপর ইহার

কার্য্য অতি প্রবল । অতএব ইতা দ্বারা উক উভয়েবই বিকৃতি এবং বিনা-
শের দরুণ মায়ুর শক্তি বিনষ্ট হইয়া পক্ষাঘাত এবং রক্তের সার পদার্থ
বিনাশ এবং গলনাবস্থা প্রাপ্ত হয় । ইতা প্রথমতঃ উদ্ভেরনা উৎপাদন
করিয়া আক্রান্ত অংশে রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ ও প্রদাহ আনয়ন করে,
এবং প্রতিক্রিয়াতে উক্তাংশের জডতা ও পক্ষাঘাত উৎপাদন করে,
যাহাব দরুণ আক্রান্ত যন্ত্রাদিতে দূষিত পদার্থের সঞ্চার হয়, রক্ত এবং
মস্তিষ্ক, কদৈককা মজ্জা এবং অস্থির পদার্থ গলনাবস্থা প্রাপ্ত হয় । রক্ত,
হম্মাহি (Maxillary bones), কুক্ষুস, এবং দাঁতের উপবই ইহার কার্য্য
সম্পাদন প্রধান । এই সকল অংশের উপর এই ঔষধের ক্রিয়াব প্রকৃতি
পূর্বেই বলা হইয়াছে । রক্তের উপর উক্ত প্রকার কার্য্য থাকার দরুণ
রক্তশোণ, স্থানে স্থানে লোম্ভা বাইয়া উহাতে রক্ত সঞ্চিত (Ecchy-
moses) হয় : হম্মাহি এবং দাঁতের উপর উক্ত প্রকার কার্য্যের দরুণ উহাতে
পোকায় ধরে এক উহার ক্ষয় হয় (Caries and Necrosis) ; কুক্ষুসে রক্তের
অতিরিক্ত সঞ্চার হয় এবং নানা বস্তু, প্রধানতঃ যকৃত এবং হৃৎপিণ্ডের,
মেদোপকৃষ্টতা (Fatty degeneration of the Liver and Heart) দেখিতে
পাওয়া যায় ।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মন । ঘোর নিদ্রা বা অর্কচেতনা, বিড়্ বিড়্ করিয়া প্রলাপ বলা
(Low-muttering Delirium) ; প্রলাপ বলা (কন্-আস্, রাস্টেজ্) ;
মেঘাদির পাল পরিবার চেষ্টা (বেল্, ষ্ট্রামন্, হারোস্) ; সকল বিষয়েই
বৈরাগ্য ; অত্যন্ত শিথিলতা ; কথা বলিতে অনিচ্ছা ; আন্তে আন্তে প্রশ্নের
উত্তর দেওয়া অথবা একেবারেই উত্তর না দেওয়া (মাক্, কন্-আস্) ; কোন
বিষয়েই মন যায় না (বাক্সেরিস্, কার্সো-বেজ্, চাঘনা, কন্-আস্, সেলেন্) ;
হিস্তিবিয়া দোষে পর্যায়ক্রমে একবার হাসা এবং একবার কাঁদা (একন্, ইগ্-
নেস্, নাজ্-মফ্) ; সর্বদা চঃখিত, ভয়ভূর এবং মনের অবসন্নাবস্থা ; ভবি-
ষ্যতে কোন দুর্ঘটনা ঘটবে সন্দেহ এই বাগয়া চিন্তা (ইগ্নেস্, নেট্রাম্-মিউর,
প্রাটিনা, পাল্) ; মনের অত্যন্ত উদ্বেগ এবং অস্থিরতা (একন্, আস্, বেগ্,

ফন্), একাকী থাকিলে বা বড় বৃষ্টি বিছাওয়ের শব্দাদি শুনিগে বাহা অধিক হয় ; সামান্য কারণেই চমকিয়া যাওয়া এবং সর্বদা ভয়াকুর থাকা (একন, চায়না, ইয়েম্), প্রধানতঃ সন্ধ্যার সময় (ক্যাক্-কার্ল্, রাস্টক্); সর্বদাই চিড়্ চিড়ে এবং খিট্ খিটে স্বভাব (ব্রাই, নাক্স-বম্); কোন বিষয়ে চিন্তা করিতে অশক্তি; মনে শীঘ্র শীঘ্র ভাবের উদয় হয় না ; কোন বিষয়ে মন স্থির ভাবে থাকে না (জেন্স্, নাক্স-বম্, ফস্-আস্); শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রমে অত্যন্ত অনিচ্ছা (নাক্স-বম্, সিপিবা, সাল্ফ্); অত্যন্ত ভয়, এবং মনে হয় বেন ধরের কোণে কি এমন দিবা রাইতেছে ; সর্বদা চমকিয়া উঠার স্বভাব বা ভাব ; অবশ শক্তির হ্রাস বা বিনাশ ।

মস্তক । মাথা ঘোরা এবং চলিবার সময় উলিগা পড়ার উপক্রম হওয়া (নাক্স-মক্); বিড়ানা হঠাতে উঠিলেই মাথাঘোবা (ব্রাই, ক্যাম্, লাইকোপ্); বমি অবস্থা হইতে দাঁড়াইল মাথা ঘোরা (ব্রাই, ক্যালী-বাই), প্রাতঃকালে ঘাড়ার ব্যথা হয় (আলাম্, নাইটিফ্-আস্); মাথায় চিমা বোধ ; মাথায় গোলমলে এবং ভাবিবোধ ও উহার সঙ্গে সঙ্গে সামান্য রকমের মাথা ঘোরা ; মাথায় রক্তাধিক্য বা রক্তাববোধ (একন, বেল্, প্লোনয়েন); কপালে চাপাযুক্ত বৃশ্চাশে বেদনা বা বাতনা যাচা চক্ষু এবং নাকের মূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় (একন, ব্যাপ্ট্, ক্যালী-বাই, মাক্-আয়োড্); কপালের ছই পার্শ্বে এবং কর্ণের পশ্চাত্তাঙ্গে দপ্‌দপিবা বেদনা ; ক্রুর মস্তিকে (Cerebellum) ঠাণ্ডাবোধ এবং রুহৎ মস্তিকে (Cerebrum) শক্ত বোধ ; মস্তিকে ঘাটিকা ধরার ভ্রায় বা জ্বালাযুক্ত দপ্‌দপিবা বেদনা ; মাথায় গবম বোধ, যাচা মেরুদণ্ড হঠাতে মস্তিকে বিস্তৃত হব ; সংজ্ঞাশ রোগ ; রোগী আপন মাথা চাপিয়া ধরিয়া থাকে ; মূখ বাম দিকে অকুঠ হয় ; মস্তিকের পক্ষাঘাত এবং উহার কার্যাবরোধের উপক্রম হওয়া ; মস্তিকে জ্বালাযুক্ত বেদনা বা বাতনা ; মস্তিকের কোমলতা (Softening of the brain) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অনিবার্য্য অনবরত খিৎপীড়া ; প্রেরের উত্তর দিতে গৌণ করা ; মাথাঘোরা ; পা টানিয়া বা চেচুড়াইয়া চলা ; অঙ্গ প্রত্যঙ্গে অসাড় বা অবশ বোধ ; মস্তক এবং মেডুলা অবলংগেটা (Medulla oblongata) তরুণ প্রবল সংকোচন বা উহার হ্রাস (Atrophy), এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে

মূত্রাবরোধ হেতু বিকারের লক্ষণ (Uraemia); চক্ষু আঁটা থাকিলে যেক্রপ হয়, কপালে সেক্রপ যাতনা অন্তর্ভূত হয় (কষ্ট); মাথায় অত্যন্ত চুলকানি (কষ্ট) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মাথায় প্রচুর খুস্কি পড়া (কাছ, মেজিরিয়াম), মথার চুল পড়িয়া যাওয়া (গ্রাফ, নাইট্রিক-আম্, সিপিয়া, সাল্ফ, কস-আম্); গোছায় গোছায় মাথার চুল পড়িয়া যাওয়া; মাথায় অবসন্ন কারক ঘৃণ্ ঘৃণে বেদনা বা যাতনা, প্রাতঃকালে এবং মাথা হেট করিয়া উপুড় হইলে যাহার বৃদ্ধি হয় এবং শয়ন করিয়া থাকিলে ও ঠাণ্ডা বাতাসে বাহার উপশম হয়; মাথায় খালি খালি বোধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মাথা ঘোরা; মাথাষী মুখে শুন্ শুন্, সোঁ সোঁ শব্দ হওয়া ।

চক্ষু । চক্ষুর তারা সঙ্কুচিত (ওপিথাম্, মার্ক-কর, ফাইটোল্, ফাইনষ্ট্); পড়িতে পড়িতে চক্ষু বুজিয়া আইসে (মিডিকা, কটা, সিপিয়া); দূর্বর্তী বস্তু গুলি মনে হয় যেন ধূম বা কুশা দ্বারা আবৃত (লাইকোপ্, জেলস্, নেট্রাম্ফিউব, সাইলিসি); ভোরবেলা, প্রাতঃকালে, অথবা হাতের পাতা দিয়া চক্ষে ছায়া দিয়া রাখিলে রোগী চক্ষে অপেক্ষাকৃত ভাল দেখে; প্রদীপের আলোক যেন চন্দ্র বা সূর্যের বেষ্টক মণ্ডলের জায় সবুজ মণ্ডল দ্বারা পরিবেষ্টিত একরূপ অন্তর্ভূত হয় (অস্মিয়াম্, লাল-মণ্ডলে, বেল্); চক্ষুর সম্মুখে যেন কাল চিহ্ন ভাসে; চক্ষুর সম্মুখে যেন আঁগনের কণা বা আঁগনের জায় দাগ ভাসে; প্রদীপে বাতাস লাগিলে বা পাখীর ডানা ঝাড়িলে যেক্রপ হয়, চক্ষের সম্মুখে যেন সেক্রপ ধড়্ফড়্ করায় জায় অন্তর্ভূত হয় (অগারিকাশ্, বেল্, সাইক্রেমেন্, মার্ক, সিপিয়া, সাল্ফ); চক্ষের আগতন ছোট হওয়ার সহিত ছানি পড়া বা গ্লকোমা (Glaucoma); চক্ষুর গোলকের উপর পদার জায় পদার্থ পড়া এবং চক্ষুর চতুষ্পার্শ্ববর্তী স্থানের শোধের জায় ক্ষতি (আম্, এপিম্, রাস্টক্, নেট্রাম্, আম্); চক্ষু প্রদাহ-যুক্ত এবং উহাতে বালী প্রবেশ করিলে যেক্রপ হয়, চক্ষের মধ্যে সেক্রপ জালা, চুন্ধানি এবং চাপাবোধ; গণ্ডমালা জনিত চক্ষু প্রদাহ; প্রাতঃকালে চক্ষুর পাতার পাতায় লাগিয়া থাকে এবং দিনের বেলায় চক্ষে কেঁচুর পড়ে; যেন হঠাৎ চক্ষে দেখিতে পাওয়া যায় না বা রাস্তার একরূপ অন্তর্ভূত হয় ।

কর্ণ । কানে কম শুনা, বিশেষতঃ মনুষ্যের স্বর (সাইলিসি); কানে

সমুদয় শব্দই যেন প্রতিধ্বনিত হয় (কষ্ট, মার্ক্, ফস্-আস্); কানের মধ্যে টন্ টন্, সৌ সৌ শব্দ হয়; কানের মধ্যে দপ্পপানি (কার্ক্-কার্ক্, হিপ্-সাল্ফ্, নেট্রাম্-মিউর); কানের সম্মুখে ফৌস্ ফৌস্ শব্দ হয়; কোন পদার্থ লাগিয়া থাকিলে যেরূপ হয়, কানের মধ্যে সেরূপ অস্বভূত হওয়ার দরুন কানে কম শুনা (পান্-স্)।

নাসিকা। নাসিকা ক্ষীত এবং স্পর্শনে উহা বেদনায়ুক্ত হয় (আলাম্, নাইট্রিক্-আস্, রাস্টিউক্); নাসারন্ধ্রে বঁ মধ্য ক্ষীত, শুষ্ক, এবং রুদ্ধ; নাসারন্ধ্রে ক্ষত এবং উদার ধাবে চুমটী (থোসা) পড়ে (আলাম্, ক্যাক্-কার্ক্, গ্রাফ্, লাইকোপ্, মার্ক্, সাল্ফ্); নাসা বা নাকড়া (Nasal Polypus) (কার্ক্-কার্ক্), এবং নাক দিয়া সহজেই রক্তপড়া; বারবার ইঁচি দেওয়া (একন্, জেল্-স্, সাস্জুনেরিয়া); নাক দিয়া সবুজের আভাযুক্ত হরিদ্রা বর্ণের ক্লেদ নিঃসরণ (ক্যালী-বাই); নাক কাড়িলেই রক্ত পড়ে; নাক দিয়া প্রচুর রক্তস্রাব (একন্, হামামেলিস্); সর্দি এবং উহার সঙ্গে সঙ্ক গলার মধোর প্রবাহ (মার্ক্) এবং মাথায় চিনা বোধ; পর্যায়ক্রমে নাক দিয়া তরল এবং গাঢ় প্লেয়া নির্গমন (আলাম্, নাক্স-বম্, সাইলিসি); নাকে সকল প্রকার গন্ধই লাগে বা সহ্য হয় না (একন্, আগারিকাশ্, বেল্, কল্-চ্, গ্রাফ্, হিপ্-সাল্ফ্, লাইকোপ্, সাল্ফ্), (শিরঃপীড়া হইলেই গন্ধ অধিক সহ্য হয় না)।

মুখমণ্ডল। মুখমণ্ডল শিটা বা ফিকা, বসিয়া ঘাওয়া এবং ঘেটে, (নেট্রাম্-কার্ক্); মুখমণ্ডল কণ্ঠের জ্বার হরিদ্রার আভাযুক্ত (সিপিয়া); মুখ-মণ্ডল কামল রোগের জ্বার হরিদ্রাবর্ণ (চেলিডন্); মুখমণ্ডল ক্ষীত এবং শোথের জ্বার উল্টলে (রাস্টিউক্); চক্ষু বসা এবং কাল রেখা দ্বারা পরিবেষ্টিত (চারনা, ক্যালী-আবোড্, সিকেল্, সাল্ফ্); চক্ষু পাতা এবং চক্ষুর চতুষ্পার্শ্ববর্তী স্থান শোথের জ্বার ক্ষীত (এপিস্); মুখমণ্ডলের চর্মে কসিয়া ধরার জ্বার অন্তর্ভুক্ত হয়; মুখমণ্ডল, কপালের দুই পার্শ্ব, কণ্ঠের পশ্চাৎ ভাগ, এবং মাড়ির হাতে ছিড়িয়া কেলার জ্বার বেদনা বা যাতনা; ওষ্ঠ শুষ্ক এবং উষ্ণ (ট্রাই); নিম্নমাড়ির অস্তিক্য (Necrosis); উপরের মাড়ির অস্থি ক্ষয় কদাচিত্ত হয়; গালের স্থানে স্থানে চক্রাকারে লাল দাগ পড়ে।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য । দাঁতের গোড়ায় জিড়িয়া ফেলা বা ছল কুটানের জায় বেদনা বা যাতনা এবং তদ্রূপ গাল ক্ষীত হয় (অর্পিফা, ক্যাম, নিপিগা); স্বান করিলে বা গায়ে জল দিলেই দাঁতের গোড়ায় বেদনা বা যাতনা (নাক্স-মক্ষ); দাঁতের গোড়ার মানে ক্ষীত হইয়া আল্গা হয় এবং উহা দিয়া সহজেই রক্ত পড়ে (অর্জেণ্ট-নাইট্রিক, কার্বো-আনিমেল, কার্বো-বেজ), বিশেষতঃ চাপিলে বা স্পর্শ করিলে (মার্ক, নাইট্রিক-আস); সামান্য স্পর্শনেও দাঁতের গোড়া অত্যন্ত বেদনায়ুক্ত হয় (কার্বো-আনিমেল, মার্ক); জিহ্বা ক্ষীত, শুষ্ক এবং কাল (ওপিগাম্, বিরেট-আস); জিহ্বা শুষ্ক এবং সাদা; জিহ্বা শুষ্ক এবং লালবর্ণ (রাস্টক্স); জিহ্বা শুষ্ক এবং উহার মধ্যভাগ কটাবর্ণ (ব্যাপ্ট, প্রাসাম্); জিহ্বা হৃদয়াকার লেপযুক্ত (চেলিডন্, চায়না); মুখের মধ্য শুষ্ক (আস্, ব্রাই, নাক্স-মক্ষ, পাল্‌স্); মুখে তিক্ত স্বাদ; গালের মধ্যের অংশে যেন স্থানে স্থানে লোম্‌ছা যায় বা ছাল উঠে; মুখে লালের পরিমাণের বৃদ্ধি হয় এবং লাল লোস্তা স্বাদ বিশিষ্ট (আন্টিজুড, মার্ক-কর, সালফ্), অথবা মিষ্ট স্বাদ বিশিষ্ট (প্রাসাম্, পাল্‌স্); জিহ্বা সঞ্চালনে অশক্তি (বেল, জেল্‌স্, স্ট্রানিন্), যাহার দরুণ বোগী আস্তে আস্তে কথা বলিতে বাধা হয়; আহার বহা গলনালীতে জালাহুভব; আহার বহা গলনালীর উপরিভাগ এবং মুখগহ্বরের পশ্চাৎভাগে দিবা রাত্রি শুষ্কহুভব; গলার মধ্যে খশ্‌ খশ্‌ এবং টাচিয়া ফেলাব জায় অল্পভূত হয়, শেষ বেলায় বা সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্বে যাহার বৃদ্ধি হয় (আমন্-কার্ব, কার্বো-বেজ, কষ্ট, পাল্‌স্, ক্রমেস্); গলার মধ্যের আক্ষেপিক সঙ্কোচন (বেল্, হায়োস্, লরোস্); প্রাতঃকালে থক্ থক্ করিলেই গলা দিয়া শ্লেষ্মা নির্গত হয়।

পাকস্থলী এবং উদর । ছুট্‌ কুধা, বিশেষতঃ রাত্রিতে, যাহার দরুণ বোগী মুছা যাওয়ার উপক্রম হয়; ক্ষুধাশূন্যতা (আলাম্, আস্, চায়না, নেট্রাম্-মিউর, ওপিগাম্); টক এবং মসলাযুক্ত দ্রব্য খাওয়ার ইচ্ছা (আন্টিজুড, আন্টি-টোট, হিপ-সালফ্, বিরেট-আস); পিপাসা এবং ঠাণ্ডা দ্রব্য পানের ইচ্ছা (কস্-আস); উদরস্থ দ্রব্য গলাদিয়া উঠে (পডোক্) এবং মুখ ভরিয়া যায় (আলাম্, কার্বো-বেজ্, নাক্স-বম্, সালফ্); কাঠ উদগার উঠা; উদরস্থ আহার দ্রব্যের স্বাদ বিশিষ্ট উদগার উঠা

(আণ্টি-ক্লড, ক্যাক্-কার্ক, কার্কো-আনিবেল, চায়না, গ্রাক্); উল্গারে অনেক সময় কিছুই উঠে না; আহ্বারের পর উল্গারে প্রচুর বায়ু নিঃসরণ (কার্কো-বেজ্, চায়না); অনবরত বমনোদ্বেষ (আণ্টি-টার্ট, ডিক্টি, ইপিকাক্, লোবিলিয়া); জলাদি পান করিলে জলাদি পাকস্থলীতে যাইয়া উষ্ণ হইলেই বমন (বিস্মাথ্); উদরস্থ আহ্বাব দ্রব্যাদি বমন (ইপিকাক্, ক্রিয়াজ্, প্লাসাম্, বিরেট্-আন্); পিত্ত বা স্লেমা মিশ্রিত রক্ত বমন (নাই ট্রিক্-আন্); কাল পদার্থ বমন (প্লাস্); পাকস্থলীতে পূর্ববোধ এবং স্পর্শনে এবং চাপ দিলে পাকস্থলীতে বেদনাত্ত্ব (আস্, বেল্, ব্রাই, লাইকোপ্); কোন একটা ভাবি পদার্থ চাপিয়া থাকিলে যেক্রপ হয়, পাকস্থলীর উপবিভাগে সেক্রপ চাপাবোধ; কোন একটা ভাবি পদার্থ চাপিয়া থাকিলে যেক্রপ হয়, আহ্বারের পর পাকস্থলীতে সেক্রপ চাপাবোধ (ব্রাই, নাস্-বন্); উদরোদ্ধে প্রদেশে উদ্বেষ এবং জ্বালা বোদ (ইস্কুলাস্, আস্, ক্যাস্, আই-রিস্, বিরেট্-আন্); পাকস্থলীতে কদম্বা ধবার জ্বা বেদনা যাহা বৃষ্টি পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়; পাকস্থলীতে অক্ষৈপিক বা চক্ৰনবৎ বেদনা বা বাতনা (পোল্); পেটে খালিবোধ এবং পেট পৃষ্ঠদেশে পানে আকৃষ্ট (চাইড্রাষ্ট, ইয়েস্, পিটোল্, সিমিয়া, সাল্ফ্); উদরস্থ আহ্বাব দ্রব্যাদি টক হইয়া গলা দিয়া উঠে; পাকস্থলী প্রদাহ এবং তদ্বৎ পাকস্থলীতে জ্বালাতন বোগ গলাব মধ্য এবং অস্ত্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় (আস্, ক্যাস্, মার্ক্)। যন্ত্রের বিরুদ্ধ এবং কঠিনতা (চায়না, সাল্ফ্); প্রীহার বিরুদ্ধ (চায়না); উদর ফাঁত, বিস্তৃত এবং কাঁপা এবং স্পর্শনে বেদনামূলক (বেল্, চায়না); অস্ত্রের মধ্যে দূষিত বায়ু বদ্ধ হয় (Incarcerated Flatulency); উদরে অত্যন্ত গড়্-গড়্-কল কল শব্দ হয় (লাইকোপ্); গুল্ম ধাব দিয়া প্রচুর দূষিত বায়ু নিঃসরণ (আলোজ্, চায়না, লাইকোপ্), উদরে অত্যন্ত তর্কল এবং খালিবোধ (সিমিয়া, ষ্টানাম্), বাহ্যের দক্ষণ রেখী শয়ন করিতে বাধ্য হয়; উদরের মধ্যে ঠাণ্ডাবোধ (ক্যাপ্); অস্ত্রের মধ্যে প্রবল কঠিনবৎ বেদনা।

মল এবং মলদ্রাব । শুষ্ক স্থচীর্বিধানের জ্বা বাতনা, তিড়িক মায়া, বা মন্দ প্ৰকৃতি; মলত্যাগের পর মল ধাব এবং শুষ্কের মধ্যে অত্যন্ত প্রবল জ্বালা এবং উদর মধ্যে সঙ্কে অত্যন্ত তর্কলতা (আস্,

চায়না); বেদনাহীন দুর্বলকারক উদরাময় (চায়না, পডোফ) বাহা প্রাতঃ-
কালে বৃদ্ধি হয় (আলোজ, এপিং, কমেস, সাল্ফ); পুরাতন আকারের
উদরাময় এবং তদ্রূপ উদরস্থ অজীর্ণ আহার দ্রব্যের কণা বিশিষ্ট বেদনাহীন
তরল ভেদ (ক্যাক্স-কার্ক, চায়না, পডোফ); উদরাময় এবং অসাড় বা
অনিচ্ছাপূর্বক মল নির্গমন (আর্গিকা, আস্, কার্বো-বজ্, হায়োস্); ধূসর বা
সাদার আভাবুক্ত ধূসর মলভেদ (কম্-আস); রক্ত মিশ্রিত, সবুজ, জলবৎ,
তরল ভেদ এবং মলের সঙ্গে সাদাটিয়া হরিদ্রাবর্ণের কাটদের ছায় পদার্থ
থাকা; পিচ্কারীর ন্যায় নির্গত হইলে বেদন হয়, শুষ্কতার দ্বারা সেক্রপ
প্রবলবেগে জলবৎ তরল মল নির্গত হওয়া; কোষ্ঠবদ্ধ; মল সূক্ষ্ম, লঘা, শুষ্ক
কঠিন (কুকুরের মলের ছায়) বাহা অতি কঠে নির্গত হই (কঠ); পর্যায়ক্রমে
কোষ্ঠবদ্ধ এবং উদরাময়; প্রাতঃকালে উদরাময়ের বৃদ্ধি; মলে রাঁধা মাগুর
দানার ছায় পদার্থ থাকে; অসাড় বা অনিচ্ছাপূর্বক মল নির্গমন এবং
মলদ্বার সর্বদা খোলা থাকা (মল দ্বারের সঙ্কোচক যন্ত্রের পক্ষাঘাত)।

মূত্রযন্ত্র। রাত্রিতে বারম্বার মূত্রহরণ, কিন্তু একবারে অতি সামান্য
পরিমাণে মূত্র নির্গত হয়; মূত্র লালবর্ণ এবং বোলাটোয়া; মূত্র কটাবর্ণ এবং
উহাতে লাল বালার ছায় তলানি পড়ে (আর্গিকা, চায়না, নেট্রাম্-মিউর,
মুকর, লাইকোপ্); মূত্রে সাদা ধূসর ছায় রক্ত বিশিষ্ট তলানি পড়ে (ক্যাক্স-
কার্ক, সিপিরা) এবং উহার উপরিভাগে নানা প্রকারের সন্দের ছায় আচ্ছা-
দন পড়ে; মূত্রে আল্‌বুমেন (Albumen) থাকে (মার্ক, অস্মিনাম্,
ফাইটোল, প্রাসাম্); রক্ত মূত্র (Haematuria) (আর্গিকা, ক্যাস্, কল্‌চ্,
হামামেলিস)।

জননেন্দ্রিয়। পুরুষের স্ত্রী সহবাসের ইচ্ছা; বারম্বার পুরুষাঙ্গ
খাড়া হয় এবং অসাড় বা অনিচ্ছাপূর্বক বাতু নির্গত হয়, অথবা স্ত্রী আলি-
জনের অনিবার্য ইচ্ছা (ক্যাস্); অতিরিক্ত স্ত্রীসহবাস, হস্ত মৈথুন ইত্যাদির
দ্রুত ধ্বংস (চায়না, কম্-আস্, টাকিন্)। স্ত্রীলোকের নিরমিত সময়ের
অনেক পূর্বে শ্রম বা প্রচুর রক্তস্রাব; কিকা রক্তস্রাব এবং উহার সঙ্গে
সঙ্গে তলপেটে বেদনা এবং বমনোদ্বের্গ ও উদরাময়; বারম্বার জরায়ু হইতে
অতিরিক্ত পরিমাণে রক্তস্রাব (একন্, হামামেলিস); উগ্র দ্রুতকারক ষেত

প্রদর (আলায়, কোনায়াম, ক্রিয়াজ, মার্ক, পাল্‌স); রক্তরোধ এবং তদ্রূপ রক্তোৎকাশ ও নাক, গুল্ম দ্বার এবং মূত্র দ্বার দিয়া রক্ত পড়া (হাই, কামাবেলিন); স্তনে ক্ষত এবং উহার কঠিনতা (কোনারাম); স্তনে লাগের আভ্যন্তরীণ ক্ষত (ল্যাক); স্তনে নাগী বা এবং উহাতে আলা এবং হল ফুটানের স্থায় বেদনা বা ব্যতনা ও উহা হইতে আলা উৎপাদক দুর্গন্ধযুক্ত জলবৎ তরল কলতানি নিঃসরণ (সাইলিনিস); স্তনে কৰ্কট রোগের (Cancer) বা এবং উহাতে ছুরী দিয়া কাটার স্থায় প্রবল বেদনা বা ব্যতনা ও উহা হইতে সহজে রক্ত পড়া।

খাস যন্ত্র। স্বরভঙ্গ এবং স্বর কৰ্কণ (একন, কার্কো-বেজ, কষ্ট, স্পঞ্জিয়া, সাল্‌ফ); অনেকক্ষণ ধরিয়া জোরে কথা বলার দরুণ স্বরশূন্যতা (অ্যাক্টে-নেট, অ্যাক্টে-নাইটিক, এডাম্-ট্রিক); কণ্ঠনালীতে বেদনা বা ব্যতনা থাকার দরুণ কথা বলিতে অশক্তি (বেল); কণ্ঠনালীতে ছাল উঠিয়া যাওয়ার স্থায় আলা এবং চড়্, চড়্, করা (একন, অ্যাস্‌, ল্যাক, স্যাম্বন, সাল্‌ফ); বায়ু নলে ছাল উঠিয়া যাওয়ার স্থায় চড়্‌চড়ানি, যাহার দরুণ ব্যৱধার যুগ্ম-যুগ্মে কাশির উদ্বেক হয় এবং রোগী ব্যৱধার গলায় ধেকুর দিতে বাধ্য হয়; গুল্ম যুগ্ম-যুগ্মে কাশি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বুকের মধ্য দিয়া আড়া আড়ি আঁটা বেধে (আচ্‌, মার্ক-কর); গলায় আক্কেপিক কাশি; তদগ কাশি, ক্রিষ্ট গলাধিগ্ন শ্লেষ্মা নির্গত হয় না এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বুক টাটানি (আমিকা, কষ্ট, নাক্স-বম্, ষ্ট্রামিন) এবং মনুদন শবীরের কাঁপনি; জোরে পুস্তকাদি পড়িবার সময় গুল্ম কাশি; গলায় যথো হুড়্, হুড়্, করার দরুণ গুল্ম কাশি (হিপ্-সাল্‌ফ, ক্রেনেজ্, সাঙ্কুনেরিয়া, সিপিরা); কাশির সঙ্গে সঙ্গে বুক কঠোহুতব এবং খাদকষ্ট, যাহার দরুণ উদরে বেদনার উদ্বেক হয়; অতি কষ্টে গলা দিয়া ফেণাবৃক্ষ, বৃক্ষ মিশ্রিত, মণিচার রস বিশিষ্ট (Rust-coloured), চট্‌চটিয়া আঠা শ্লেষ্মা নির্গমন (কার্বো-বাই); গলা দিয়া বুকের ডিউয়ুস্ত শ্লেষ্মা নির্গমন (ভিগট্), গলা দিয়া সাদা এবং কঠিন পুঁৰ সস্ফুট শ্লেষ্মা নির্গমন; গলা দিয়া ঠাণ্ডা নোস্তা স্থার বিশিষ্ট শ্লেষ্মা নির্গমন (অ্যাস্‌, কাক্স-সার্ক, কার্কো-বেজ, সিপিরা, সাই-কেপ্); সন্ধ্যার সময় এবং রাত্রিতে কাশির বৃদ্ধি (নাক্স-বম্, পাল্‌স);

বহির্কায় উদ্ভূত হইয়া হঠাৎ ঠাণ্ডা হইলে কাশির বৃদ্ধি (আস্) ; পুত্ৰকাদি পড়িলে, জ্বরে কথা বলিলে, বা হাসিলে, কাশির বৃদ্ধি (চায়না, ডুমিরা) ; বাসপার্শ্বে এবং চিত্ত হইয়া শয়ন করিলে কাশির বৃদ্ধি ; বৃকে বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কাশি ; বাহ্যিক চাপ দিলে বৃকে বেদনার উপশম ; শ্বাস প্রাশ্বাস ঘন ঘন, কষ্টকর, উদ্বিগ্নবৃত্ত এবং হাঁপানির জ্বায় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বৃকে যাতনা এবং অঁটা বোধ ; শ্বাস প্রাশ্বাসে বৃকের মধ্যে শ্লেষ্মার শব্দ এবং ঘড়মড়ী (আন্টি-টার্ট্, ইপিকাক্) ।—উক্ত প্রকার শব্দ কুক্ষুসে নিম্নাংশেই অধিক শুনিতে পাওয়া যায় ; বৃকে রক্তাধিক্য বা রক্তাববোধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বৃকে অত্যন্ত যাতনা ; একটী ভাবি দ্রব্য ঢাপিয়া থাকিলে বেক্রপ হয়, বৃকে সেকপ ভাবি বোধ (ফেবাম, নাক্স-বন্) ; বৃকের মধ্যে স্ত্রী বিবাহ-নের জ্বায় বেদনা বা যাতনা (একন্ ব্রাই, ক্যালী-কার্ট্), এই প্রকার বেদনা বাম পার্শ্বেই অধিক অশুভ হয় (সিপিফা, ট্রিমন্) ; বৃকের মধ্যে অঁটা বোধ, বাহার দরুন বোণী ফাঁপড় হওয়ার উপক্রম হয় ; বৃকের মধ্যে জ্বালা, টাটানি এবং কসিয়া ধরান জ্বায় বেদনা বা যাতনা ; কুক্ষুস প্রদাহ এবং উহার দরুন কুক্ষুসের যকৃত্বৎ কঠিনতা, বিশেষতঃ ডাইম কুক্ষুসের নিম্নাংশের ; কুক্ষুসে পূর্ব হওয়া এবং উহার দরুন কুক্ষুসে ক্ষয় হইয়া উঠাতে গৰ্ভ হওয়া ; কুক্ষুসে স্ফোটিক (Tubercles) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে রসক্ষয় জনিত জ্বর বা চেক্টিক্ ফিবার (Hætic-Fever) ; বায়ুনল এবং কুক্ষুসের শ্লেষ্মা জনিত অশ্বথ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অম্পিওর বিস্তৃতি এবং মেদোপবৃষ্টতা ; শীর্ণ, লম্বা, অথবা বাহ্যিক শীর্ণ শীর্ণ বড় হয়, তাহাদিগের কুক্ষুসে স্ফোটিক বিশিষ্ট রোগ (Tuberculosis of the Lungs) ; বারম্বার রক্তোৎকাশ ; অত্যন্ত দুর্বলতা ; বারম্বার বায়ুনল প্রদাহ ; বৃকের স্থানে স্থানে হরিদ্রাবর্ণের দাগ বা চিহ্ন পড়া ; অত্যন্ত প্রবল সর্দি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে স্বরভঙ্গ ।

হৃৎপিণ্ড এবং নাড়ী ।—হৃৎকালে এবং সন্ধ্যার সময় শয়ন করিয়া থাকিলে হৃৎস্পন্দন এবং অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ; বামপার্শ্বে শয়ন করিলে হৃৎস্পন্দন (নেট্রাম্ কাস্, নেট্রাম্-নিউর) ; বক্ষাস্থির মধ্যাংশে এবং হৃৎপ্রদেশে চাপা বোধ ; নাড়ী দ্রুতগামী, পূর্ণ এবং কঠিন ; নাড়ী ক্ষুদ্র, দুর্বল, এবং আঙ্গুল দ্বারা সামান্য চাপ দিলেই উহা ডুবিয়া যায় বা একবারে অশুভ হয় না ।

ঘাড় এবং পৃষ্ঠদেশ । ঘাড় শক্ত হয় বা উইয়া নোয়ান দার না (ক্যালী-কার্ক, ল্যাক্, ইথ্রেস্, রাসটক্স্); মেরুদণ্ডের পৃষ্ঠদেশস্থ অংশের স্পাইনাগ্ প্রসেস্ (Spinus Process) নামক অংশে চাপ দিলে অত্যন্ত বেদনা অনুভূত হয় (আগারিকাস্); কসেরুকার কোমলতা; হুইবক্কেব মধ্যবর্তী স্থানে জালাযুক্ত বেদনা বা বাতনা; স্বক্কাস্থিব মধ্যবর্তী স্থানের কোন কোন অংশে দপ্ দগিয়া বেদনা; ভাঙ্গিলে ফেরুপ হয়, পৃষ্ঠদেশে সেরুপ বেদনা ।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, হাত, পা ইত্যাদি । পক্ষাঘাতে যেরূপ হয়, সমুদয় অঙ্গের সেরুপ তুল্যলতা; সানাত্ত পাংশ্রমেই শরীর কাঁপে; হাত পায়ের পাতা ফীত; হাত পায়ের পাতায় অগ্নাত্ত ভারিপোষ; বাহু এবং হাত অবশ এবং অসাড় হয়; হাত কাঁপে (আগারিকাস্, ল্যাক্-কার্ক); হাতের আঙ্গুল, প্রধানতঃ উদার অত্রভগে, অবশ এবং অসাড় হয়; পায়ের টিবিয়া (Tibia) নামক অস্থির আশ্রিত পদ্বী (Periosteum) ফাটি; হাঁড়ির সন্ধিব পশ্চাৎ-ভাগে ভাঙিয়া যায়; মদ্যাব সময় বা চলিবার সময় পায়ের পাতা ফীত হয়; স্বক্কা এবং কলুইয়ের সন্ধিতে স্থানীয় বেদনার তীব্র বাতনা; হাতে খিল বরা; পায়ের পাতায় জ্বালাগ্ৰস্ততা (মাল্-কার্ক, সাল্) ।

চর্ম । চর্ম তানন বেগেয়া চান হবিদ্রাবর্ণ (চাটনা, মার্ক্, চেলি-ডন্); গায়ে স্থানে স্থানে লোমহা দাওয়াব জায় হইয়া রক্ত সঞ্চিত হয় (Echymosis) (আর্গিক্, সিকেন্); গায়ে লাল ফুস্ফুড়ী (আর্গিক্, কাস্, সিকেন্); গায়ে স্থানে স্থানে লম্বা এবং খড়্কা আব (Tumour) এবং ফক্কা বর্গা হাতে নহলেই রক্ত পড়ে; সমুদয় শরীরে চুলকানিমুক্ত হওয়া, নীচী বা; বিষপর্শের আকার বিশিষ্ট (Erysipelatous) যা; যা হইবার পাতলা পূর্ব বা হানের জগের জায় ছেক্কা ছেক্কা পদার্থ বিশিষ্ট ফের নির্গমন এবং উৎসব সঙ্গে সঙ্গে বদক্ষমহেতু অর্থাৎ ছেক্কা কিসার (Hectic-Sweat); গায়ে দায়েব জায় শুকনা ফুস্ফুড়ী ।

নিদ্রা । অনবসত ঘুমের ইচ্ছা; অজ্ঞানের পর (মধ্যাহ্নে অজ্ঞানের শব্দ অধিক) নিদ্রাবেশ; ঘোর অচেতনতা; রাতি ভই প্রহরের পূর্বে নিদ্রাপ্রসূতা এবং অতিবতা; ঘুমের ঘোরে ভয় এবং উদ্বেগ উৎপাদক, বা জী বা পুরুষ সহবাস বিবয়ক স্বপ্ন দেখা; দিনের বেলা ঘুমের ইচ্ছা,

এবং রাত্রিতে একবারে ঘুম না হওয়া ; ঘুম দ্বারা রোগী আপনাকে আপনি জ্ঞান মনে করে না বা রোগীর ক্ষুধা বোধ হয় না ; ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখিয়া চলিয়া বেড়ান ইত্যাদি (Somnambulism) ।

জ্বর । প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় শীতবোধ এবং কম্প, যাহা আগুনের উত্তাপেও নিবারণিত হয় না, কিন্তু পিপাসা থাকে না (ইথ্রেস্, পাল্‌স্) এবং রোগী গায়ের কাপড় ছাড়িতে চাহে না ; অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ঠাণ্ডা ; রাত্রিতে বিছানায় শয়ন করিয়া থাকা কালীন হাঁটুতে ঠাণ্ডাবোধ ; রাত্রিতে পর্যায়ক্রমে ঠাণ্ডা এবং উষ্ণভাব ; শরীরের উষ্ণতার সঙ্গে সঙ্গে মনের অত্যন্ত উদ্বেগ, মুখমণ্ডল এবং হাতে জ্বালা, গাল লালবর্ণ, বাম গাল ডাইন গাল অপেক্ষা অধিক লালবর্ণ ; অপরাহ্ন এবং সন্ধ্যার সময় উক্ত লক্ষণ অধিক হয় ; প্রচুর ঘর্ম ; রাত্রিতে ঘর্ম (চারনা, মার্ক্‌) ; নিদ্রাবস্থায় ঘর্ম (চায়না) ; প্রাতঃকালে বিছানায় শয়নকালীন ঘর্ম (ক্যাক্-কার্ক্‌, চিনিনাম্-সাল্ক্‌, নাইট্রিক্-আস্‌) ; সামান্য পরিশ্রমেই ঘর্ম হয় (ক্যাক্-কার্ক্‌, ক্যালী-নাইট্রিক্‌, লাইকোপ্‌, হিপ-সাল্ক্‌, সিলিয়া, সাইলিনিস্) ; গায় শীতল চট্‌চটিয়া ঘর্ম (আস্‌, ক্যাম্ফা, ক্যালী-নাইট্রিক্‌, মার্ক্‌) । রাত্রিতে জ্বর এবং ঘর্ম ; আশ্রিক-জ্বর বা জ্বর-বিকার এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে নিদ্রালুতা, ওষ্ঠ এবং জিহ্বা শুষ্ক ও কাল ; মুখ খোলা থাকা (লাইকোপ্‌) ; নাড়ী দ্রুতগামী এবং পূর্ণ, অথবা ক্ষুদ্র ও দুর্বল ; রসক্ষর হেতু জ্বর বা হেক্টিক্‌ ফিবার (Hectic-Fever) ; রাত্রিতে ঘর্ম ।

ব্যবহার । স্ত্রী বা পুরুষ সহবাসে অতাচার বা হস্তমৈথুন হেতু শারীরিক মানসিক বা ন্যায়বিক দুর্বলতা ; উক্ত কারণে স্ত্রীলোকের বন্ধ্যাত্ব (Sterility) ; জরায়ু হইতে অতিরিক্ত রক্তস্রাব ; রক্তঃপ্রদাহ বা স্বল্প রক্তঃস্রাব ; শ্বেতপ্রদর ; মৃত্তিকা পাণ্ডুরোগ (Chlorosis) ; শুনের প্রদাহ ; স্বরশূন্যতা ; হাঁপানি কাশি ; কণ্ঠনালী প্রদাহ (Laryngitis) ; বায়ুনল প্রদাহ ; বায়ুনল এবং ফুফুসের শ্লেষ্মা জনিত বোগ ; ফুফুস-প্রদাহ ; ফুফুসাবরক ঝিল্লী প্রদাহ ; ফুফুসের ফোটিক রোগ (Tuberculosis of the Lungs) ; রক্তোৎকাশ ; বিকারের লক্ষণাক্রান্ত জ্বর ; রসক্ষর হেতু জ্বর বা হেক্টিক্‌ ফিবার (Hectic Fever) ; সংজ্ঞাশ রোগ ; মস্তিষ্কের কোমলতা

(Softening of the brain) ; মস্তিষ্ক এবং মেডুলা অব্ লংগেটোর তরুণ আকারের হ্রাস (Acute atrophy of the Brain and the Medulla oblongata) ; মৃগীবোগ ; মস্তিষ্কের পক্ষাঘাত ; পক্ষাঘাত ; কসে-
ক্রকা মজ্জার কোমলতা ; লোকোমোটর অটাক্সিয়া (Locomotor Ataxia) আকারের পক্ষাঘাত ; পেশী এবং সন্ধিহীনতা বা উহার দরুণ অস্থখ ; চক্ষুর অস্থখ ; অস্থর অস্বাভাবিক বিবৃদ্ধি ; অস্থি পোকায় ধরা (Caries) ; অস্থিক্ষয় (Necrosis) ; গ্রন্থি বিবৃদ্ধি ; নাসা বা নাকড়া (Nasal Polypus) ; ক্ষত ; শৈশবিক ঝিল্লীর প্রদাহ ; যকৃত, হৃৎপিণ্ড এবং মূত্রকোষের মেদোপকৃষ্টতা (Fatty degeneration of the Liver, Heart and Kidneys) ; রক্তমূত্রত্যাগ (Hæmaturia) ; মূত্রকোষের ব্রাইটস্ ডিজিজ্ (Bright's Disease) ; পুরাতন আকারের উদরাময় ; সরল বা সামান্য ওলাউঠা ; পাকস্থলীর অস্থখ ; কামল রোগ ; বিস্তৃত আকা-
রের যকৃত প্রদাহ ; যকৃতের বিবৃদ্ধি এবং কঠিনতা ; যকৃতের হরিদ্রাবর্ণের হ্রাস (Yellow-atrophy of the Liver) ; রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ ; ঘুমেরবোরে স্বপ্ন দেখিয়া বিছানা হইতে উঠিয়া যাইয়া নিরমিত কার্যাদি করা (Somnambulism) ; রক্তাধিক্য হেতু শিরঃপীড়া ; বাতরোগ , হিষ্টিরিয়া জনিত বা অস্বাভাবিক শিরঃপীড়া ; গগুনানা জনিত চক্ষুপ্রদাহ এবং তদ্রূপ আলোক চক্ষুে সহ্য না হওয়া ; চক্ষুে ছানি পড়া (Cataract) ; মলকোমা (Glaucoma) ; দৃষ্টিহীনতা ; মাথায় রক্তাবরোধ হেতু বধিরতা ; দন্তশূল ; পাকস্থলীতে বেদনা এবং পাকস্থলীতে অম্ল হওয়া (Acidity) ; কষ্টকর রক্তস্রাব এবং বাধকের বেদনা ; (Painful Menstruation) ; বক্ষাকণ্ঠ জনিত অস্থখ ; কোমরে বাতের বেদনা ; পাখের পাতার শোথ ইত্যাদি অন্তর্গত রুক্ষরাস ব্যবহাৰ্য্য ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । লম্বা, শীর্ণকায় বিশিষ্ট রোগীর পক্ষে বিশেষ উপযোগী ; উদরাময়, রক্তস্রাব, পূৰ্ণ, শ্বেতপ্রদর এবং বাত নিঃসরণ ইত্যাদি দ্বারা শারীরিক এবং মানসিক দুর্বলতা ; অত্যন্ত শ্রাণবিক দুর্বলতা এবং শরীর কম্পন ; অত্যন্ত শীর্ণ হওয়া ; সামান্য বা হইলেই প্রচুর পরিমাণে রক্ত পড়া (ল্যাক) ; দ্রোণী কেবল ডাইন পার্শ্বে শয়ন করিতে

পারে; শরীরের নানা যন্ত্রাদি দিয়া রক্তপ্রাব; সার্বাস্থিক দুর্বলতা বা বলক্ষয়; সমুদয় শরীরে কষ্টদায়ক ভারিবোধ; সামান্য কারণেই সর্দি লাগা; পক্ষাঘাতাক্রান্ত অঙ্গে খিল ধরা; রাত্রি দুই প্রহরের পূর্বে, বড় বৃষ্টির সময়, সন্ধ্যার সময়, আলোকে, চিত হইয়া বা বাম পার্শ্বে শয়ন করিলে অস্থিরতা বৃদ্ধি; অন্ধকাবে, ডাইনপার্শ্বে শয়ন করিলে, ঘুমের পর, অস্থিরতা উপশম ইত্যাদি ফক্ষরাসের কতগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ । ফক্ষরাস্ এমন একটা বিশেষ স্বভাব প্রকৃতির ঔষধ বিশেষ যে, ঠিকাব কার্যের সঙ্গে কোন ঔষধের বিশেষ কোন সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে কোন কোন বিষয়ে ফক্ষরাসের কার্যের সঙ্গে আসিনিক্, বেলাডোনা, ক্যাকেরিয়া কার্বোনিকা, লাইকোপডিয়াম্, নাক্স-বমিকা, রাস-টেক্স, সাইনিসিয়া, সাল্ফার, চায়না, কালী-কার্ক, কার্কো বেজিটেবিলিস্, ফক্ষরিক্ আসিড্, আনাকাডিয়াম্ ইত্যাদি ঔষধের কার্যের সাদৃশ্য আছে।

প্রতিষেধক ঔষধ । নাক্স-বমিকা, কফিরা, টিরিবিথিনা ফক্ষরাসের প্রতিষেধক ঔষধ মধ্যে পরিগণিত। অধিক মাত্রায় ফক্ষরাস্ দ্বারা বিষাক্ত হইলে বমন উৎপাদক ঔষধ, এবং ম্যাগনেসিয়া জন্মে মিশাইয়া সেবা।

ডাইলুশন বিচার । ফক্ষুস প্রদাহ এবং শ্বাস বস্ত্রের যে সকল ভরুণ অস্থি ফক্ষরাস্ ব্যবহার্য্য, তাহাতে ২য় এবং ৩য় ক্রম বিশেষ উপকারী। ডাক্তার হিউজের মতে পক্ষাঘাত এবং স্নায়ুশূলে ১ম এবং ২য় ক্রম বিশেষ উপকারী। এই প্রকার অস্থি আমরা ৬ষ্ঠ ক্রম ব্যবহারেই যথোচিত ফল পাইয়া থাকি। সাংঘাতিক কামল রোগে ৩য় এবং ৬ষ্ঠ ক্রম বিশেষ উপকারী। অস্থির অস্থি ৩য় এবং ৬ষ্ঠ ক্রম ব্যবহারে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। হস্তমৈথুন, স্ত্রী বা পুরুষ সহবাসে অত্যাচার হেতু জননেস্ত্রীর অতিরিক্ত উত্তেজনা বা দুর্বলতাকে এবং শ্বাস বস্ত্রের পুরাতন আকারের অস্থি ৬, ১২ এবং ৩০ ক্রম ব্যবহারে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। ২০০ ক্রম ১ ফোটা মাত্রায়, প্রতি সপ্তাহে ৩ মাত্রা, অর্থাৎ একদিন অন্তর একদিন এক

মাত্রা, ব্যবস্থা করিয়া ২। ৩ টী ২০। ২৫ বৎসর বয়স্ক রোগীর অতিরিক্ত মৈথুন এবং হস্তমৈথুন জনিত পুরুষাঙ্গের শিথিলতা এবং স্বপ্নে অশোভে ধাতু নির্গমন ইত্যাদি অসুখের চিকিৎসায় আশাতিবিক্র ফল পাওয়া গিয়াছে। সংক্ষেপে ইহা বলা যাইতে পারে যে, এই ঔষধের ১ম হইতে ২০০ পর্য্যন্ত সমুদয় ক্রমই উপকারী, অতএব ব্যবহার্য্য।

প্লাস্‌ম্,—প্লাস্‌।

(PLUMBUM,—METALLIC LEAD,—PLUMB.)

প্লাস্‌ম্ (সীসা) সচরাচর দুই প্রকারে প্রস্তুত হইয়া থাকে। (১) প্লাস্‌ম্ মেটেলিকাম্ এবং (২) প্লাস্‌ম্ অসেটিকাম্। কোন এক বিধস্ত হোমিওপ্যাথিক ঔষধেব হইতে অত্যন্ত পাতলা সীসার পাতা ক্রয় করিয়া যথা নিয়মে সুগার অব্ মিক্‌সের সঙ্গে মিশাইয়া টহাব ওয় শতভাগিক ক্রমের গুঁড়া পর্য্যন্ত প্রস্তুত হইয়া থাকে। ওয় শতভাগিক ক্রমের গুঁড়া হইতে যথানিয়মে ইহার ৪র্থ শতভাগিক ক্রমের আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই প্রকার প্লাস্‌ম্কে প্লাস্‌ম্ মেটেলিকাম্ (Plumbum Metallicum) বলে এবং এট প্রকার সীসাই প্রায় হোমিওপ্যাথিক মতে ঔষধার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সুগার অব্ লেড্ (Sugar of Lead) চূয়ান জলে পরিষ্কার করিয়া ছাকিয়া লইয়া প্লাস্‌ম্ অসেটিকাম্ (Plumbum Aceticum) প্রস্তুত হইয়া থাকে। উক্ত প্রকারে ছাকিয়া লওয়া পরিষ্কৃত সীসা দ্বারা যথা নিয়মে ইহার গুঁড়া এবং আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহার ১ম দশমিক ক্রমের আরোক চূয়ান জলে, টহাব ১ম শতভাগিক ক্রম ডাইলুট্ আকোহল (Dilute Alcohol) এবং উহা অপেক্ষা উক্ত ক্রম রেক্‌টিফাইড্ স্পিরিটে প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহার ১ম দশমিক এবং ১ম শতভাগিক ক্রম সদা সদা প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিলে, কারণ ইহার আরোক অনেক দিন ভাল থাকে না বা পরিয়া যায়।

সাধারণ ক্রিয়া । মস্তিষ্কের উপর এই ঔষধের কার্য্য অত্যন্ত প্রবল। ইহা উক্ত দৃষ্টকে উত্তেজিত করিয়া প্রথমতঃ উহার স্পর্শ জ্ঞানশক্তির অতিরিক্ত বৃদ্ধি করে এবং তৎপর স্নায়ুগুলের দ্বায় র্বেচনী এবং আক্কেপ